



*Att/08  
E29/X*

HARVARD UNIVERSITY.



LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY

57,065

BEQUEST OF


WALTER FAXON

June 22, 1921.

225

6/-  
London, May 7, 1902  
Walter Saxon

JUN 22 1921



JOANNIS RAI

SYNOPSIS  
METHODICA

Avium & Piscium ;  
OPUS POSTHUMUM,

QUOD

Vivus recensuit & perfecit ipse  
in signissimus Author :

IN QUO

Multas SPECIES, in ipsius Ornitho-  
logiâ & Ichthyologia desideratas, adjecit :  
Methodumque suam PISCIVM Naturæ  
magis convenientem reddidit.

CUM

Appendice, & Iconibus.

LONDINI:

Impensis GULIELMI INNYS, ad In-  
signia Principis in Coemeterio D. Pauli.  
MDCCXIII.



JOANNIS RAI

SYNOPSIS  
METHODICA  
AVIUM.

---



---

---

LONDINI:  
Anno MDCCXIII.

## ERRATA Typographica

*Leviora haud opera pretium est indigitare: Gra-  
viora autem hoc modo corrigenda.*

**I**N Præfatione p. 1 l. 16. post *amicorum* insere **D.HANSII SLOANII**  
*Archistarri, &c.* In ipso libro Litera **A** Avibus Anglicanis anteponenda  
est in pag. 6. l. 1 d. ante 2 Aquila. p. 7. l. 3. ante 3 Haliaeēt. p. 13. l. 6.  
autē 1 Falco. p. 16. l. 1 ante 16 Tinnunc. l. 17. ante 1 Buteo. l. 26 ante  
2 Buteo. l. 33. ante 3 Balbus. p. 40. l. 2 lege Tritico. p. 64. l. ult. Cen.  
p. 65. l. ult. *Hathersedge.* p. 70. l. 6. post *flavo* dele periodum. p. 108.  
l. 14. post *suscus* insere *Vropygium lineis albis & nigris varium;* *Pectus &*  
*Venter alba.* p. 119. l. 8. dele periodum post *habnit.* p. 128. l. 16.  
Strundt jager. p. 1. 7. l. 27. post *Provinciā* dele periodum. l. 19 ult.  
*Tardī.* In *Synopsi Piscium* p. 5. l. 16. *dico.*

---

# Ad Lectorem.



*I*C Liber, insignis licet, & clarissimum superiore seculo Scriptoris nomen primâ fronte gerens, in cuiusdam Bibliopolæ scrinio, forte fortunâ paulo abhinc reper-tus est. *Ibi* pulvere obrutus, & cum tincis cer-tans, Bibliopolæ culpâ, diu delituit. Quem ut Autographum remitteret, nec prece, nec præmio, nec minis RAI amici moverent: id quod ex eorum Epistolis, jam penes me asservatis, nuper-  
rim intellexi.

Opus idcirco Posthumum habes, benevolc Lector; at ab ipsius magni RAI manu, diu ante obitum ejus, limatum & perfectum. Quippe summorum & doctissimorum ejus amicorum, D. TANCREDI ROBINSONI, M. D. aliorumque rogau, inchoatum est hoc Opusculum; quod ut absolutius ederetur, huic suas Jamaicenses, aliasque Observations & Collectiones imper-tivit clarissimus SLOANIUS. Ita tandem ad finem perductum est circa annum 1693 aut 1694, ut ex RAI Epistolis patet, & de hac re me cer-tiorcm fecit D. DALE Braintreensis Vir curio-sus, ac RAI vicinus & amicus.

In utrâque hujus Synopsews parte, plurimæ additæ sunt Species; ac in posteriore Metho-du;

## Ad Lectorem.

dus alia est, & Naturæ magis conveniens quam in Clarissimi WILLUGHBEI Ichthyologiâ, à RAIo nostro editâ.

Quamvis igitur immortale magni WILLUGHBEI nomen, & opera sint laude dignissima, aliorumque facile superantia ejusdem Ornithologia & Ichthyologia, si tamen Historias excipias, hic Liber non tantum mole minor, ideoque ad circumferendum aptior, verum etiam auctior multò est & emendatior.

Cùm primò Willughbei Raiique mentionem feci, in animo fuit quædam de tam illustrium virorum institutis. & exantlatis laboribus dicere, prout ab ipso RAIo, WILLUGHBEI item filiâ (sui sexūs ornamento) aliisque accepi. Hæc verò si aggrederer, necesse esset, aut plura dieere quam quæ in Praefatiunculâ enumerari possunt, aut pauciora quam tantorum Virorum meritis debeantur. De his autem alius erit dœendi locus, cum Epistolas, ceteraque RAIANA edidero; quod molior, si modo vitam otiumque dederit Deus. Obnixè igitur omnes, qui de re literariâ cum Clarissimo RAIo egerunt, peto, si qua ejusmodi RAIANA habeant, ut pro suâ humanitate mihi velint impertire: quod beneficium, ut omnes rei literariæ studiosi, gratâ memoriam & summâ laude prosequentur, ita præ aliis

Upminster prope Rumfordiam, Essexiæ.

Dec. 19. 1712.

W. DERHAM.

# SYNOPSIS METHODICA AVIUM.

## AVIUM *Divisio generalis.*



VES sunt vel *terrestres*, vel *aquaticæ*.

*Terrestres* vocamus quæ aquas minime frequentant, sed in siccioribus plerumque degunt, & in terra victum quærunt.

Hæ vel sunt rostro & unguibus *aduncis*, *Tau. Τάυρυχες*; Græcis dictæ, vel rostro & unguibus *rectioribus* minùsque hamatis.

*Tau. Τάυρυχες* vel sunt *frugivoræ* ut *Pſittaci*, vel *carnivoræ* & *rapaces*, ut *reliquæ*. Rapacium in genere, sed præcipue Diuræarum, Notæ sunt, Caput habere grande, collum breve; Rostrum & ungues (ut diximus) aduncos; Linguam latam, crassam, & humanæ similem. Pennas in cauda 12, quod & multis præterea avibus commune est; Remiges in utravis ad 24. Ventriculum membranosum, non musculotum; Appendices seu Intestina cœca gemina, brevissima, quæque adultis faltem nullius usus esse videntur; femora valida & musculosa, ad prædam feriendam; Insigni visus acumine pollere, ad eam è longinquo dispiciendam: Solitariæ esse, non gregarias. Quamvis autem Aristoteles in genera

## 2 SYNOPTIS MÉTHODICA

Pronunciet, Ταρπωνός χωνεύδην ἀγαλαῖον. Vultures excipiēndi videntur, quos *Buteo* lioniis catervatim volare, 50 aut 60 simul, observavit: *Pennis plumisve pro corporis mole copiosissimis vestiri*, ut Aves majores esse videantur, quām pennis exutæ reverā sunt: *Longevas esse*, & quidem prae aliis *Avibus*; de quo quamvis dubitem; Aves tamen in genere omnes pro corporum mole *Quadrupedibus vivaciores esse certissimum est*. *Inediā diutissimè tolerare*, quod pro victus ratione, qui non semper in promptu, iis ferè necessarium est. *Fæminas maribus corporis mole majores esse, formâ speciosiores, viribus fortiores, in tole generosiores ferociorelve*; quod sobolis alendæ curâ iis præcipue incumbit. Quod *Rostri basis aliquous que cute nudâ, (ceram Accipitrarii vocant) obducatur*. Quod *uncus Mandibulae superioris etate augetur, & in longum producitur*. Quod denique excrements fluida ferè sunt *ladiis instar*. Hæ prædâ & rapinâ plerunque victitant, *Quadrupeda minora & Aves invadentes & dilaniantes*; nonnullæ ignaviores cadaveribus forte repertis non abstinent, sed disterptis vescuntur, ut *Vultures*. *Tarponoxes rapaces & carnivoræ sunt vel Nocturnæ, quæ internocu evolant & prædantur, capitibus magnis & velut Felinis, Bubenes & Noctuæ dictæ; vel Diurnæ, ut Reliquæ, quæ interdiu prædantur*.

*Uncungues rapaces seu carnivoræ Diurnæ sunt vel Majores, vel Minores. Majores sunt vel Generosiores ut Aquile; vel Ignaviores, ut Vultures.*

Aquilæ nonnullæ Accipitres quodam (ut v. g. Gyrofalconem dictum,) magnitudine non superant quin potius ab hisce superantur. Differunt ergo Aquilæ ab aliis rapacibus, non tantum quod magnitudine excellunt, sed quod naturâ feræ & indomitæ sunt, nec institutionis & tractationis patientes.

*Minores itidem sunt vel generosiores, ad ancupium institui solitæ, Hawk nostratis dictæ, Latinis Accipitres, quas Accipitrarii optimâ ratione distinguunt in Macropteras, h. e. *Alis longis* & ad caudam ferè extremam extensis donatas, *Long-winged Hawks*; quales sunt *Falco, Lanarius, &c. & Brachypteras, Short-winged Hawks*, i. e.*

*alii brevibus & ab extrema cauda multum deficientibus præditas ; uti sunt Accipiter Fringillarius & Palumbarius : vel Ignaviores & Sylvestres, ab Accipitrariis ferè neglectæ, ut Buteo, Milvus, &c. quibus addi possunt Lanii seu Colluriones ; in hoc genere minimæ rostro aliquousque recto, extremo adunco. Aves rostro & unguibus reæterioribus minùsque hamatis sunt vel 1. Maxime, singulares & sui generis, ob corporum molem & alarum parvitatem volatui inidoneæ, ut Struthio-camelus, Emeu, seu Cassoaris, & Dodo.*

2. *Mediæ magnitudinis, seu maiores, quæ vel sunt Rostris magnis crassis validis & oblongis ; vel Rostris minoribus & brevioribus, nonnihil incurvis, saltem in Gallinaceo genere.*

Priores in duo genera distinguimus. *Primum Genus Corvinum* vocamus à similitudine *Corvi* Avis notissimæ ; quarum notæ sunt, Rostrum magnum, crassum, rectum, aut modicè inflexum ; vixtus ex carne, insectis & frugibus promiscuus ; nonnullæ tamen carnivoræ tantum sunt, morticinis & cadaveribus præcipue inhantes, quin & aves vivas aliâque animalia rapiunt & dilaniant, undè à nonnullis *Semirapaces* appellantur. *Corvos* etiam à quibusdam ad aucupium institutos audivimus. *Secundum, Picrum* genus est, quod plurimis & insignibus notis ab alio quoconque Avium genere differt, & cognitu facilissimum est. Earum præcipuae, & maximè characteristicæ sunt, 1. Linguam habere teretem, in spinulam osseam, acutam, utrinque dentatam desinentem, quam longissimè exserere & evibrare potest in arborum rimas aliâve foramina, ad insecta ibidem latitantia lancinanda & extrahenda. 2. Digits in pedibus anticos tantum duos, & posticos totidem, ad arbores commodiùs scandendum. 3. Intestinis cœcis carere ; quod nulli alii quam hactenus novimus avi convenit.

Posteriores in duo genera subdividuntur, 1. *Gallinaceum*, quarum notæ sunt 1. Rostrum breve validum & nonnihil incurvum, ad grana, quibus præcipue vixtatur hoc genus, colligenda. 2. Ventriculus crassis musculis

## 4 SYNOPIA METHODICA

instructus ad eadem, calculorum (quos deglutit) opere comminuenda. 3. Corpus crassum & ponderosum, carne multa. 4. Alæ breves & concavæ, undè minimè altilolæ sunt, & breves volatus faciunt hæ aves. 5. Intestina cæca longissima. 6. Caro, præcipue musculorum pectoris, alba, qui color à coctione se prodit manifestius. 7. Humi nidificare, quia sci. pulli recens exclusi in nido non jacent, nec à matribus aluntur; sed densa lanugine vestiti, huc illuc cursitare, matres sequi, ipsique cibum rostellis colligere possunt.

2. *Columbinum*, cuius notæ sunt 1. Figura corporis peculiaris, Cuculum referens. 2. Tibiæ breves, & in omnibus quas novimus speciebus unâ cum pedibus rubræ. 3. Alæ longæ, & volatus pernix. 4. Rostrum rectum, tenui, angustum & longiusculum; excipiendo hinc sunt columbæ nonnullæ exoticæ, quæ rostrum brevius & crassius habent. 5. Vox gemebunda. 6. Bina duntaxat unâ vice ova ponere; quem defectum saepius in anno pariendo compensant. 7. Cibum pullis ex ingluvie sua in os eructare maceratum & emollitum ad faciliorem concoctionem.

3. *Minores*; quarum notæ, magnitudo inter Columbas & Alaudas media: Rostrum longitudinis & crassitiei mediocris, deorsum modicè inflexum, cauda longa; victus è baccis & insectis promiscuus. Hoc genus Avium à similitudine cum Turdo Ave notissima *Turdinum* vocamus.

4. *Minimæ*, quas Aviculas dicimus, & in *tenuirostras* & *crassirostras* dividimus.

*Aves aquaticæ* sunt vel quæ circa aquas versantur & in aquosis plerumque victimum querunt, aquis tamen non innatant, quæ omnes *fissipedes* sunt, pleræque etiam longicruræ, tibiis quoque supra genua vulgo credita aliquousque nudis, ut aquas vadofas commodius ingrediantur: vel quæ aquis innatant, quarum pleræque *Palmipedes* sunt, & crura breviuscula maximam partem obtinent.

Quæ

Quæ circa aquas versantur sunt vel Maximæ, singulares & sui generis, ut *Grus*, &c. vel Minores. Minores sunt vel *Piscivore*; vel *Insectivore* aut *Limosugæ*, sive ut utrasque eodem nomine comprehendam, non *Piscivore*. Non *piscivoras* pro rostrorum longitudine dividimus in 1. *Rostris longissimis* donatas, seu rectis, ut *Scolopaces*, &c. sive curvis, ut *Arquatae*, &c. 2. *Rostris medie longitudinis*, cujusmodi sunt *Himantopus*, &c. 3. *Rostris brevissimis*, hoc est, *Digitum & dimidium* non excedentibus, ut *Vannellus*, *Pluvialis*, &c.

Aves aquis innatantes, sunt vel *fissipedes*, digitis in nonnullis, ut *Fulica*, ad latera membranis auctis: vel *Palmipedes*; eæque vel *longicruræ* & *anomalæ*; *Phænicopterus*, *Avosetta*, *Trochilus*; vel *cruribus brevioribus* donatae. Hæ vel *Tridactyle* sunt, digito postico carentes; ut *Penguin*, *Alka*, *Lomvia*, *Lunda*: vel *Tetradactyle*: quibus vel *digitæ omnes membranis intercedentibus connexi* sunt, ut, *Onocrotalus*, *Anser Baffanus*, *Corvus aquaticus*, &c. vel *tres tantum*, postico soluto; atque hæ iterum vel I. *Angustirostræ*; seu rostro in *extremo acuto*, recto aut modicè tantum inflexo, quæ duum generum sunt 1. *Brachyptere* & *urinatrices*, *Colymbi dictæ*, quorum nonnulli digitos habent divisos membranis tantum lateralibus auctos. 2. *Macroptere* & *volatileæ Lari* dictæ: sive *Rostro in extremo aduncum*, quæ duum pariter generum sunt, nimirum 1. *Rostro serrato* seu ad latera utrinque dentato; *Mergi*: 2. *Rostro levi* seu dentium expertise, *Puffinus Anglorum*, *Avis Diomedea*, &c. vel II. *latirostræ*; quæ dividi possunt in genus *Anserinum*, quarum notas inferius dabimus: & *Anatinum*, cuius generis Aves sunt vel *marinæ* & *urinatrices*: vel *fluviatiles* & *lacustres*.

*Aves rapaces diurnæ: & primò MAJORES  
quæ duū Generum sunt.*

*Primò Generosiores, seu AQUILÆ.*

**A**Quilæ magnitudine insigni, quâ earum plerisque antecellunt, necnon feritate innata, ut difficulter admodum cicurari & ad aucupium institui possint, à reliquis *Avibus rapacibus* differunt; generositate & Rostris aduncitate à *Vulturibus*, quibus Rostrum non confessim atque è fronte enascitur in hamum curvatur, verùm post duorum digitorum seu medii palmi continuam rectitudinem, observante *Gesnero*.

1. *Chrysaëtos Aldrov.* [Ornithol. lib. 2. cap. 2. i. e.] *Aquila fulva seu aurea.* Magnitudine inter Aquilas excellit, & colore in toto corpore fulvo à reliquis distinguitur; à proximè sequente caudæ totius colore fusco, quólique crura ad pedes usque plumosa habeat. *Aldrovando appensa 12 libras æquabat.*

2. *Aquila fulva seu Chrysaëtos*, caudâ annulo albo cinctâ. Hujus nidus Anno 1668. in sylvosis propè *Derwentiam fluvium* in *Pecco Derbiensi* inventus est, è bacillis seu virgis ligneis grandioribus compositus, quorum altera extremitas rupis cujusdam eminentiæ, altera duabus betulis innitebatur. Bacillis junci insternebantur, juncis Ericæ, Ericis iterum junci; in quibus jaciebat pullus unicus cum uno ovo urino, adjacentibus cadaveribus unius agni, unius leporis, & trium *Grygallii* pullorum. Erat autem nidus iste quadratus, duas ulnas latus, nulla in medio cavitate; verùm planus & æqualis. Pullus fidei adultus erat, & ad volandum idoneus, *Accipitris palumbarii* figurâ; dorso *Subbuteonis* instar nigricante; *Anseris* propè pondere; tibiis ad pedes usque plumosis; annulo seu zonâ in cauda albâ.

*Aquilæ*

Aquilæ speciem quandam in præruptis rupibus seu clivis montis *Snowdon* in Wallia quotannis nidificare aiunt.

3. *Haliæetus* seu *Offraga*, *The Osprey*. In fluminibus nostris non raro pisces prædatur; at verò pedem alterum planum, digitis membranis intercedentibus connexis, Anseris aliūlve Avis palmipedis in modum, alterum divisum ad instar aliarum Rapacium habere (ut vulgo persuasum) proculdubio falsum & fabulosum est. Ob magnitudinem insignem Aquilis annumerari mereatur; cùm *Balbusardus* Anglorum, *The bald Buzzard*, (qui à multis pro Haliætō habetur) nonnullis etiam ex *Accipitri* genere avibus magnitudine cedat.

4. *Melanætos* seu *Aquila Valeria*. A colore nigro, & vîribus quibus valet dicta. Hujus generis Avem in Curia *Medioburgenſi Ze'landiae* enutritam vidimus, Corvi magnitudine duplâ; Capite, collo, pectore, nigris; in interscapulio maculâ magnâ triangulari ex albo rufulcente notatam, item areâ albâ transversâ in alis. Sexus tam in hac specie quam in aliis Aquilis coloribus multum variant.

5. *Pygargus*, *Albicilla Gazæ*, quibusdam *Hinnularia*. Magnitudine quam ei cedit; colore luteo rostri & pedum, capitis albicante aut cinerascente, caudæ vel totius, vel alterius medietatis albo, à *Chrysaëto* differt. Nobis ad statuam examinata  $8\frac{1}{2}$  libras pendebat. *Aldrovando* descripta multò minor erat, & colore diversa. Venetiis nocti sumus ab *Aucupibus* occisam, & in foro venum oblatam.

6. *Morphnos* *Gesn.* & *Aldrov.* non alia avis est quam *Balbusardus* Anglorum, ipso *Turnero* satente, qui descriptionem ejus sub *Morphni* appellatione ad *Gesnerum* transmisit.

7. *Morphnos* *congener* *Aldrov.* Galli gallinacei magnitudine erat, Cerâ rostri luteâ, colore totius ferrugineo, maculis tamen aliquot albis hinc inde sparsis; cruribus totis hirsutis ad digitos usque.

8. *Aquila Brasiliensis cristata*, *Urtaurana* Indigenis dicta *Marcgrav.* Crista è quatuor pennis nigris componitur, duabus mediis 2 digitos altis, lateralibus parvis. Ro-

## 8 SYNOPSIS MÉTHODICA

strum nigrum cum cera ad basin flava. Pedes etiam flavi Color in capite, alarum remigibus, & tota ferè supina parte fuscus: in pectore, ventre, & femoribus cruribusque ad pedes usque albus, nigris pennis squamatim variegatus.

9. Urubitinga Brasiliensibus *Marcgrav.* A præcedente differt 1. colore, qui huic per totum corpus fuscus est & nigricans; 2. Oculis Aquilinis, cum illi eleganter aurei sint; 3. Cruribus nudis luteis; 4. Cauda bicolore, inferiore parte ad duas tertias alba, reliqua nigra. 5. Cristæ denique absentiâ.

10. Percnopteros seu *Gypaetus Aldrov.* *Oripelargus* etiam dicta. Hujus Avis tres seu species seu varietates proponit *Aldrovandus*, quarum descriptiones apud ipsum vide. Nos hujus generis Avem *Venetiis* in ædibus cuiusdam *Nobilis Veneti* enutritam vidimus & descripsimus An. 1664.

Magnitudine Aquilam æquat superatve. Caput & collum plumis destituta, albâ duntaxat lanugine vestiebantur. Imum collum infra lanuginem quidam veluti torquis plumarum albentium cingebat. Plumæ ferè omnes corpus tegentes dilutè ferrugineæ. Remiges alarum & cauda nigra. Rostrum magnum, Lari quam Aquilæ similius, extrempo albicans: Nares cute nigra tegebantur. A rostro ad oculos cutis nuda erat, colore cœruleo. Oculorum irides ex rubro *Avellaneæ*. Enaribus continuè guttatim humor stillabat. Crura paulò infra genua plumis tecta, ex interiore parte alba. Pedes plumbei: medius digitus reliquis multò longior: extimus ad primum articulum membranâ medio annexus: Ungues nigri, minores minùsque incurvati quam in Aquilis. Ingluvies tanquam saccus propendebat. Semper fere alis expansis stetit, eodem situ quo *Vultur Leporarius* à *Gesnero* depingitur.

Avis hæc primæ ab *Aldrovando* descriptæ eadem esse videtur, à qua secundam ejusdem specie diversam non esse suspicor; cum *Aldrovandus* ipse secundam suam *Gypaeton Gesneriana* non dissimilem esse fateatur. Quod vero *Gesneriana* & nostra eadem Avis sint, vel unica

nica illa nota humoris è rostro stillantis ad probandum sufficere videtur, quantumvis colores discrepent: *Gesneriana* enim colore Ciconiam referebat. Sexus autem in hoc genus Avibus coloribus aliisque accidentibus plurimum differunt.

Avis hæc ob ignaviam suam, rostrique & pedum figuram, Aquilis minimè accenserí debet.

---

### De VULTURIBUS.

**V**ULTURUM notæ characteristicæ quibus ab aliis Rapacibus Avibus, Aquilis præcipue, differunt, sunt, 1. Quod Rostrum eis non confestim atque è fronte enascitur in hamum curvetur, sed post duorum digitorum continuam rectitudinem. 2. Quod Aquilâ ignaviores sint, & cadaveribus vescantur, à quibus illæ abstinent: nec tamen cadaveribus solis vescuntur, sed etiam vivas volucres, hædos, lepores, hinnulos insectantur & rapiunt. 3. Collum ferè implume habere. 4. Turmatim volare, observante *Bellonio*, quod solis inter Rapaces diurnas Vulturibus convenit. 5. Ingluviem ante ventriculum velut sacculum propendentem habere, quod in Gyropaëto dicto Venetiis viso observavimus. 6. Quod matrem fœmina, præter morem aliarum Rapacium, magnitudine non supereret. 7. Quod alarum incumbens corpori pars leni tota vellere, quod soli inter Rapaces peculiare, integritur. 8. Quod sub gutture spatum habeat palmi latitudine non tam plumis quam pilis, qui Vitulinis simillimi sunt, vestitum.

Verum Crura ad pedes usque plumosa habere, quâ notâ Vultures ab aliis Rapacibus distingui existimat *Bellonius*, nec omnibus communе est nec solis proprium.

Vulturum species à *Bellonio* & *Gesnero* proponuntur sex.

1. *Vultur cinereus.*

2. *Vultur niger.* Quorum *Bellonius* nullas neque descrip-

## XO SYNOPSIS M<sup>E</sup>T<sup>H</sup>O<sup>D</sup>I<sup>C</sup>A

scriptiones integras, neque notas characteristicas adhibet, sed nudas duntaxat icones ponit.

3. *Vultur Bæticus* à Bœtico seu castaneo totius corporis colore dictus. Alarum & caudæ pennæ nigræ sunt : Plumæ verticis breviusculæ & curtæ : Cauda brevis alarum longissimarum respectu. Crura brevia, plumis undique coniecta ad digitos usque.

4. *Vultur Leporarius* Gesn. Colore est in rutilo nigricante, pedibus flavis. Stans aut sedens cristam quasi cornutam in capite erigit, quæ in volante non appetet. Minor est, nec pectore adeò fulvo ac proximè sequens.

5. *Vultur aureus* Gesn. Pars prona tota ruffa, versùs caudam dilutior. Dorsum nigrum : Alæ & cauda fuscae. Aquilæ est magnitudine. Digi<sup>i</sup>ti pedum fusco aut corneo colore sunt.

6. *Vultur albus*, quem cum cinereo *Bellonius* eundem facit.

7. *Vultur fulvus*, *Bæticus Bellonii* congener. Dorsum ei & alæ fulvae : cauda brevis alarum respectu, quo cum Bœtico *Bellonii* convenit. Rostrum nigrum, extremo aduncum. Caput & collum ad pectus usque, ut & media pars pectoris, plumis destituta, brevi, molli, densaque lanagine alba vestiuntur. Oculi torvi, iridibus croceis : In cervicis ima parte, seu dorsi summa, congeries pennularum angustarum, reliquis multò longiorum, ut in *Pteroptero Aldrovandi*, collum cingit. In Ornithotropheo Regio, in Vivario S. Jacobi dicto enutritum vidimus & descripsimus, unde allatum nescimus.

8. *Vultur Brasiliensis* aut *Mexicanus*, Urubu Marcgr. Tzopiloth Fr. Ximen. *Auræ* Nieremb. Corvi magnitudine est ; caudâ longâ, alis tamen ea longioribus. Pennæ totius corporis nigræ : caput parvum, cute testum paulum rugosa, mira colorum diversitate ; nam in sinistro latere infra oculum crocei est coloris, supra oculum cœrulei, item in summitate ; reliqua parte subrunita ; in dextro latere circa oculum superne & inferne crocei coloris, in summitate itidem ; reliquâ parte ex croceo albicantis. Rostrum satis longum, extremo aduncum, & ad medietatem usque à capite cute obtectum è croceo cœruleacente. In medietate rostri superiore narium

um foramen unum, amplum, transversim positum. Extremitas rostri quæ cute caret alba est. Fœtus ejus caro instar cadaveris; nam & cadaveribus vescuntur. Fœda avis est, semper macra, nunquam satura. *Ximenes Corvi* speciem facit. Verum Rostrum extremitas adunca & Caput implumne Vulturibus accensendum suadent.

Avis hæc Jamaycensibus nostris the *Carrion-Crow* dicitur in superiore: à rostri mandibula duo narium foramina ampla habet, non unum transversim positum, ut falso *Hernandez*. Volat ut *Milvus*: Animalia viva non aggreditur aut rapit, sed mortuorum duntaxat cadaveribus vescitur, ut nos certiores fecit doctissimus Amicus noster & naturalis Historiæ callentissimus *D. Hansius Sloane*, *autotius*.

9. Hujus generis esse videtur Avis illa ingens Chilensis; *Cuntur* dicta, quam ego ob magnitudinem enormem & pene incredibilem, pro ficta & fabulosa olim habui, ideoque Ornithologiæ *D. Willughby* inserere non sum ausus. Jam verò dari hujusmodi Ayem fidem mihi fecit Amicus noster summus, & in Historia Naturali versatissimus *D. Hansius Sloane* M. D. Historiâ ejus, quam ab *australi* fide dignissimo, *D. Joanne Strong*, Nauarcho, qui per tretum Magellanicum in Oceanum Australiem navigavit, unâ cum penna Alæ remige, accepit, communicata.

Ad oram, inquit *D. Strong*, maritimam Chilensem, circa tricesimum tertium latitudinis Meridionalis gradum, non procul à *Mocha* insula, antequam locum *Heradura* dictum accederemus, Alitem hanc offendimus, Clivo maritimo excuso prope littus insidentem. Glande plumbea tractæ & occisæ spatium & magnitudinem socii navales attoniti mirabantur. Quippe ab extremo ad extremum alarum extensarum communis surata 13 pedes latitudine æquabat. Hispani Regionis istius incolæ quænam Avis esset interrogati *Cuntur* dictam affirmabant, séque ab illis valde timere, nè liberos suos raperent & dilaniarent, vel aliquam eis noxam inferrent.

Penna quam mihi (verba sunt *D. Sloane*) dono dedit Capitaneus prædictus, duos pedes & quatuor insuper

per digitos longa erat. Scapus nudus seu pars fistulosa  
 $5\frac{3}{4}$  dig. longa, ambitu ferè sesquidigitali, ab uno latere non-  
 nihil concavā, ab alterò convexa, colore tota fusco seu ob-  
 scuro, 3ijj. gr. 17  $\frac{1}{2}$  pondere. Avis ipsa, ex descriptione ru-  
 di, qualem ab imperitis & in Historia Animalium mini-  
 mè versatis extorquere potui, quin Vultur fuerit ex Aura-  
 rum dictarum genere minimè dubito. A nautis ob ca-  
 put calvum seu implume pro Gallo pavone per errorem  
 initio habita eit, ut & Aura à primis nostræ gentis  
 Americæ colonis ob eandem rationem, unde & carnem  
 ejus comedenterunt, idque sine ullo nocumento.

Avis hujus à *Josepho Acosta* mentionem factam invenio  
 lib. 4. cap. 37. *E contra* (De Tomineis sermonem habu-  
 it) Quas Condores vocant magnitudinis sunt ingentis, earum-  
 rumque virium, ut non solum Ovem eviscerare & comedere  
 valeant, sed & vitulum integrum.

*Garcilasso de la Vega* de iis hæc haber, Aliæ adhuc  
 Alites habentur, quas Rapacibus annumerare possumus,  
 magnitudine vasta & immanni, *Cuntur dictæ, Hispanis*  
 corruptè *Condor*. Harum nonnullæ ab Hispanis occisiæ  
 ab extremo ad extremum alarum extensarum mensurâ  
 sumptâ 15 aut 16 pedes, hoc est 5  $\frac{1}{4}$  ulnas latitudine im-  
 plebant. Natura ad earum ferociam viresque in parte  
 temperandas aut irritas reddendas, unguis iis aduncos,  
 quos Aquilæ concessit, denegavit, pedum digitis in  
 rectiores & Gallinaceorum æmulos desinentibus. Ro-  
 strum tamen iis satis validum indulxit ad Boum etiam  
 tergora perforanda & diripienda, visceraque abdomine  
 discisso dilanianda. Binæ earum vaccam taurūmve ado-  
 rati audent, & vorare solent. Nec ab hominibus absti-  
 nent; quin singulæ pueros decennes duodecennésve  
 aggrediuntur & occidunt. Insigni Naturæ providentia,  
 tum pecudum tum indigenarum securitati cautum est,  
 nè multæ nascerentur; nam si numerosæ essent, mag-  
 nam armentis stragem, & incolis damnum inferrent, nec  
 quicquam ferè ab earum rapinis tutum foret. Color  
 varius est ex albo & nigro, Picæ caudatæ instar. Cri-  
 stam in capite parilem seu æqualem habent instar Nova-  
 culae, non ferratum ad modum Gallinaceæ. Cum ex aëre  
 in

in terram devolant forti alarum agitatione aërem verberando strepitum susurrumve adeò vehementem & terrificum edunt, ut vel attonitum vel surdum reddat audientē.

**Accipitres macropteri generosiores ad aucupium institui soliti, Hawks nostratis dicti.**

1. **FALCO peregrinus:** niger Aldrovando descriptus vertice erat plano & depresso; Rostro pulchre cœruleo, cum cera intensè lutea. Caput, cervix, dorsum, alæ fulcæ & propemodum nigræ: Pectus, venter & femora alba, lineis latiusculis nigris transversis distincta. Cauda minus fusca, lineis nigris transversim ductis [cross Bars] insignita. Crura pedesque lutea; tibiæ breves.

2. **Falco Sacer.** Angl. *The Sacre.* Omnia præter Gyrfalconem maximus est, colore Milvino, seu inter rufum & fuligineum medio; cruribus brevibus, digitis cœruleis; rostro etiam brevi & cœruleo: Corpore longiusculo, alis & cauda longis.

3. **Gyrfalco,** *The Jerfalcon,* cuius mas sive *Tertiaius* (Anglicé *Tarcel,*) *The Jerkin* dicitur, *Gyr.* Germanis Vulturem significat. Sola magnitudine sua, Aquilæ æmulâ, ab aliis quibuscumque Falcionibus satis distinguitur; quamvis aliæ notæ non desint. Vertex planus, Rostrum cœruleum, item tibiæ & pedes; Color plumarum in corpore toto albus, verum dorſi & alarum pennæ nigra macula cordiformi notatae; cauda breviutula notis nigris transversis variegata: Gula, pectus & venter albedine pura tincta. Gruibus & Ardeis in primis infesta est.

4. **Falco montanus,** *The Mountain Falcon.* Peregrino minor est, verticè fastigiato seu leniter elevato: Rostro crasso, brevi, nigro, cerâ luteâ; corpore leucophæo; pedibus croceis.

5. **Falco gentilis i. e. nobilis dictus.** a Peregrino & Germanico parùm admodum differt vel corporis forma, vel indole & moribus, ut nonnisi oculatissimus quisque & in arte exercitatissimus Accipitrarius eos posse distinguere.

6. *Falco gibbosus*, *The Haggard Falcon*. Sic dictus est; quod ob brevitatem caput vix appareat ante juga alarum, dum eas supra latera dorsi componit; ita ut gibbum gestare videatur. Anglici nostri Rei Accipitriæ scriptores Falconem hunc gibbosum seu *Haggard Falcon*, & Peregrinum dictum pro eodem habent, nomina hæc promiscuè usurpantes.

7. *Falco albus*, *The White-Falcon*: Colore totius corporis & alarum albo à reliquis speciebus abundè distinguitur.

8. *Lithofalco* & *Dendrofalco*. De his nihil notatum dignum invenimus. Lithofalco Alberto mediæ magnitudinis est & vigoris inter *peregrinum* & *gibbosum*. Dendrofalci plenissimam descriptionem apud *Gesnerum* habemus, quam Subbuteoni convenire *D. Willughby* existimat.

9. *Falco Tunetanus*, *The Tunus or Barbary Falcon*. Qui nostratis hoc nomine venit hujus generis reliquis, Peregrino dicto, Montano & Gentili minor est. Bellonius ad Lanarii magnitudinem & similitudinem accedere scribit.

10. *Falco rubens*, *The Red Falcon*. Quæ de hoc genere Aldrovandus ex Alberto habet apud ipsum vide nos an detur hujusmodi species à reliquis distincta dubitamus.

11. *Faltones Indici rubri* *Aldrov.* Horum alter quem fœminam esse putavit major erat, vertice lato & fere plano. Rostrum cinereum, cerâ luteâ. Supina pars tota cinerea ad fuscum tendens. Ab exteriore oculorum cantho macula longa dicitur, eodem quo pectus colore imbuta. Pectus autem & prona superficies penè tota rubet cinnabarinò remisso; inspersis anteriori sterno maculis rarioribus cinereis. Alter, quem marem putavit, minor erat. Color autem rubeus in prona superficie saturatior erat: Dorsum & supina facies prorsus nigra.

12. *Falco Indicus cirratus*. Magnitudine ad Asturem accedit. Caput ei planum, nigrum, cirratum, crista bifida ab Occidente retro dependente. Collum rubrum;

Pectus

Pectus & venter ex albo & nigro varia, lituris seu lineis transversis alternis perquam lucidis & pulchris. Irides oculorum flavæ. Rostrum obscurè cœruleum & propemodum nigrum; præcipue versus apicem, nam basis luteâ membranâ obducitur. Crura plumis ad pedes usque vestita: Pedes lutei, ungues nigerrimi. Minores pennarum alæ ordines fimbriis albicant. Cauda areolis seu zonis nigris & cinereis alternis varia. Cætera nigricat. Avem hanc ex India Orientali advectam in Ornitrophio Regio in vivario S. Jacobi dicto enutritam vidimus.

13. *Lanarius, The Lannar*, cujus mas sive Tertiarius *The Lanneret* dicitur. Notæ hujus diagnosticæ sunt, Quòd rostrum cruráque cum pedibus habeat cœrulea; plumas anteriores albo & nigro varios maculis non transversis, sed plumas in longum distinguentibus, contrariâ atque in Falconibus ratione. Supina pars tota fusca; Alarum prona notis rotundis ac instar exiguorum nummulorum per superficiem disseminatis picta. Galliæ perpetuus est *Lanarius*.

A. 14. *Subbuteo Bellon. & Aldrov. The Hobby*. Parvitate sua à præcedentibus distinguitur, appendicibus angularibus utrinque ad superiorem Rostrum mandibulam cum Balbusardo, Æsalone, Tinnunculo & Laniis dictis convenit; ab insectandis Alaudis quibus præcipue infestus est *Accipiter Alaudarius* dici meretur. Ejus autem conspectum & præsentiam, instinctu quodam naturæ, adeô horret & expavescit Alauda, ut ad eum evitandum vel in hominis ipsius finum confugere vel in carpentum quo vehitur apertum velut in Asylum, quamvis non satis tutum; se recipere non vereatur.

15. *Æsalon Bellon. & Aldrov. The Merlin*. Avium hujus generis omnium minima est, Merulâ non multo major, animosa tamen & audax. Rostrum cœruleum: Torquis sub occipite ex albo lutescens. Dorsum ferrugineo & nigricante cœruleo colore varium. Prona pars corporis albo ferrugineo cum maculis nigro-ferrugineis deorsum à capite caudam versus tendentibus, non transversis.

A. 6. *Tinnunculus*

## 16 SYNOPSIS METHODICA

16. *Tinnunculus* seu *Cenchrus* *Aldrov.* *The Kestrell,*  
*Stannell,* or *Stonegall.* nonnullis, *The Windhover.* Mag-  
 nitudine est *Columbae*; capite cinereo, lineolis nigris  
 vario; Supina pars corporis ad uropygium usque  
 (quod cinereum) rufa cum maculis nigris in extremis  
 plumis versus apices; Prona pars rufa cum lineis ni-  
 gris secundum longitudinem pennarum ductis. *Wind-  
 hover* dicitur quod aërem quasi ventilet, alas moti-  
 tando, unde in eodem loco diutiùs hæret.

Solent non raro *Tinnunculi* à nostratis cicurari, &  
 ad aucupium institui, aliarum *Avium* rapacium more.

*Cenchrus* seu *Miliaria* dicitur hæc *Avis*, quod pun-  
 ctis nigris *Milii* æmulis insignis sit. *Gesn.*

---

*Aves Rapaces diurnæ minores, macropteræ,  
 sylvestres & ignaviores, ab Accipitrariis  
 neglectæ.*

1. **B**uteo *vulgaris* sive *Tricrches* quod tres testiculos  
 habere vulgo sed falso creditus sit. Notæ hujus  
 Avis sunt, Color dorsi è ferrugineo nigricans, cum  
 maculis interdum albis in alarum vestitribus: Pecto-  
 ris ex albo flavicans, cum maculis oblongis ferrugi-  
 neis in singulis plumulis, non transversis sed deorsum  
 tendentibus. Rostrum quoque nudum, è cœruleo ni-  
 gricans, basi cute nuda lutea (quam *Ceram* à colore, ut  
 puto, vocant) recta. Cuniculis infesta est hæc *Avis*.

2. *Buteo apivorus* sive *vespivorus*, *The Honey-Buz-  
 zard*, A *Buteone* *vulgari* differt membranâ ad rostri  
 basin [*the Cere*] nigricante; capite cinereo, iridibus  
 oculorum flavis; pedibus brevioribus & crassioribus;  
 cauda longiore; zonâ cinereâ transversâ in alis &  
 cauda.

Insectis vicitat, & vesparum nymphis pullos nutrit.  
 3. *Balbusardus* *Anglorum*, *Haliætus* *Aldrov.* *The  
 Bald-Buzzard;* nonnullis, *the Sea-Eagle.* A *Buteone*  
*vulgari*

vulgari differt Occipite albo, unde nomen Anglicum *Bald-Buzzard*, i. e. *Buteo calvus*: 2. Pondere & magnitudine, quâ eum superat. 3. Alarum longitudine. 4. Digito anticorum extimo retrorsum versatili seu flexili, 5. Appendicibus seu processibus angularibus in superiore rostri mandibula. 6. Victu è piscibus.

A. 4. *MILVUS æruginosus Aldrov.* *Circus Bellonii, The Moor-Buzzard.* Ad Buteones potius quam Milvos referri debet, cum caudam non habeat forcipatam, quæ Milvi nota est. Colore undique tam prona quam supina parte ferrugineo seu Aquilino, excepto summo capite quod ex fulvo albicit; magnitudine infra Buteonem; pedibus longis, tenuibus, flavis, à congeneribus differt.

A. 5. *PYGARGUS Accipiter, Subbuteo Turn, The Ring-tail:* *Mas Hen-harrow seu Henharrier* dicitur, à laniandis gallinis. Ab aliis differt uropygio albo, unde nomen; torque plumularum arrectarum circa aures, seu corona, caput cingente.

A. 6. *Milvus, The Kite, or Glead.* Nota hujus characteristica, quâ solâ ab aliis Rapacium speciebus facile distinguitur, est cauda forcipata; ut alias conquerire non sit opus: est tamen pulchrè colorata. Pullis gallinaceis & anatinis infesta est. Alis expansis in aëre se librat: quin nulla vel rara alarum agitatione de loco in locum provehitur velut fluxu aut lapsu quodam. Hinc Anglis *Glead* dicitur à verbo *glide*, quod labi motu velut insensibili & tranquillo absque agitatione aliqua aut subsultu significat, ut flumen super planitatem sensim declivem.

6. *Milvus Brasiliensis CARACARA dictus Gaviaon Lusitanis Marcgrav.* Magnitudo Milvi: Cauda 9 diglonga, Alæ 14, quæ tamen nondum ad finem caudæ pertingunt. Color totius ravus cum albis & flavis punctulis. Cauda albo & fusco variegata est. Caput Accipitrinum, rostro adunco, mediocriter magno, nigro. Pedes lutei, unguibus semilunaribus nigris.

*Aves Rapaces brachypteræ, i. e. alis cauda  
brevioribus, seu ab extrema cauda cùm compo-  
nuntur multum deficientibus.*

**H**UJUS generis duas tantum præter *Lanios* species no-  
vimus. Eæ sunt,

1. *Accipiter Palumbarius* Aldrov. & aliorum, Astur  
Gallorum. The GOSHAWK. Magnitudine insigni quâ  
Buteonem vulgarem superat à *Niso* Recentiorum seu Acci-  
pitre *Fringillario* differt. Supina corporis pars tota fusca,  
*Buteonis* colore, prona alba, transversis lineolis nigris  
creberimis undulatis pulcherrimè variegata.

2. *FRINGILLARIUS Accipiter*, Recentiorum Ni-  
sus & Sparverius, The SPARROW-HAWK. Hujus mas  
The Musket nomine Gallico dicitur. Magnitudo ei Co-  
lumbæ. Pars corporis supina fusca ; prona lineolis trans-  
versis crebris, albis & fuscis ferrugineisve undulatis va-  
ria ; Alæ breves, quâ notâ ab antedictis omnibus excep-  
to præcedente distinguitur ; cauda longa, fasciis trans-  
versis (bars vocant) nigricantibus distincta. Columbas  
prædatur & vastat mirum in modum.

*His adde Aves Lanios dictas,*

3. *LANIUS* seu *Collurio cinereus major*, The  
greater BUTCHER-BIRD or Mattagasse, Eboracensi-  
bus & Derbyensibus Wereangel, nomine cum Germanis  
communi. Magnitudine est *Merulæ*, colore, exceptis  
alis & caudæ pennis, (quæ ex albo & nigro variæ) &  
ductu nigro à rictu oris utrinque per oculos ad occiput,  
cinereo. Ad Avicularum aucupium interdum institui-  
tur.

4. *LANIUS minor ruffus seu tertius* Aldrov. The  
lesser red-backt BUTCHER-BIRD. *Dorsum* huic ru-  
ffum, *uropygium* tamen cinereum, ut & *caput*. A rostro  
per oculos ultra aures linea lata nigra extenditur ; *Gula*  
& *pectus* alba.

A 5.

A. 5. **LANIUS** minor lineis albis & nigris semicircularibus variegatus, *The lesser variegated BUTCHER-BIRD.* Hæc species lineâ illâ nigrâ à rostro utrinque per oculos ductâ caret.

A. 6. **LANIUS** minor cinerascens seu ruffo cinereus cum macula in scapulis alba, *The lesser Ash-coloured BUTCHER-BIRD with a white Spot on each Shoulder:* The Wood-chat.

*Lanii* omnes rostro sunt longitudinis mediocris, aliquousque recto, in extremitate tantum adunco: & *barbulas* seu *setas* nigricantes circa rostrum habent: præterea *mandibula* superior prope curvaturam appendices duas angulosas obtinet inferiori superincumbentes, cui nullæ cavitates ad eas excipiendas insculptæ sunt, ut in *Subbutteone* & *Tiununculo*, &c.

Varietates omnes antedictas sæpius observavi; specie revera distinctas esse non ausim fidenter afferere, cum neverim quantum sexus in hoc genus Avibus colore inter se differant.

*Avium rapacium species adhuc tres apud D U  
T E R T R E & R O C H E F O R T invenio  
in Historia Naturali Insularum Antillarum.*

1. **M**anseny dictam formâ & pennis *Aquila*, sola magnitudine, (quâ ei cedit nec *Falconem* superat) discrepantem. Aves tantum imbellis, *Turdos*, *Hirundines marinas*, *Alaudas marinas*, *Turtures*, &c. prædatur. *Serpentibus* etiam & *Lacertis* vicitat.

2. Le Pescheur, *Piscator*, Præcedenti per omnia similis, nisi quod *plumas* in ventre *albas* habeat, & in summo capite *nigras*. Solos *pisces* invadit; nec *quadrupedia* aut *Aves* aggreditur, iisve ullatenus infestus est.

3. L'efmerillon *Grygry*, a voce seu clamore sic dicta, *Turdo* non multo major est, Supina pars tota rufa, ni-

gris maculis picta ; prona alba, armellino variegata. *Læcertulas* solas insectatur, sed interdum pullos parvos.

---

**Aves Rapaces minores exoticæ & anomalæ,  
Manucodiatae & Aves Paradisi dictæ.**

**H**A S non *Apodes* esse, ut olim vulgo persuasum, oculis latis testibus & Avibus integris alatis constat. Apud *Bontius* lib. 5. cap. 12. ‘ Tantum abest has Paradisi aves vel pedibus carere, vel aere nutririri, ut unguibus incurvis & peracutis parvas Aviculas, Chlorides Fringillas, & similes venentur, easque mox, sicut reliquæ rapaces Aves devorent : ut nec illud verum sit, eas nonnisi mortuas inveniri, cum & arboribus insideant, & sagittis à Ternacensibus figantur, unde etiam à celeri & reciproco volatu Hirundineo Hirundines Tarnacenses ab Indis vocantur.

Sunt autem Aves hæ aspectu pulcherrimæ, & singulari pennarum forma & situ ab aliis omnibus avibus diversæ ; siquidem è pectoris lateribus pennæ longissimæ hinc inde magno numero enascuntur, quæ tum ultra caudam in longum aliquousque procurrunt, tum in latum diffunduntur : & è nonnullarum, non tamen omnium, uropygiis, cirri bini seu pennarum scapi, plumulis seu villis destituti, enati, longissimè ultra reliquas pennas protenduntur.

Harum Avium 5 species describit *Aldrovandus* ; plures addunt *Clusius* & *Marcgravius*.

1. Corporis magnitudine & formâ *Hirundinem* pæne æquabat ; capit is plumagine purissimi auri colore egregiè relucente ; menti tegetibus colore ex cyaneo viridi serici instar splendentibus : *Alarum* pennæ fuscæ inter nigrum & rufum fulgebant : reliqui corporis fulvæ in rufum vergebant. Cirri illi gemini nigri.

2. A reliquis maximè diversa erat, quod binas in *uropygio* pennas haberet cæteras duorum palmorum longitudo excedentes; *linguam* rubicundam, longiulculam, acutam, *Picrum* non planè dissimilem. *Cirris caude* geminis longissimis carebat. *Pennarum* etiam colore à reliquis plurimum differebat.

3. Hippomanucodiata *ditæ* ab insigni trium dodrantum à principio rostri ad caudam extremam longitudine. *Rostrum* aduncum: color totius albus, præter collum & ventrem, quæ castanea. Vertex ferrugineus, quem colorem flavus exceptit, ut hunc viridis.

4. Seu *Cirrata*; rostro longissimo, nigro adunco: Capitis, colli, & alarum pennæ nigrescebant. *Cirrus* 3. dig. altus, rigidus, flavus, prope cervicem, velut ex levis compositus.

5. Seu vulgaris *Aldrov. Gesn.* quartæ speciei valde similis, nisi quod cirro careret, rostroque ab inferiore parte curvo & exiguo esset.

6. *Manucodiata Rex Mrcgrav.* *Hirundinem* corporis magnitudine æquabat: capite & oculis parvis, rostro a recto acuminato, pedibus satis crassis, unguibus lunatis seu aduncis: pennulis ad rostrum holosericeis, superne viridi & fusco mixtis, inferiùs nigris: Collum superne aureum, inferiùs viride ex aureo splendens: pes saturatè brunneum: reliquum corpus, alæ, & cauda eleganter brunnea. Pennæ longæ lateribus adnascentes, propè exortum aureæ fuere, reliquæ ex albo flavescentes. *Cirros* binos habuit prælongos ad exortum aureos, versùs extreum incurvatos & obscurè brunnos.

7. *Manucodiata altera, Marcgr.* Magnitudine *Hirundinem* superabat: *Caput* depresso, *Oculi* perexiui grani *Milii* magnitudine, *Rostrum* præcedentis simile. Ad exortum rostri pennulis nigerrimis holosericeis ornata erat. *Guttur* totum & collum inferius ad oculos usque & genas pennis holosericeis è viridi aureis, splendentibus vestitum; caput superius holosericeis itidem obscurè luteis, sed ad tactum durioribus. Collum cingunt pluinæ breves, holosericeæ, ex aureo splendentes. *Dorsi tegetes* è

flavo aureæ splendentes, inferius dilutè ex albo brunneæ.  
*Alæ & cauda* brunneæ.

Hæ duæ descriptiones vel unius & ejusdem speciei *Avis* sunt, vel duarum valdè similium, cùmque prima *Aldrovandi* in multis convenient.

8. *Paradisaea avis* majoris generis *Clusii* à precedente non multum differt, ut eandem planè putem; vertice à rostro ad oculos & collo holosericeis pennulis flavi coloris superna parte, infima fuscis vestito.

9. *Paradisaea minoris* generis *ejusdem*, primæ *Marcgravii* eadem videtur. Guttur tamen pennis viridibus splendentibus tectum erat ad modum *Aldrovandine* primæ.

10. *Rex Avium Paradisearum* majoris generis *Clus.* Aliis *Manucodiatis* minor erat. Alæ toto aviculæ corpore longè majores. Rostrum album, unciale, ima parte villis rubris, ceu staminibus holosericeis, recta, ut & tota capitinis parte anteriore. Media pars capitinis circa oculos parvis maculis nigris punctata erat. Collum cum pectore pennulis saturè nigris, velut holosericeis staminibus, tectum. Supina pars tota ferè, [dorsum, alæ, cauda] unicolor erat, è flavo fusca. Sub pectore velut torque atro digitum minimum lato insignita erat. Pennæ ventrem tegentes albæ, sed quæ alis proximæ nigræ. Cirri caudæ tenues, nigri, extremo in orbem convoluti, & ab uno latere villis tenuissimis prædicti, supina parte viridi saturo colore splendentibus, pronâ fuscis.

Cæterū Avium Paradisearum duo genera sunt, referente *Clusio*, unum *Majorum* quæ elegantiores, cuiusmodi in insula *Arcu duntaxat* reperiuntur alterum *minorum* & minus elegantium, quas insulæ (*Papue insulæ Cilolo vicinæ*) producunt. Hæ nervis illis prælongis seu *cirris* ex *uropygio* excuntibus carent, quibus alterum genus donatur.

Utrique generi suum *Regem* esse aiunt, peculiarem & colore differentem, qui supra reliquas perpetuò sublimius volat.

**M A N U C O D I A T A** *Zeylanica*, cauda longissimâ forcipata bipenni, *Walukora* *Zeylanensibus* i. e. *Gossipium* *surens* *Mus. Leyd.*

**A V I B U S R A P A C I B U S** diarnis congener **C U C U L U S**, Κόκκος Græcis.

*Aucupes nostri Bononienses* (inquit Aldrovandus) uno ore affirmant & *Cuculos* majores reperiri, & minores; & illos præterea duorum esse generum, sed quæ solius coloris differentia inter se distinguuntur. *Minores* verò à majoribus non alia ratione quàm magnitudine discrepare.

Majoris utriusque icones dat Aldrovandus: minorem nunquam vidit.

Prima Aldrov. à nostrate *Cuculodiffert* figura *Rostri* Palumbi simili, cùm nostratis rostrum *Turdi* aut *Merule* rostrum, potius referat: deinde lineis transversis in pectore & ventre interruptis, cum in nostrate integræ & continuæ sint.

**C U C U L U S** nostras seu Aldrov. secunda, *The Cuckow: Rostro & unguibus* est minoribus & debilioribus quàm cæteræ rapaces. Notæ ejus characteristicæ sunt *Nares* rotundæ supra rostri superficiem eminentes, cujusmodi in nulla præterea ave hactenus observavimus. Avium ova sorbere dicitur, aut pullos duntaxat tenellos nec dum nido egressos prædari; ideoque exacta æstate, cùm ejusmodi victus ei non amplius suspetit, torpere & obdormire creditur. Verùm nos in dissecti ventriculis Erucas aliisque insecta invenimus, & aviculas Cuculi pullos insectis nutrire certissimum est: non ergo ob defectum alimenti vel se abscondit, vel alio transfert, quacunque tandem de causa id faciat: fortè quia frigoris hybernī minùs patiens est.

In Ave Anno 1693 observata *Prona pars* corporis albocabat cum aliqua flavi tinctura lineis transversis nigricantibus, in gutture & summo pectore crebrioribus, inferius rarioribus, variegata, *Accipitrum* modo: *imus* venter lineis hujusmodi carebat. *Supina pars* tota cum capite & alis, lineis seu ductibus fulvis & nigris transversis pulcherrimè distincta. In summo capite maculæ aliquot albæ; quin & apices pennarum in imo dorso supra uropygium albent: interior etiam limbis exteriorum alæ remigum

maculis albis majusculis transversis pingitur: *Cauda* prælonga, ductibus transversis nigris & fulvis, maculisque ad scapum & extimos pennarum margines albis varia, 8 pen-nis composita, mediis duabus longissimis, exterioribus utrinque ordine brevioribus. *Tibiæ* brevissimæ, & ad pedes usque plumis velatæ. *Pedes* debiles flavicantes, unguibus propemodum concoloribus. *Digitæ* 4, exteriores duo postici seu retrorsum siti, medii anteriores; interiores autem exterioribus breviores & minores sunt. *Rictus oris* amplius; *os* intus croceum 2. *Cuculus Indicus*. *Mus. Leyd.*

---

### Aves Rapaces nocturnæ.

**C**apitis & oculorum magnitudine & protuberantia, quodque noctu evolent & prædentur à reliquis Rapacibus diurnis differunt.

---

### Noctuæ auritæ Horn-Owls, id est, Cornutæ, Anglis.

1. **B**UBO. Cujus tres species proponit Aldrovandus. Noctua omnium maxima, aut *Anserem* ut quæ *Aquila* adæquet; Secunda à *Gesneriana* seu prima differebat cruribus minus torosis supra genu, & gracilioribus; Colore per totum corpus fulvo seu ferrugineo ex cinereo, pectori subnigris maculis in longum ductis instar *Accipitrum* palchrè minutimque distincto, nec colores in dorso respondent. Tertia *Aldrov.* cum secunda in omnibus convenit, præterquam tibiis, quas minime hirsutas habet, sed, quem-

quiemadmodum & pedes, debiles. 2. *Bubo Brasiliensis Marcgravii* Jacurutu dicta adeò similis est huic Avi, ut eandem dicere non verear.

Duas hujus generis Aves vidimus in *Ornithotrophio Regio* in vivario S. Jacobi prope *Westmonasterium* Aquilæ magnitudine, *pedibus* ad ungues usque hirsutis, iridibus oculorum ex rubro flavicantibus ; colore totius Bœtico, *Ardeæ stellaris* simili, lituris longis nigris deorsum per medium plumarum ductis : lineis circa ventrem transversis.

A. 2. OTUS five *Noctua aurita*, *Asio Latinis* Plinio, *The Horn-Owl*. A pennulis in capite extantibus, cornuum aut auricularum æmulis, ita dicitur. Hanc D. Jephson ex agro Eboracensi ad nos transmisit : cæterum in Anglia rarer est.

3. Scops Aldrov. Omnia rapacium nocturnarum prope minima. *Aures* dictæ seu *cornua* unâ duntaxat pennula constant.

*Noctuæ non auritæ, seu pennulis aurium instar extantibus carentes.*

A. 1. ALUCO minor Aldrov. *The common white Owl, or Barn-Owl*, and by some *The Church-Owl*, quo nomine quandam *Noctuæ* speciem *Belge* etiam appellant. *The white Owl*, i. e. *Noctua alba* dicitur à colore albo qui in eâ præcipue eminet, quamvis maculis & lineolis fulvis pulchre variegata sit.

A. 2. STRIX Aldrov. *The common brown or Ivy-Owl*, à stridore etiam *Screech-Owl* dicta. Differt à præcedente colore obscuriore, è ferrugineo & nigricante vario : quodque extima alæ penna exigua sit, & plus palmo brevior tertia quartâque ; secunda digito brevior tertia ; quarta & quinta omnium longissimæ ; cùm in illa secunda & tercia longissimæ sint, extima autem utrâvis vix digito dimidio brevior.

A. 3. **STRIX** cinerea, fortè *Ulula* Aldrovandi, *The Grey Owl*. A præcedente *differit*, quod hæc cinerea sit, aut grisea, ut vocant, illa fusca aut brunnea; quod hæc maculis longis in pectore donetur, quibus illa caret; quodque interior peplus circa caput tantum fuscus & albo varius sit.

4. **ULULA** Latinis, *Owl* sive *Howlet* Anglis, Gallis *Hulot*, Germanis *Ul* sive *Eul* à voce quam edit lugubri & flebili proculdubio denominata est hæc Avis, siquidem *Howl* Anglis & Germanis idem valet quod *ululo* & *ejuto* Latinis. *Owl* autem *Anglis* generale nomen est omnium Avium nocturnarum. *Ulula* Aldrov. *Strix nostra* cinerea esse videtur.

5. *Ulula* Gesneri, *Gallinae* magnitudine aut supra; colore ruffo nigro resperso; pinnulis inter oculos & dorsum multis, densis, cinereo fere colore: *cruribus* albicantibus, punctis conspersis lividis, nobis incognita est.

6. **NOCTUA** minor. *The little Owl*. Parvitate sua, ut quæ *Merulâ* minor sit, nec *Alaudam* magnitudine multum excedat, ab aliis nocturnis Rapacibus Avibus differt. In *Sylvis* *Austriacis* invenitur, sed rarius; *Romæ* etiam venalem vidimus.

7. *Noctua Brasiliensis* CABURE dicta Marcgr. Magnitudo *Turdelæ*, Rostrum & oculorum irides flavæ; *Crura* brevia hirsuta; *ungues* nigri; *cauda* lata, umbræ dilutæ, colore albo undata. Pars *supina* tota, caput, dorsum, alæ Umbræ pariter dilutæ colore, maculis albis, in capite & collo minimis, in aliis majoribus, variegata. *Pectus* & *venter* albicant, Umbræ dilutæ maculis variegata.

*Aves nocturnæ anomalæ, Cuculi colore, rictu Hirundinis apodis, CAPRIMULGUS dictæ.*

A. 1. **CAPRIMULGUS** nostras *vulgaris* & *Aldrov.* Salopiensibus, *The Fern-Owl*, Ebora-censibus, *The Churn-Owl*, à strepitu quem inter volandum edit.

edit. *The Goat-sucker.* Pulcherrima est avis, corporis figura & coloribus *Cuculo* quam *Noctua* similius. *Rostro* minimo nigro, *Rictu oris* ingenti, *Pedibus* brevibus exilibus ab aliis quibuscumque *Noctuis* abunde distinguitur. In ventriculo *semina* & *scarabeos* invenimus. Est autem Avis anomala, nocturna quidem, verum cum Rapacibus nullo modo conveniens. *Caput* proportione corporis magnum, verum multo minus quam reliquis Avibus nocturnis. In *sylvis* praecepit *montosis*, in *Pecco Derbiensi*, *Eboracensi* comitatu, *Salopia*, & alibi invenitur.

2. **C A P R I M U L G U S Americanus**, *I B I J A U* Brasiliensibus, *Noitibo* Lusitanis *Marcgr.* Magnitudo *Hirundinis*; *Caput* latum & depresso; *oculi magni*, pupillâ ellipticâ, iride flavescente. *Rostellum* minimum, *os amplusimum*, *lingua* minima. *Crura* alba parva. Mediis *digitii unguis* velut pinnatus. Pars supina nigricata punctulis albis inspersis. *Pennæ* in toto inferiore corpore ex albo & nigro mixtae, ut in *Niso*. Reperitur & species hujus magnitudine *Noctuæ*.

3. **G U I R A Q U E R E A** *Brafilensis* ad *Caprimulgum* accedens *Marcgr.* Magnitudo *A laudæ*. Capitis, oculorum, oris, rostri figurâ ad præcedentem accedit. *Setas crassas* habet ad latera rostri. *Alæ longæ* sunt, sed *cauda* multo longior, cum in præcedente Alæ ad caudæ extremitatem fere pertingant; duæ in caudæ pennæ reliquis longius excurrunt. Tota avis ex fusco cinerei coloris est, cum maculis obscurè flavis aut albicantibus mixtis, more *Nisi*. Circa totum collum ponè caput annulum habet obscurè aureum. *Crura* cinerea seu fusca. Reliqua vide apud *Marcgravium*, nam hæc ad distinctionem sufficient.

An Aves hæ nocturnæ sint necne, Autor non prodidit, utcunque externa specie *Caprimulgum* exactè referunt. Cum autem *Caprimulgi* & *Hirundines apodes* in multis convenient, annon Aves hæ Brafienses *Hirundinei* potius geueris sint considerandum. Pedum figura *Hirundini apodi* non respondet.

Aves *Rostro & unguibus aduncis frugivore*,  
seu Psittaci.

**P S I T T A C I** capite sunt prægrandi, *Rostro ac cranio duro*; Coloribus pulcherrimis, *unguis aduncis, digitis binis ante, totidem retro sitis*. *Rostro inter scandendum* ceu hamo injecto corpus sublevant. *Lingua lata, Cucurbitæ seminis figuram referens, notante Scaligero*. Humanæ sermonis imitatione olim celebres. In omnibus quas hactenus observavi *Psittacis* nares rotundæ fuere, in superiori parte mandibulæ superioris proræ plumaginem sitæ, sibique vicinæ.

*Psittaci* magnitudinis ratione in tria genera dividi possunt, nimirum in maximos, mediocres, minimos. **Maximi Corvo nostrati**, aut etiam *Caponi* bene saginato magnitudine pares sunt, caudâ prælongâ, *Macaos & Cockatoons Anglicè dicti*.

**Mediocres & vulgatissimi**, *Columbo* domestico æquales sunt, aut paulò majores, minorēlve, cauda brevi, *Parrots & Poppinjays* nostratisbus.

**Minimi**, *Merula* aut *Alaudæ* magnitudine, caudâ longissima *Perokeets* dicti, *Peroqueto Italis*.

---

*Psittaci maximi Macaos & Cockatoons dicti.*

1. **P S I T T A C U S maximus Cyano-croceus** Aldrov.  
**ARARAUNA** Brasiliensibus Marcgrav. Canide Lerii. Magnitudo Caponis bene saginati; Longitudo bicubitalis. *Rostrum nigrum, prælongum. Cutis circa oculos nigris pennis variegata; Vertex planus & viridis: Guttur veluti torquis nigra ambit. Prona pars tota crocea; supina pulchrè cœrulea. Cauda duos dodrantes longa*

longa. *Crura* brevissima, *tibiæ* & *pedes* fuchi, *unguis* nigris.

2. *PSITTACUS maximus* alter Aldrov. Superiore nihil minor est, eadémque longitudine; *Rostro* breviore, *mandibula* superiore alba, inferiore nigra. Albet oculorum regio & tempora. Totum corpus, alæ incipientes, & cauda tota pulcherrimè punicea; ut & alarum remiges parte interiore; exteriore saturè cœruleæ sunt, una cum uropygio inferno. Remigum tegetes secundo in aliis ordine luteæ sunt, puniceis marginibus, cœruleo velut ocello in apice ornatæ. *Cruscula* brevia & *pedes* fuchi.

In *Psittaco* hujus generis, quem *Londini* observavimus, Alæ & cauda miniaceæ, cœruleo & flavo coloribus variæ erant; caudæ medie duæ pennæ reliquas longitudine multùm excedeant, in acutos mucrones desinentes, colore cœruleo.

3. *ARARACANGA* *Maregr.* ab hac non diversa avis esse videtur: Notæ enim pleræque conveniunt; differt quòd per medietatem alæ pennis rectæ sunt viridibus, extremâ medietate cœruleâ.

4. *MARACANA* Brasiliensibus *Maregr.* *Psittaci species* est, sed major: plumæ totius ex gryseo subcœrule-scent. Clamat ut *Psittacus*, fructus amat, *Murucuia* in primis: nec plura de ea habet.

5. *MARACANA* Araræ, id est, *Macai* species minor, ut quæ *Psittacum* magnitudine non excedat, *Arara* tamen figurâ est, cauda longa simili, rostróque, quod nigrum, & cute circa oculos, quæ alba, plumulis nigris punctulata. Caput, collum & ale saturatè virides, vertice tantùm dilutiore & cœrulecente. Alæ & cauda supernè virides, infernè cœruleæ, extremitatibus pennarum obscure cœruleis. In exortu cujuslibet alæ maculam habet miniatam, supra Rostri exortum fuscam.

Alias *Psittacorum* majorum species describit *Clusius* in exoticis.

Psittaci mediæ magnitudinis Parrots & Pop-  
pinjays Anglis dicti.

1. **PSITTACUS** *albus cristatus* Aldrov. Colore in toto corpore albo, crista in capite, caudâ surrectâ, magnitudine *Columbae* domesticæ majori pari, pedibus subluteis, ab aliis *Psittacis* facilè discernitur.

2. **PSITTACUS viridis, alarum costa superna rubente** Aldrov. Præcedenti magnitudine par est, *Rostro* superius, extremo nigro, post subcœruleo, reliquo rubicundo ; inferius albo ; *iride oculi* crocea. *Vertice luteo*, reliquo corpore virente, superne saturatiùs, inferne dilutiùs ; *costa superna* alarum rubente. *Caudâ breviusculâ*, inferne ad latera rubra in longum macula insigni, supernè flavescente. *Tibæ & pedes* cinerei.

Hæc species apud nos omnium est frequentissima ; in illis quos *Londini* descripsi circa oculos *circulus* erat albus ; & appendix utrinque in superiore *Rostri mandibula*, cui in inferiore crena respondebat.

3. **PSITTACUS poikilorhynchos** Aldrov. *Rostrum* superius, in superiori parte, viridicœruleum, ad latera ochræ colore, in extremitate macula transversali candida notatum ; inferius rostrum circumcirca coloris plumbei, in medio lutescit. *Vertex aureus*, reliquum corpus vi- ride, supina parte obscurius, prona dilutius. *Alæ & cauda* viridi, amethystmo, nigro, miniaceo obscuro, coccineo luteo coloribus variæ ; colorum dispositionem in alis & cauda apud Autorem vide. *Tibæ breves, pedes* plumbei, *ungues* nigri.

4. **PSITTACUS viridis melanorhynchos** Aldrov. Ad rostri initium, in vertice & sub gula color cœruleus ad viridem tendit. Supina pars tota intensius viret, costa duntaxat alæ, quæ corpori adnectitur, extrema coccineo rubet, uti & remigum extrema : pars prona lutea, & è luteo viridis, uropygio inferius coccineo.

5. **PSIT-**

5. *Psittacus leucocephalus* Aldrov. *Rostrum* & pars capitis rostro continua alba. *Gula* & alarum costa suprema colore cinnabarino rubet. *Medium pectus* inter femora obscurè rubescit. *Occiput, collum, dorsum, alæ, uropygium* supernum saturatè virent; *Pectus* & *femora* dilutiùs. Posset hic psittacus ob multiplicem colorum varietatem (qui non pauciores quam septem) ~~notum~~ seu *verficolor* appellari. Horum autem præcipiuus est viridis.

6. *Psittacus verficolor* seu *erythro-cyaneus* Aldrov. *Rostro* est minùs grandi quàm præcedentium, subnigro; *Capite, collo, pectore* cœruleis; *vertice summo luteo*: oculorum regio albicat: *Venter* viridis, *uropygium* luteum; *summum dorsum* dilutè cœruleum: *Alarum tegetes* viridi, *luteo* roseo perfusa sunt.

7. *Psittacus cinereus* seu *subcœruleus* Aldrov. *Columbae domesticæ* magnitudine est, *Rostro* nigro. Color corporis totius cinereus obscurior: *Cauda* rubra, colore cinnabarino seu miniaceo, admodum brevis, & vix ultra extremas alas protensa. Oculos cutis nuda candida cingit. Hujusmodi omnes ex *Mina* civitate S. Georgii adferri aïunt. *Londini* plurimos vidimus.

8. *Psittacus erythro-leucos* Aldrov. Magnitudine *Macaws* dictas, æquat vel etiam superat, verùm *cauda* ei brevis est. *Corpore* toto obscurius candidat, ut *cinericeus* videatur. *Rostrum* nigrum. Postrema tergi pars, *uropygium* cauda tota, alarum remiges miniaceo tinguntur.

9. *Psittacus coccineus* Orientalis, *alis ex viridi & nigro variis*. Magnitudine *Merulam* superat. *Corpus* totum coccineum: *Alarum vestitrices* virides, remiges nigrae, pinnulis exterioribus viridibus, inferiùs cremesinis: *costa* alarum flava. *Cauda* ima medietate flava, summa luteo-viridis: *Annulus plumarum* viridum crura supra genua cingit. *Rostrum* flavum, ut & oculorum irides. *Crura* brevissima nigra. *Londini* ex *India Orientali* allatum vidimus.

10. *Psittacus pusillus viridis* Æthiopicus Clus. Magnitudo *Fringilleæ*. *Corpus* totum viride, in ventre dilutiùs

dilutiūs, in dorso saturatiūs. Alarum *remiges* ab altero latere saturatiūs virides, ab altero & tota supina parte fuscæ. *Caudæ* pennæ ea parte quâ uropygio infixæ colore flavo-viridi, deinde rubro eleganti, demum nigro, postremò viridi tinctæ. Verticis supra rostrum & totius gutturis tegetes plumulæ rubio eleganti & florido colore imbutæ. *Rostrum* crassum & firmum, subrubens: *Crura* semunciam vix longa, cineracea. *Ungues* albi & satis longi.

Cùm edebat, cibum altero pede non tenebat, ut alii *Psittaci*, sed rostro carptim eum arripiebat.

*N. B.* Fæmellæ senescentes, (quod valdè notabile) vix edere volebant, nisi cibum jam à mare carptum, & aliquandiu in prolobo retentum, & quasi coctum rostro suo exciperent, ut *Columbarum* pulli à matre ali solent.

11. *PSITTACUS* elegans *Clus. exot.* Magnitudo *Columbae*. *Collum* & *pectus* versicolores pennæ, rubescens coloris, & extima parte cœrulei elegantissimi obsidebant, quas cùm irascebatur surrigebat, ut cristatus quodammodo videretur. *Ventris* pennæ similis ferè erant coloris, fusco tamen insuper suffulæ; *dorsi* virides, alarum *remiges* subcœruleæ, *cauda* viridis.

### PSITTACI majores seu mediæ magnitudinis Marcgravii.

1. *A JURUCURA*. Supra rostrum in capite mitellam habet eleganter cœruleam. Guttur, latera capitis & superior illius pars eleganti flavo vestiuntur; totum corpus lærè viridi. In alarum extremitatibus pennæ una medietate nigræ, altera croceæ, partim etiam in extremitate cœruleæ, partim hinc inde virides. *Cauda* viridis, sed quando illam explicat fimbriata nigro, rubro, cœruleo. *Rostrum* ex cinereo fuscum, pedes cinerei. Oculorum irides aureæ.

2. *Priori* similis, paulò aliter colorata ; *mitella* namque in capite flava albedine admixta, supra oculos & in gture clare flava est. *Circa Rostrum* superius macula est thalassina.

3. *A J U R U C U R U C A* *Mitella* ex cœruleo & paucō nigro mixta est, inque ejus medio macula flava, *In gture* macula est cœrulea. *Pectus, alæ, dorsum* saturatiūs virent, extremæ alæ & cauda dilutiūs. Extremitates pennarum alæ flavæ & rubræ & Indico colore mixtæ. *Rostrum* superius cinereum, in extremitatibus nigrum.

4. *P A R A G U A* *Pſittacus* est niger, pectore, dorso, & ventre anteriore insigniter rubro ; *iridibus* oculorum rubris ; *Rostro* & *pedibus* obscurè cinereis.

5. *T A R A B E*. Major est quam præcedens, *capite* rubro & pectore, atque initio alarum, alias viridis : *Roſtro* & *pedibus* obscurè cinereis.

6. *A J U R U C A T I N G A*. Magnitudo pulli gallinacei mediocris ; color viridis ; oculi rubri, & circa eos cutis alba, ut in plerisque ; *Rostrum* & *crura* alba. *Cauda* longa.

7. *A J U R U P A R A*, in totum convenit cum præcedente, sed minor est.

### *Pſittaci minores, Gallis Perroquets dicti.*

1. *P S I T T A C U S* *torquatus macrouros* Antiquorum Aldrov. Longitudo ſequidodrantalis, *Rostrum* miniaceum : *Iris* oculi lutea : Color torius viridis, superne plenior, subtus dilutior. *Torquis* miniaceus collum cingit, ad quem à roſtro inferiori sub mento linea nigra duicitur. *Alarum* pennæ extimæ in ſuperiore parte rubrâ notâ diſtinguuntur.

2. *P S I T T A C U S* *minor macrouros, totus viridis* Aldrov. Totus Turdo non major est ; *Roſtro* rubro ; *pedibus* & *cruribus* rubicundis aut carneis præter aliorum omnium normam. *Iris* oculorum crocea.

3. PSITTACUS erythrochlorus macrouros *Japonicus* Aldrov. Hic Aldrovando ex iconē pictā descriptus est.

4. PSITTACUS erythrochloros cristatus Aldrov. *Alis erat, cauda, ac crista coloris rubri, cætera viridis. Crista referebat Psittacum cristatum; ex 6 pennis constabat, tribus majoribus, minoribus totidem. Oculorum iris rubra,*

5. PSITTACUS parvus Bontii. Magnitudo *Alaudæ*; rostrum griseum, ut & guttur. Irides oculorum argenteæ. Verticis plumas egregias crista more erigit. Venter inferior, caput, collum, cauda superiùs pulchrè rubicant. Pectus & inferiores caudæ pennæ dilutè rosaceæ, quæ elegantissimè in viridem ex albedine & viridi mixtu finunt. Ale potissimum virides, rubicundis pennis intertextis, quatuor medietas luteo & rosaceo colore hinc inde variegatur.

Psittaci minores Marcgr. *Tui Brasiliensibus,*  
PARAKEETS.

1. PRIMÆ Magnitudo Hirundinis, color in totum viridis. Rostrum nigrum.

2. TUI APUTEJUBA. Priori par, color idem in pennis & rostro, differt circello ex pennis circa oculos luteo, macula in capite magna ex pennis Auraici coloris.

3. TUITIRICA. Majores sunt Guireensibus: color idem qui præcedenti. Rostrum coloris incarnati. Pedes cœrulescunt.

4. Quarta Sturni est magnitudine, ejusdem cum secunda coloris, sed cauda breviore.

5. JENDAYA, Merule magnitudine, rostro & cruribus nigris; iridibus oculorum aureis. Caput, collum & pectus flavum luteo intermixto. Dorsum, ale & cauda viridis thalassinο mixto.

6. TUETE. Magnitudo *Alaudæ*, cauda in totum dilutè viridis, initio tamen alarum egregiè cœruleo: oræ etiam pennarum omnium in aliis cœruleæ; in dorso etiam ad

ad exortum caudæ macula cœrulea. *Rostrum* incarnatum. *Cauda* præter normam hujus generis; ad secundum ergo genus potius pertinet.

7. *TUIPARA Tupinambis*, magnitudine *Alaudæ*, in totum dilutè viridis, ut præcedens, *rostrum* pariter incarnato, *cruribus* griseis; *cauda* etiam breviore. Differt maculâ in fronte prope rostri exortum semilunari miniatâ; cujusmodi & inferiùs habetur in cujuslibet alæ medio, lutei seu uranici coloris. *Nidificant* in cumulis à formicis relictis qui in arboribus reperiuntur.

8. *ANACA Brasil*. Magnitudine *Alaudæ*, *Rostro* fusco: in vertice epatici coloris pennæ, circa oculos brunni: *Guttur* cinereum: *cellum* superius & latera viridia: *Venter* ex brunno rufescit: *Dorsum* viride maculam habet dilutè brunnam; cujus coloris & cauda est. In alarum initio macula sive fimbria sanguinea est; reliquum alarum viride, extremitas thalassini coloris. *Crura* superiùs viridibus vestita pennis, inferiùs cute cinerea, unguibus nigricantibus.

9. *QUIUUBATUI*. Magnitudo *Tuiaparæ* par; flavus totus, verùm extremitas alarum obscurè viridis: *Rostrum* gryseum: *Crura* coloris incarnati.

Pleræque hujus generis Aves colore viridi sunt, caudâ etiam longissimâ unde sexta & septima species è *Marcgravianis* ad medium potius genus pertinent, non obstante magnitudine, ob caudarum brevitatem.

10. *Psiittaco congener ANI Brasiliensem* *Marcgrav.* *Avis* est *Turdelæ* magnitudine, totaliter nigra, pennis, rostro, oculis, pedibus. *Caudam* erectam gerit, 6 digitos longam. *Rostrum* altum. latum, digitum aut paulò plus longum: inferior pars directa ferè, superior alta, lata, semilunaris figuræ & compressæ, ita ut acumen ferè superiùs habeat. *Crura* & *pedes* ut in *Psiittacis*. In *sylvis* frequens est.

Notandum autem *Psiittacos* ferè omnes *crura* brevia & exilia habere, contra quām *Rapaces* pleræque *zamferas*.

*Aves Rostris rectioribus minisque hamatis maxime, singulares & sui generis, ob corporum molem & alarum brevitatem volandi impotes.*

1. **S**TUTHIO-CAMELUS sive *Struthio*. The OSTRICH. Avium omnium maximus est, si unum forte *Emeu* excipias, quæ quamvis proceritate ei multum cedat, corporis tamen mole æqualis est. Capite parvo depresso & fere *Anserino*; pede bifido camelii instar; & pennarum forma quæ ex villis crissipis & disjunctis constant, ab aliis omnibus avibus abunde distinguuntur. *Ova* parit maxima, 15 interdum libras pendentia, quæ in arena condita Solis duntaxat calore foveri dicuntur.

2. *Struthio-camelus Americanus*, NHANDUGUACU Brasiliensibus, EMA Lustani Marcgrav. Aliquantò minores sunt *Africanus*, & *Emeu* seu *Casoari* similiores quam *Struthioni*; quatuor enim in pede digitos habent, tres anterius, unum posterius, crassum, rotundum. Caudam non ut in illo cristis præeditam; sed plumas gryfeas per dorsum expansas ad anum usque. Caput *Anserinum* ut in *Struthione*.

3. *EMEU* seu *EME* Aldrov. Clus. Nieremb. *Emeu*, vulgo *Casoaris Bontii*. *Emeu*, quibusdam dictus *Caserius* Wormii, The CASSOWARY. Corona ei in medio capite cornea. Caput & collum nuda seu potius rarissimis obsita, cutis colore è cœruleo purpurascente, exceptâ solùm inferiore postici colli parte miniacea. Anteriorius in ima colli parte lobuli duo carni nudi ad pectus dependent. Rictus oris amplissimus. Rictum 4 fere digitos longum, crassitie mediocris, rectum. Crura crassa valida, quam *Struthienis* breviora. Digihi in pede tuis. Antici omnes, nam postico caret. Alarum quedam rudimenta

dimenta obtinet, verius quam alas, & tantum scapis pennarum teretibus parvis, *Hiftricis* calamis similibus, pinnulis plumosis aut nullis, aut attritu deratis. *Caudanulla*: Corpus grande, *Struthionis* par, *plumis* fuscis seu nigricantibus rioris texturæ vestitum, quæ è longinquo intuitibus pili potius quam plumæ videntur. Avis facile mansuetus. *Indie Orientalis* incola est. Sub pectore callum habet ut *Camelus*, cui inter quiescendum innititur & incumbit.

3. **C Y G N U S cucullatus** Nieremberg. *Gallus gallinaeus* peregrinus Clus. *Dronte* Bontii, *The Dodo*. In Insula Batavis Mauritii dicta invenitur. Magnitudine est inter *Struthionem* & *Gallum Indicum* media. Capite magno, membrana quadam cucullum referente tecto: *oculis* magnis nigris: *Rystro* prælongo valido ex cœruleo albicante, exceptis extremitatibus, quarum inferior nigricat, superior flavescit: Rictu patulo: *corpore* obeso rotundo, quod mollibus plumis griseis *Struthionum* vestitur. Ab utroque latere loco Remigum, exiguis alis plumatis, ex flavo cinereis, & ponè uropygium loco caudæ quinis pinnulis crispis ejusdem coloris, decoratur. *Cruribus* est flavescentibus crassis, sed admodum curtis; 4 *digitis* pedis solidis longis quasi squamosis, totidem *unguibus* nigris validis munitis incedit. Cæterum tardigrada est avis & stupida, quæque facilis præda sit venatoribus. Hactenus *Bontius*.

*Aves rostris rectioribus minùsque hamatis &  
Primò Majores,*

*Rostris crassis, longiusculis rectioribus donatae.*

**H**Æ vel vietu ex insectis & frugibus promiscuo untuntur, nonnullæ etiam carnivoræ sunt & rapaces, morticinis præcipue & cadaveribus inhiantes; vel infectis

## 38 SYNOPSIS METHODICA

tantum vescuntur. Illae vel corpore sunt unicolorē ferē (nam datur in his aliqua colorum diversitas quamvis non magni momenti) nigricante, nimirum *Corvinum* genus dictum à *Corvo* ave notissima, & ex *Europeis* maxima, hujus generis: vel corpore vario seu diversicolore, voce garrula quas *Picas* dicimus, à *Pica varia*, ave vulgatissima. Hæ [sci. *Insectivoræ*] unius omnes & ejusdem familiæ sunt, & *Pici* denominantur.

Notandum tamen quodd cùm *Picos* omnes insectivorus tantum esse affirmamus, Aves propriè sic dictas intelligimus: sunt enim Aves nonnullæ, quas ad hoc genus (*Picorum* nomine latè sumpto pro Avibus omnibus quæ arbores pariter scandunt) retulimus, quæ frugibus quoque vescuntur: ut v. g. *Picus cinereus* dictus, *Picus maurus*, &c.

*Pici* autem genuini multis & insignibus notis ab aliis omnibus Avium generibus distinguuntur. 1. *Rostro* recto, duro, robusto, angulo ad arbores perforandas accommodato. 2. *Linguâ* longissimâ, terete, in spinam osseam acutam rigidam, utrinque dentatam desinente, ad vermiculos, cohos, formicas aliisque insecta lacinanda; quam longissimè exserere & retrahere possunt pro libitu, duarum cartilaginum & muscularum ope, miro artificio. 3. *Cruribus* brevibus at admodum robustis, ad arbores scandendum, iisque fortiū adhærendum, dum foramina terebrant. 4. *Digitis* in pedibus binis ante, totidem retro sitis, ad eundem usum. 5. *Caudâ* rigidâ & durissula, deorsum etiam inflexâ, ut ei innitantur & se inter scandendum sustentent, unde pennæ ejus extremæ persæpe fractæ & detritæ sunt. *Cauda* decem duntaxat pennis componitur, quod paucis præterea avibus convenit. 6. *Appendicibus* intestinorum seu intestinis cœcis carent, quod huic generi peculiare est, nec ulli præterea, quod novimus Avi convenit, è quadrupedibus soli *mustelino* seu *vermineo* generi; quod cùm *D. Willoughby* Ornithologiam ederem, nesciebam. 7. *Incælis* duntaxat vescuntur, quod antea adnotatum.

Ex his notis prima & quinta *Iyngi* avi vix convenient, quæ tamen ob reliquas notas communes his Avibus omnino annumeranda est.

*Corvini*

---

## C O R V I N I generis Aves.

**H**UJUS generis notæ sunt *Rostrum* magnum crassum, rectum aut modicè inflexum, *vittus ex carne*, Infectis & frugibus promiscuus; nonnullæ etiam carnivoræ tantum sunt, morticinis præcipue & cadaveribus vescentes, unde à nonnullis *Semirapaces* appellantur, ut *Corvus* & *Cornix*; aliæ frugivoræ ut *Cornix frugilega*.

A. 1. **C O R V U S**, *The Raven*; Κόραξ. in hoc genere maxima est, colore undique nigro cum quodam splendore cœruleo. Hic agnos recens editos sæpiissime dilaniat & devorat. Oculos autem eorum primùm rostro appetit & eruit; quin & aves invadit, & à nonnullis ad auncupium instituitur. Avis admodum longæva esse creditur.

A. 2. **C O R N I X**, *The common or Carrion-Crow*. Κοράκης. Hæc carnivora est, & morticinis plerunque vescitur, quorum tamen inopiâ etiam sata depopulatur. Corvo dimidio minor, aliâs ei perquam similis est.

A. 3. **C O R N I X frugilega**, *The Rook*: *A Cornice*, cui similis videtur, in multis differt, v. g. Magnitudine quâ illam superat; colore Rostri circa radicem albicante; quod indè evenit, quodd rostro in terram profundius subinde detruso ut vel radiculas, vel infecta extrahat plumaginem circa radicem ejus nascentem deterrat & cutem denudet; pennarum splendore purpureo-cœruleo; quod gregaria sit, nec gregatim tantum voleat sed & nidificet; quodque frugibus vicit.

A. 4. **C O R N I X cinerea frugilega**, *The Royston CROW*. Caput, gula ad sternum usque & alæ nigræ, reliquum corpus cinereum. Nonnulli *The SEA-CROW*, i. e. *Cornicem marinam* eam appellant. In planicie circa Royston oppidum, New-market, & alibi in agro Cantabrigiensi, & in agro Dunelmensi circa Tese fluvii ostia fre-

## 40 SYNOPSIS METHODICA

quens est, hyeme potissimum. Ventriculum dissectum Titico, hordeo aliisque granis refertum invenimus.

A. 5. MONEDULA sive *Lupus* Aldrov. The JACK-DAW : Κολυδεῖς ἡ Λύκη. *Cornice minor* est. Postica pars capitis ad medium usque colli cinerascit, *Pectus* quoque & *venter* cinerascunt nonnihil ; reliquum corpus nigrum cum cœruleo splendore, sed caput summum intensius : *Caput* grandius est in hac ave, quod eam callidi & sagacis ingenii esse arguit.

A. 6. CORACIAS, *Pyrrhocorax* etiam dicta, quantumvis *Aldrovandus* repugnet, The CORNISH-CHOUGH. Restri colore rubro non à præcedente tantum sed ab aliis hujus generis quibuscumque avibus satè distinguitur, ut alias notae characteristicas, quamvis multæ suppetant, adjicere non sit opus. *Scopulos* & *clivos* in rivitimos præcipue frequentat, non in *Cornubia* tantum sed etiam in *Wallia*. *Corvus sylvat.* *Gesn.* in omnibus præterquam magnitudine cum hoc convenit.

7. CORVUS *Indicus* Bontii. *Corvum* nostratem rostro refert ; verùm in temporibus similiter pictus est ut *Indicæ* istæ *Meleagrides* quas Belgæ *Kalcouse hanen* vocant. Capite & collo nigricantibus plumis ornatè vestitus est : *Pedibus* & *unguis* validis. Indole differt à nostris *Corvis*, quod non cadavere, sed *nucibus Myristicis* potissimum vescatur, iisque insigne datum inferat. *Caro* ejus delicata est.

8. CORVUS *Indicus cornutus* seu RHINOCEROS avis Bonii. *Rhinoceros avis* Aldrov. *Topau* Worm. Mus. Magnitudine longè superat *Corvum Europæum*, Rostrum respectu corporis mediocre : *Quod si verum sit, omnium certè avium longè maxima erit.*

*Jean Nieuhof*: nomine *Zager-vogel* describitur. Verùm cum *Belgiam* linguam non bene intelligam, Lectorem ad *Nieuhoffi* librum amando.

Hujus Avis diversæ species esse videntur : nam tria hujus generis rostra vidimus, figurâ tantopere differentia, ut unius & ejusdem speciei Avis esse non potuerint ; quorum icones in *Ornithologia D. Willughby* habentur, quæ Lectorem refero, non enim sine longa verborum

rūm ambage, intellectu admodum diffīcili, describī possunt.

---

### PICARUM genus.

A. 1. **PICA** *varia caudata*, seu simpliciter *Pica*. *The MAGPYE or PIANET*: *Kissa cuncta*. Colore vario ex albo & nigro, Caudæ forma irregulari pennis mediis longissimis, reliquis ordine ad extimas usque sensim brevioribus; nido superne undique spinis connecto, excepto duntaxat foramine ad latus, à congeneribus avibus differt.

A. 2. **PICA glandaria**, *The JAY*. Verticis plumæ variæ sunt ex albo & nigro; Color dorsi rufus cum aliqua cœrulei tinctura. Insignis autem nota, quâ coloris respectu ab aliis differt, sunt pennulæ illæ ad alæ basin pulcherrimæ, lineis transversis cœruleis amoenis, albis, nigris variæ, quæ priores 15 remiges operiunt. Non glandes duntaxat vorat, sed & fabas recentes nedum plenè maturas, & *Cerasa*, quibus avidissimè inhiat.

3. **GARRULUS Argentoratensis** Aldrov. *The ROLLER*. Coloribus est pulcherrimus, Pectore & ventre ex cœruleo albicante; urepygio & minoribus Alæ tegetum ordinibus cœruleo ameno tinctis; capite ex cœruleo obscurè virente. Alarum remigibus & caudæ pennis ex cœruleo, nigro & albo variis. Notæ singulares in hac Ave sunt, 1. Tubercula seu verrucæ nudaæ ad oculos. 2. Figura caudæ, cuius extimæ utrinque pennæ reliquis longiores sunt. 3. Digitæ ad fundos divisi. 4. Quod lingua duas tantum habeat bifurcatas appendices.

*Picam marinam* Aldrovando *Ornithol.* lib. 12. cap. 16. descriptam à *Roller* Argentoratensi diversam non esse suspicamur, quamvis colores non convenient: fortasse *Aldrovandus* ad intuitum iconis pictæ descriptionem suam concinnavit.

*Cornix*

## 42 SYNOPSIS METHODICA

*Cornix cœrulea* Gesn. nobis etiam eadem cum *Roller* avis esse videtur : nihil tamen affirmamus.

4. *PICA Persica* Aldrov. quam ex imaginis pictæ intuitu descriptis, cum notæ quas illius adfert nullius ferè momenti sint ; nimirum *Rostrum* albicans, *irides* oculorum albæ, *pedes* subcœrulei, *Alarum* pennæ secundi ordinis, *uropygium* & priores in cauda luteæ ; Quodnam avis genus sit me nescire fateor.

5. *CARYOCATACTES* Gesn. & Turn. Magnitudo inter *Merulam* & *Picam* variam ; *Rostrum* nigrum, validum, *Picorum* simile. *Corpus* totum tam pronum quam supinum ex ruffo fuscum, maculis albis triangularibus, excepto capite, perbellè depictum. Inter oculos & rostrum albet ; infra anum etiam sub cauda pennæ sunt candidissimæ. *Vox* Picis caudatis similis.

*Garruli Bohemici* Aldrov. descriptionem vide infra inter *Aviculas* crassis & validis rostris, ad quarum genus potius quam ad *Picarum* pertinere videtur.

6. *PICA caudata Indica*, seu *Japonensis* Aldrov. rostro & pedibus rubris, capite & collo cœruleo, pectore & ventre albo. quid ?

7. *Mimus* seu *Picus garrulus Indicus*. quid ? *Picæ glandariae* non admodum dissimilis, sed multo minor, D. Charleton.

---

## PICI MARTII iisque affines.

1. *PICUS niger maximus*. *The GREAT BLACK WOODPECKER*. Magnitudine insigni, colore totius nigro, vertice excepto qui usque ad nares, minaceo pulcherrimo tingitur, à reliquis hujus generis abunde distinguitur.

A. 2. *PICUS viridis*, *The green WOODSPITE or WOODPECKER, called also the HEYHOE and RAIN-FOUL*. *Pluviaæ avis* Veteribus, *Nostratibus Rain-Fowl* èodem significatu dicitur, quod voce sua clamosiore & solito

solito frequentiore pluviam præfigire creditur, *Heyhoe* quasi *He:whole* quomodo *Sententialibus* appellatur, id est foraminum dolator, *Δευδροκολάτης*; Græcis, quia *Rostro arborei* perforat.

Hæc species magnitudine sua, quâ reliquas superat, & colore viridi facile innotescit.

3. *PICUS viridis major seu maximus* Bellon. Pico viridi vulgari longè major est. *Rostrum* ei tribuit incurvum præter aliorum morem: pedes tamen similes; variæ denique maculas in alis, quales in aliis etiam consipiuntur sed colore differentes.

A. 4. *PICUS varius major*. *The greater spotted Wood-pecker or Witwall*. Niger est, maculis albis pulchrè depictus. In mare infra verticem ductus pulcherrimus miniaceus cernitur. Uterque sexus sub cauda colore phœniceo seu miniaceo lucido tingitur. Magnitudine *Merulæ* par est, vel major. Coffis aliisque Insectis vicitat.

A. 5. *PICUS varius minor*, *The lesser spotted Woodspite or Hickwall*. Præcedenti figurâ & colore similis est, sed multò minor. Avis hæc vel rostro suo in rimam arboris inserto & celerrimè huc illuc agitato, vel creberima percussione, sonum efficit crepitantem clarum, qui è longinquo exaudiri potest. His addit *Theophilus Molitor* apud *Joan. Fabrum Lyceum* exposit. in *Animalia Nov.e Hispan. Nard. Anton. Recchi*.

6. *PICUM varium tertium*, omnium minimum, qui circulos habet in pennis per integrum corpus, quorum unus albus, alias niger est. Hic *Paffere domestico* paulo est minor, carne Rubeculam fere æquat. Pedes habet parvos, sed ungues longos.

7. *Picus varius Brasiliensis* IPECU dictus *Marcgr.* Magnitudine est *Columbae*. *Caput* vestitur pennis cinnabrii coloris, in quo & cristam habet. *Collum* supra & infra nigrum, in utroque latere lineam habet albam ad dorsum protensam; *Ale* superiorius nigræ, subtus albæ: *Cauda* nigra. In ventre & cruribus superioribus pennæ sunt nigræ & albæ. *Rostrum* *Picorum* simile, quo cortices arborum excindit.

## 44 SYNOPSIS METHODICA

A. 8. JYNX sive *Torquilla*. *The WRYNECK.* A precedentibus differt 1. *Rostro* tenuiore & infirmiore; neque enim, ut illi, in solido ligno foramen sibi excavat, sed in arboribus cavis & putridis nidificat. 2. *Cauda* molliore minùsque rigida. 3. Quod caput ridiculè contortus & ad humeros circumagit, unde *Torquillæ* nomen; Coloribus variis & elegantibus perbellè pingitur, ut pulchra admodum sit avis. *Alaudam* magnitudine non superat.

9. *PICUS luteus cyanopus* *Pericus* Aldrov. I. 12. c. 35. Descriptionem vide loco citato.

---

### A V E S quædam exoticæ Picis affines.

1. **PICA** *Brasilica* Aldrov. lib. 12. cap. 19, **TUCANA** sive *Toucan*. *Brasiliensibus Marcgr. Xochitenacatl Mexicanis Nicremberg.* *Avis piperivora* nonnullis. Ob similem *digitum* dispositionem, duobus ante, totidem retro sitis; quodque foramen sibi in arbore excavet, in quo nidificet; ad *Picorum*, non *Picarum*, ut vult *Aldrovandus*, genus referenda est. Magnitudine est inter *Picam* & *Merulam* media. *Rostro* reliquo corpore toto majore ab aliis omnibus nobis hactenus cognitis Avibus differt. *Avis* hujus generis à D. *Cassiano de Puteo* apud *Joan. Fabrum Lynceum* descripta ab *Aldrovandina* specie distincta videtur, ut descriptiones conferenti, puto, patebit.

2. **ARACARI** *Brasilienibus Marcgrav.* *Cochitenacatl* item *Xochitenacatl* altera *Hernandez*. *Niceremberg.* *Rostrum* hujus minus est *Tucanæ* *rostro*, superiore mandibula in nonnullis tota alba, in aliis linea in summitate nigra secundum longitudinem distincta; inferiore nigra; alias ei persimilis est *Avis*. *Pennarum colore Picam* potius refert quam *Picum*.

3. **JACAMACIRI** *Brasilienium* *Marcgr.* *Digitos* in quolibet pede duos anterius, duos posterius sitos habet, eorum exteiiores duplo longiores interioribus *Picorum* in modum, unde non sine ratione avem hanc *Picis* annumeramus. *Rostro* etiam recto acuto nigro cum *Picis* convenit. Magnitudine est *Alaudæ*, alijs brevibus: supinæ parte

parte tota coloris viridis cum aureo & igneo mixti, ut mirificè splendeat: prona obscurè flava; annulus viridis collum circundat.

4. CURUCUI Brasiliensibus Marcgr. Ob similem digitorum dispositionem & hanc Picis subnectimus. *Magnitudo* Picæ; *Rostrum* breve, latiusculum, sulphureum, *irides* oculorum aureæ: *Crura* brevia, ad pedes fere plumata. Totum *pectus* & *venter* infimus coloris sunt egregiè miniatii: *dorsum* & *cauda* superiùs ex cœruleo & igneo splendide virescunt: caudæ extrema ora nigra, subtus pennas habet albas nigro transversim eleganter striatas. *Alæ* variis coloribus, initio viridi, media parte canescente, ultima nigricante, distinctæ. Colorum respectu *Psittacis* quam *Picis* similior est.

5. GUIRA ACANGATARA Brasiliensium Marcgr. Digitorum situ cum *Picis* exactè convenit; & prope modum numero pennarum caudæ. *Magnitudo* Picæ variæ: *Rostrum* paulum aduncum, obscurè flavesiens: *irides* oculorum fuscæ. Totum *caput* pennis vestitur, in medio secundùm longitudinem proximè scapum fuicis, ad latera flavescentibus ut crista. *Collum* & *alæ* è contrario, pennas habent in medio flavescentes, ad latera fuscas. Totus *venter*, *dorsum* (exceptis aliis) *crura* superiora & exortus alarum, ex albo pallidè flavescunt. *Cauda* 8 pennis constat. *Crura* inferiora coloris sunt thalassini.

6. GUIRA TANGEIMA Brasiliensium Marcgr. seu *Picus* nidum suspendens. Hæc Avis præ aliis hoc nomen meretur; nullam enim novimus præter hanc quæ nidum propriè suspendat. Picæ variæ æqualis est, capite parvo, rostro recto, acuto, nigro, digitum longo: Pedes aliarum Avium pedibus digitorum situ respondent. *Caput* & colli inferior pars nigerrima, superior ad initium dorsi uranica. *Caudi* tota nigra; alæ etiam nigerrimæ, verùm in medio secundùm longitudinem maculam habent albam: reliquum corpus coloris uranici. *Crura* subcœrulea. Nides egregios extruunt hæ aves cylindraceæ figuræ, è virgultis perquam artificiose contextis, eōisque appendunt magno numero extremitatibus ramorum.

7. JUPUJUBA seu JAPU *Brasilienium* Marcgr. Ejusdem figuræ est cum præcedente, & eodem modo nidiificans, caudâ paulùm breviori. *Corpus* totum nigerissimis pennis vestitum : in utriusque alæ medio macula flava, digitum longa : in extremitate dorsi & prope anum tota est flava. *Cauda* inferiùs ab exortu ad medium partem flava, reliqua nigra : superiùs tota nigra, lateralibus duntaxat pennis flavis ad medium ulque. *Crura* nigra & pedes : *Rostrum* sulphurei coloris : oculorum *irides* sapphyrinæ. *Nidus* ex arido gramine, pilis equinis aut suillis mixtis, componitur, coloris fusci, figuræ *cucurbitæ* angustæ cum suo Alembico, &c. Nidi hi è ramulis minimis extremis arborum dependent. Hoc artificio ova & pullos suos à *Simiarum* rapina & injuriis securos reddit.

8. PICUS Indicusex albo & nigro variegatus, Mus. Leyd.

9. PICUS Indicus cristatus variegatus, Mus. Leyd.

10. PICUS Indicus barbatus horarius, colore viridante, vulgo horarius vespertinus, *Pala Kethai* Zeylanensis circa vesperam indesinenter cantare incipiens. Mus. Leyd.

11. Idem minor.

### PICI minùs proprie dicti seu Picis affines.

1. PICUS murarius, Aldrov. lib. 12. cap. 37. *Sturni* feide crassitie est. *Rostro* oblongo, tenui, nigro : *capite*, *collo*, *dorso* cinereis : *Pectore* albicante : *Alijs* partim cinereis, partim rubeis. *Cauda*, quæ brevis, penæ alarum longiores, dorcum inferius, venter & crura, quæ picorum more brevia sunt, nigra. *Digitii* longi, tres ante, unus pro calce.

*Picus murarius* dicitur, quoniam ut Pici arboribus, ita hæc muris maximè adhæret, vermiculosque in eorum rimis quærit. In foraminibus arborum nidulatur. In *Anglia* inveniri ajunt, quamvis nobis inibi nondum fuerit conspecta,

2. JUNCO Aldrov. *Cinclus Turn.* *The greater REED-SPARROW.* Magnitudine *Turdo* non mulùm cedit; rostro grandi, digitali, fuscō, nonnihil incurvo. Os intus croceum. Gula, pectus, venter alba, cum aliqua flavedine, præcipue circa anum. Supina facies tota ē fuscō seu obicure cinereo flavicat: supra oculos linea albicans. Plumulæ remigum radices subtus tegentes flavæ. Caudæ pennæ rigidæ ut in *Picis Martiis*. Crurum robur in hac ave præcipue notabile est. In *arundinetis* semper versatur, & suaviter cantillat: Arundinibus autem adhærescit, eodem modo quo *Picus martius* arborum ramis: quam præcipue ob causam ad hoc genus eam retulimus.

A. 3. PASSER *arundinaceus minor*. An *Cannevarola* Aldrov? *Ficedula cannabina* Olinæ. *Ruticilla æqualis* est aut tantillo minor: in *Arundinetis* versatur, & perpetuo cantillat arundinibus insidens. Coloribus à præcedente non mulùm differt, nisi quòd de viridi magis participet. *Rostrum* & pedes in hac avicula multò majores sunt quam pro corporis ratione. In *Belgio* frequens est inter arundines.

4. ATOTOL five *Avis aquatalis* Hernand. Magnitudine est & forma *Passeris*, rosto nigro, pedibus fulvis, prona parte candida, supina fulvo albo, nigróque variâ. In *juncetis* & *carectis* versatur & prolem educat.

Forte Passeri nostrati torquato in *arundinetis* nidificanti inferiùs descriptæ eadem *Avis* fuerit.

Describitur secundò cap. 16. sub nomine *Atotoloqui chitl.* ubi pertinacis cantionis esse dicitur, ab exortu solis ad occasum garritu mures imitante.

A. 4. SITT A seu *Picus cinereus* Aldrov. *The NUTHATCH or NUTJOBBER.* Supina pars corporis cinerea est, prona ruffa. Linea lata nigra à rostro per oculos ad collum ducitur; *Rostrum* rectum, triangulum validum. Non insectis tanitùm sed & nucibus vescitur quas mira dexteritate rostro pertundit & aperit. Arbores scandit *Picorum* more.

A. 5. CERTHIA, *The CREEPER.* Arborum truncis & ramis adhærescit & reptat *Picorum* more, Paryita-

te sua & rostello arcuato ab aliis omnibus hujus generis avibus distinguitur. *Caudæ pennæ longissimæ, acutæ, & rigidæ, ut in Picis.* Supina pars corporis tulya est, prona albicat.

A. 6. **UPUPA, "Erof,** *The HOOP or HOOPOE.* *Crista* in capite pulcherrima duplice pennularum ordine constans, à rostro ad extremum usque occipitum protensa, quam pro libitu arrigere & demittere potest, huic pro characteristica sufficere possit. Magnitudine ad *Vannellum* accedit. Ex stercore, potissimum humano, nidum construere tum *Aristoteles* è Veteribus, tum Recentiorum nonnulli tradunt. Numero pennarum caudæ denario, Appendicum intestinalium absentia, alarum transversis macularum ordinibus cum *Picis Martiis* convenit; aliis notis ab iis satis differt. In *Northumbria*, inque agro *Surreiano* interdum invenitur. *In segetis* vescitur, an & uisa liisque fructibus ut veteres nonnulli tradiderunt, nescimus.

*Aves terrestres aquas frequentantes, rostris longis, piscivoreæ.*

A. 1. **T S P I D A**, an *Veterum Alcyon. The KINGFISHER.* *Merula minor* est: *Rostro* 2. dig. longo, crasso, valido, recto, acuto, nigro: ore intus croceo. Coloribus est pulcherrimus, vertice ex nigro virescente cum maculis transversis cœruleis; dorso coloris pulcherimi dilute cœrulei splendentis. *Pectus*, venter imus, latera & subalares plumæ ruffæ. *Venter medius* ex ruffo albet. Inter nares & oculos, item ultra oculos maculæ ruffæ, seu ex albo rufescentes. *Cauda* sesquidigitalis tantum. *Tibiae* perbreves. *Pedum* in hac ave structura singularis est; nam extimè digitii tria internodia medio adhaerescunt, intimi unicum tantum: est autem intimus digitus minimus, & medio dimidio brevior: *extimus* medio ferè æqualis: *posticus* intimo paulò major. *Ventriculus* magnus & laxus

laxus ut in carnivoris, ossiculis & squamulis piscium plenus. In riparum foraminibus nidificat.

2. *Ispidæ affinis* JAGUACATI GUACU Marcgr. *Turdelæ* magnitudo, figura Pici majoris Rostrum *Ispidæ*, sed unciâ longius: cœura brevissima nigra. E digitis anterioribus exteriore duo breve quidem at tertius interior longè brevissimus & remotior. Supina pars tota coloris est ferruginei & splendentis, torque circa collum albo, prona pars alba. Propè utrumque oculum maculam etiam albam habet.

3. MEROPS sive *Apiaster*, The BEE-EATER. *Ispidæ* figurâ corporis similis est, magnitudine *Merule*, aut major, Rostrum *Ispidæ* simillimum. nisi quod deorsum paulò magis incurvetur. Pedum conformatio *Ispidæ* per omnia exactè similis. Color in vertice rufus, in cervice & scapulis viridis, cum aliqua rubri mixtura. Ab angulis oris per oculos ultra aures ductus niger utrinque extenditur: Huic contiguus sub mento color flavus. Peitus & venter totus cœruleus. Cauda palmaris, cuius mediae pennæ ultra reliquas longius procurrent. Ventriculus membranosus potius quam masculosus. Scutarebis aliisque insectis refertus. Apibus, aliisque insectis victitat: ob exactam partium omnium tam internarum quam externarum cum *Ispide* similitudinem suspicamur eam pisces pariter prædari. In Italia invenitur: in Cicta autem insula frequentissima est, teste Bellonio.

4: MEROPS alter seu *Meropi* congener Aldrov. Corpore est superiore paulò longiore & crassiore; ristro ad falcem messorium proprius accidente: Capite & prona parte ferè tota flavescente; dorso castaneo, prope uropygium tamen ex viridi & flavo permixto. Reliquam descriptiōnem apud Aldrovandum vide, qui ex iconē picta eam descripsit. Rostri figurâ & maculis nigris utrinque per oculos ductis cum *Merope* convénit.

5. *Ispidæ* seu *Meropi* affinis, GUIRA-GUAINUMBI *Braſiliensibus*, Tupinambis Marcgr. Deplumatæ corpus non superat magnitudinem *Turdelæ*, quamvis pennis induita Columbae par videatur. Rostrum nigrum, 2 dig. longum, in utroque latere, supra & infra, ferræ in modum

## 50 SYNOPSIS METHODICA

dum dentatum, Crura brevia, nigra; Pedum & digitorum conformatio *Ispida* respondet. Cauda ab *Ispida* plurimum differt, est enim longissima, ejusque mediæ duæ pennæ ad duos digitos plumis carent, in extremitatibus autem rursus plumas habent ad duos digitos. Pennæ totius elegantissimæ sunt: nam in capite quasi mitram gerit ex pennis sapphirinis compositam, maculâ nigrâ in medio insignem. Irides oculorum flavæ: infra oculos macula nigra. Prona pars tota obscurè lutea, supina viridis seu graminei est coloris. In medio collo inferiùs quasi pro insigni gerit tres vel quatuor pennulas nigras & circum eas sapphirinas, quæ maculam quandam constituant.

6. **I S P I D A** *Indica major* sive *Halcyon*, *Pilibunduwa* i.e. *Pisces captans*, *Mus. Leyd.*

7. **I S P I D A** *Indica minor* *Charleton Mus. Leyd.*

8. **I S P I D A** *Indica marcoulos major* *Mus. Leyd.* eademque minor *eiusdem*.

9. *Ispida Mexicana*, *Hoxocanauhatl* dicta *Hernand.* A nostrate *Ispida* non multum dissimilis est, nisi quod crista magna cyaneum colorem vergente insignatur.

## GALLINACEUM genus; & primò domesticum & mansuetum.

**H**O C Avium genus insignibus notis ab aliis omnibus differt, Exæ sunt 1. *Rostrum* habere breve, validum & nonnihil incurvum, ad grana colligenda, quibus præcipue viicitat. 2. *Ventriculum* crassum musculis instructum, ad eadem calculatorum quos deglutiit ope comminuenda. 3. *Corpus* crassum & ponderosum, carne multa. 4. *Alas* breves & concavæ, unde minimè altivolæ sunt & breves volatus faciunt. 5. *Intestina cæca* longissima. 6. **Carnem** albam, præcipue mutulorum pectoris, qui color à coctione se prodit manifestius: quæ nota huic generi pecularis est. Hoc autem indicium est carnem earum saluberrimam.

timam esse & optimi succi. 6. Multiparum esse. 7. Humi nidificare, quia, sci. pulli recens exclusi non aluntur à matribus, sed densa lanugine vestiti, huc illuc curvantur matres sequuntur, cibum rostellis colligentes. 8. *Pulveratrix* esse.

A. 1. *GALLUS GALLINACEUS* & *Gallina domesticus*, The DUNGHILL COCK & HEN. De his, quoniam aves domesticæ & notissimæ sunt, nihil attinet multa dicere. Insignes harum varietates à nostratibus aluntur, nimirum, 1. *Cristâ* in vertice plumosâ densissimâ & undequaque diffusâ spectabiles. 2. *Pumiliones*, cruribus brevissimis, Creepers nostratibus dictæ. 3. *Caudâ* seu Orrhopygio carentes, *Rumkins* Anglis, *Aldrovando* Persicæ dictæ. 4. *Crispæ*, nostratibus *Frislandice*, pennis reflexis caput versus, & velut inversis.

A. 2. *PAVO*, Græcis *Tæs*, The PEACOCK. Gemmantibus caudæ oculis spectabilis, & ab aliis quibusunque avibus discretu facilis est. Apicem in capite habet, quem crinitæ arbusculæ constituunt, ut loquitur Plinius. Variat interdum colore albo.

A. 3. *GALLO-PAVO* seu *Avis Numidica & Meleagris* quibusdam, The TURKEY. Hic caudam in orbem expandit Pavonis in modum. Collum cum capite plumis nudum est, cure tantum rubra seu purpurascente obductum; *crista* seu caruncula rubra in vertice eminet, quam mas laxare & extendere seu demittere potest infra rostrum. *Mas* calcaribus caret, & setaceâ in summo pecto-ze velut barbâ à fæmina distinguitur.

Neque hæc neque præcedens avis *Angliae* aut etiam *Europæ* nativa, sed adventitia est, ex *India* aut *Africa* huc translata; verùm cum domesticæ & cicures sint, atque etiam hyemes nostras facile tolerent, & à rusticis quæstûs causâ passim aluntur, diuque est quod huc advectæ fuerint, non immerito nostratibus accensentur.

3. *GALLO-PAVO Sylvestris* Novæ Angliæ. A NEW-ENGLAND WILD TURKEY. *Gallo-pavone* vulgaris nigrior est; à quo si non alia in re magnitudine saltem insigniter differt. Sunt enim (inquit Fosselinus in Rarioribus Novæ Angliæ) qui 40, imò 60 libras pendent; quia

## 52 SYNOPSIS METHODICA

se vidisse & epulatum esse *Gallopavonem*, qui deplumatus & exenteratus ad 30 libras pondere accederet.

4. **MITU vel MUTU Brasiliensium** Marcgr. *Tepe-totol Hernand.* *Phasianorum* genere est, (inquit Marcgrav.) Hispani etiam pro *Phasiano* habent: nos potius à proprietate illa caudam in orbem expandendi, necnon magnitudine & colore, *Pavoni* & *Meleagridi* potius accensimus. *Major* est *Gallinaceo*; pennis per totum corpus nigris, (excepto ventre & sub ano, ubi brunni coloris est) holosericum villosum nigrum in capite, collo & pectore provocantibus. In summo capite pennis habet nigras complicatas in planissimam quasi mitellam, ut nesciens vix posset agnoscere, quas irascens aut etiam alias pro libitu in cristam erigit. *Rostrum* ut in hoc genere incurvum, sesquidigitale, coloris egregie incarnati, versus apicem tamen albcat. Libenter in alto sedet, ut *Gallopavones*, scanditque arbores, ut illi: est autem mite & hominis amicum animal.

5. **PAUXI Nierembergii.** *Gallina Indica* Aldrov. *Mitu* varietas. Hæc Avis non alia fere in re à *Mitu* Marcgrav. differt, quam tuberculo illo cyaneo Pyriformi ad Rostrum initium seu radicem. Q: An specie, an sexu solum à praecedenti differat?

6. **MITUPORANGA** Marcgr. *Gal'us alius Indicus* Aldrov. lib. 14. cap. 10. Rostrum minus altum, minusque lunatum quam in *Mitu*; ejus extremitas nigra, reliquum totum cute crocea vestitum, qualem & circa oculos habet. Collum & caput nigerrimos habent plumas, instar holoserici splendentes; & in summitate capitis cristatas & cochleatim tortas habet pennis usque ad initium collis: has erigere in cristam crispam potest. Reliquum corpus nigrum cui aliquid viridis intermisetur. Circa anum albas habet pennis: *Crura cinerea*.

7. *Callus Indicus alius* Aldrov. tuberculum cerasiforme habet in superiore rostri mandibula; quo ab hac Ave differt.

8. **GALLUS & GALLINA Guineensis.** *The GUINNY HEN or PINTADO.* *Gallinae* vulgari domesticæ magnitudine par est; *collo* tamen longiore & tenuiore figura

gurâ corporis ferè ut *Perdix*: Colore est è cinereo nigricante, maculis albis undique vario. Collum terquis niger ambit: capu rubescit. Medio vertici cornu durum è fusco ruffam innascitur. Maxillæ sub oculis cœruleæ implumes, sub quibus appendices rubræ. *Parisenses* observant appendices has ten palearia superiori maxillæ innasci, non inferiori, ut in Gallinis; & fœminis rubras esse, matibus cœruleas, quo sexus possunt distingui.

Gigarias esse aiunt has aves & pullos communiter alere, etiam non suos. *Meleagrides* Veterum fuisse argumentis non invalidis probant *Parisenses*.

9. *Gallina Sylvetris* MACUCAGUA Brasiliensibus Marcgr. Magnitudo *Gallinæ nostratis*; Rostrum nigrum: Corpus crassum: Cauda nulla. Calcaneus rotundus ut in *Struthione*: Ungues obtusi, grisei. Totum caput & collum punctulatum est obscurè flavo & nigro; sub gutture albicat. Petrus, venter & dorsum obscurè cinerea. Ale umbræ coloris per totum, undatae nigro, præter Remiges pennas quæ totaliter nigræ. Pedes cœrulei. Carna admodum est avis. Humi currit, nam pedes inepti sunt ad scandendum arbores.

*Gallinaceum* genus SYLVESTERE majus, phytivorum & baccivorum, superciliis rubris aut coccineis.

A. 1. **U**R OG ALLUS seu *Tetrao major* Aldrov. *The Cock of the Wood, or Mountain.* Magnitudine ad Gallo-pavonem accedit. Anglia hunc non alit. in Hibernia inveniri dicitur.

A. 2. **T**ETRAO seu *Trogallus minor*, *The HEATH-COCK or BLACK GAME or GROUS* called by Turner the MOREHEN. In Septentrionali Anglia, parte mas *The BLACK COCK*, fœmina *The GREY HEN*, fœtura five Pullities *The GREY GAME* dicitur. In hoc genere mas totus niger est, fœmina *Scolopacis* aut *Perdicis* colore. Magnitudine *Gallinæ* non multum cedit. In lateribus

## 54 SYNOPSIS METHODICA

um altiorum frequens est; quin & in plana descendit, inque Ericetis humilioribus invenitur.

A 3. L A S OPUS altera Plinii, *Attageni* Aldrov. seu *Francolino* Italorum similis si non eadem. The RED GAME. Mas The Gor-cock & Moor-cock, fœmina the Moorhen, pullorum agmen Gor-foul dicitur & Pius. Hæc nomina in Boreali præcipue Angliae parte obtinent. Perdice dimidio ferè major est, nec colore multùm diversa à Scolopace, rubicundior. Summa altissimorum montium juga amat, nec in planities descendit, imò rariùs in latera montium. In Septentrionalibus montibus frequens est: invenitur & in Cambria.

Cum Clariss. vir Conradus Gesnerus, quem Aldrovandus etiam sequitur, in nullo Animalium genere fœminam mari colorum varietate & pulchritudine anteire crediderit, præsumpta hac opinione deceptus in utroque *Urogallo* seu *Tetraone*, majore sci. & minore, diversum lexum pro diversa specie habuit, adeoque ex duabus speciebus quatuor fecit: nimirum ex

1. <i>Urogallo</i> majore	Mare-----1. <i>Urogallum</i> majorem.
	Fœmina---2. <i>Grygallum</i> majorem.
2. <i>Urogallo</i> minore	Mare-----3. <i>Urogallum</i> minorem.
	Fœmina---4. <i>Grygallum</i> minorem.

4. ATTAGEN Aldrov. *Francolino* Italorum. Magnitudine & toto habitu ad *Phasianum* accedit Aldrov. Olina figura & proportione corporis *Perdicem* cinereum referre ait, magnitudine nonnihil superare. Avem hanc præcedenti speciei eandem esse suspicor: obstat locus; nam Aldrovandus Attagenem suam in Siciliae regionis calidæ montibus satis abundè reperiri afferit: cùm nostra juga montium altissimorum Regionum Septentrionalium incolat. Verùm responderi potest, montis *Ætnæ* in Sicilia partes superiores prope verticem nihilo calidiores sunt nostratis montibus, cùm nivem diutiùs retineant.

Quod

Quod sicut caput *Francolino* cristatum sit ut *Aldrovandus* eum describit, & pedes nudi, prout eum depingit tum *Aldrovandus* tum etiam *Olinz*; nostra Avis esse non potest, cui pedes ad ungues usque pluviosi sunt. Vide *Ornithologian* D. Willughby.

5. *LAGOPUS avis* Aldrov. Rhœtis Rabolane dicta; *Panix alba* Sabaudis. Color totius, (excepta cauda quæ nigritat, mediis tamen pennis albis) niveus: *Supercilia* rubra: *Pedes* ad ungues usque pluviosi unde *Lagopi* nomen. Adeò per omnia, excepto colore, cum tertia specie convenit ut an specie ab ea differt an accidentibus duntaxat quibuldam merito quis dubitet. *Bellonius* tandem existimat. Itali etiam utrumque genus *Francolin* vocant.

*Lagopodem* alteram *Gesneri* à præcedente specie minimè differre existimo, cùm præter notas & maculas quasdam in capite & reliqua parte lipina omnia convenient.

6. *GALLINA cory'orum* Germanis *Pazlebun*. Gesnero *Actigen*. Ad *Galline* magnitudinem accedit. Tibiae ex anteriore parte ad medium tantum, ex posteriore ad articulos usque nude. *Digiti* exteriores marginibus ferratis utrinque extantibus donatur. *Venter* totus albus, maculis nigris medium plumarum, nunc unâ in singulis, nunc duabus tribusve areolis transversis, occupantibus. *Mentum* in mare aternum, linea alba nigrorem cingente. *Caput*, dorsum, uropygium cinerea, colore *Perdices* æmulio. *Ale* rufio, albo & nigro coloribus variæ. *Norimbergæ* in foro venales vidimus.

Hoc genus Aves omnes, *Urogilli*, *Tetraones*. *Lagopi* &c per æstatem baccis *Vitis* *Idæe*, *Ericæ*, *Rubi* &c. vescuntur, per hyemem vero summitatibus *Ericæ*, *Abietis*, aliarumque semper virentium stirpium, ut earum ventriculos dissecando invenimus. Ast *Gallinæ Cory'orum* cùm sylvas etiam non montosas frequentent, alio fortè vietus genere utuntur, & Julos seu nucamenta *corylorum* esitant, ut *Albertus* affirmat, & unde nomen etiam sumpsiſſevidetur.

7. *PERDIX Damascena* Bellonii, quam Aldrovandus *Lagopodem* alteram Plinii existimat. *Perdicibus* cinereis

minores sunt, *Dorsi* & *colli* colore *Ruficulam* æmulantur : *Ale* quæ corpori junguntur albis, fuscis & fulvis pennis integrantur : Decem verò remiges pennæ cinereæ sunt. *Alarum* pars interior & venter albent. *Torquem* habet in pectore rubro & fulvo flavoque coloribus constantem : *Crura* pennis vestita ut *Lagopus*. An supercilia rubra nuda habeat necne non dicit?

---

### Gallinaceum genus sylvestre minus, superciliis nec nudis, neque rubentibus.

A. I. **PHASIANUS**, *The Pheasant*. Gallinâ paulò minor est, pulcherrimis coloribus. *Cauda* longitudine & figurâ ab aliis omnibus hujus generis facilè discernitur, pennæ enim mediæ longissimæ, reliquæ hinc inde ordine breviores ad extimas usque. In mare color ruber seu coccineus *oculos* latè circumquaque cingit. In sylvis degit.

2. **PHASIANUS Brasiliensis** *Jacupema* dictus Marcgr. *Coxalitli* Hern. *Gallina* domèstica paulò minor est. *Cauda* pedem longa & lata ; *Crura* longa. *Plumis* tota Avis vestitur nigris, quibus brunni aliquid admixtum. *Capitis* plumas in cristam erigere potest ; cingunturqne illæ nigrae plumæ aliis albis in ambitu. *Guttur* sub capite & ad sequidigitum longitudinem in collo nudum est, & rubra cute tectum. *Prona* pars corporis & alarum medietas posterior, plumulis albis & nigris varia. Superiora crura & cauda nigra. *Pedes* eleganter rubri. A clavatore *Jacu* *Jacu*, nomen habet.

In *Historia Natur. Insularum Antillarum* D. *Du Tertre*, avem quandam invenio Phasiani nomine descripatam, in hunc sensum. Pulcherrima est Avis, magnitudine *Caponis*, verùm cruribus longioribus elata velut *Pavo* ; collo multò quam *Gallus gallinaceus* longiore. *Rostrum* & *caput* ad *Corvi* accedunt. *Collum* & *pectus* coloris sunt cœrulei splendentis, nec minus pulchri quam *Pavonis*. *Dorsum* totum è griseo brunneum. *Ale* & *cauda* (quæ satis brevis est) nigra.

Cum

Cum cicuratur haec Avis aliarum Domesticarum se facile Dominum reddit, tum *Gallos Iridicos* tum *vulgares Gallos & Gallinas* involans, & Rostri ictibus abigens, interdum etiam trucidans.

Vox seu clamor hujus Avis, nimirum *Caracara*, suspicionem mihi injicit, non aliam eam esse quam Avem illam rapacem hoc nomine *Marcgravio* descriptam, cum, & haec fera ac rapax esse videatur aves Domesticas invadens & occidens.

**COXOLITLI Hernand.** magnitudine *Gallo-pavonis*, colore fulvo, à *Facupema* differt: eadem tamen specie avis esse nobis videtur.

1. **OOCOLIN** seu *Perdix montana* Hernand. Nostrate major est, rostro & pedibus è rubro candescensibus, totius corporis colore fusco, pallente & fulvo; alis inferne cinereis, supernè pullis, albis & fulvis maculis distinctis, ut & capite & collo.

A. 2. **PERDIX** *cinerea* Aldrov. *The Common Partridge.* Columbâ paulo major est, colore ex cinereo ruffo flavescente, maculis ruffis seu rubris transversis in lateribus, caudâ brevi. *Formicis* earumque ovis seu potius aureliis vicitat cùmque adolevit granis tritici & aliarum frugum.

3. **PERDIX** *Damascena* Aldrov. Præcedente multò minor est, rostróque prolixiore, alioquin ei persimilis.

4. **Perdix** *Brasiliiana* JAMBU dicta Pison. Harum in sylvis litoralibus duæ habentur species; haec nostratis minores, illæ pares; utræque pennis per totum corpus obscurè fulvis, verùm fusco mixtis atque maculatis vesticæ.

A. 5. **PERDIX ruffa** Aldrov. Italis & Græcis *Coturnice* seu *Coturno*. *Perdix Græca* seu *ruffa major* Bellonii. Caput, collum, dorsum, uropygium cinerea. Maxillæ sub oculis, & mentum ad medium usque gulae album; in ipso tamen mandibulæ inferioris angulo macula exigua nigra cernitur; Album hoc spatium torquis niger, à naribus inchoatus, & supra oculos prodit us cingit: ingluviei regio cinerea: Pectus inferioris dilatè è flavo rufum. Pedes rubri. Haec species *Anglie* ignota

## 58 SYNOPSIS METHODICA

ignota & peregrina est: aiunt tamen eam in insulis Jersey & Guernsey Reginæ nostræ subjectis inveniri Ingenii mansuetioris est quam cinerea & facile cicuratur. *Perdix Græca* seu rufa *Bellonii* magnitudine saltem insigniter differt à Perdice rufa in *Italia* & *Gallia* vulgaris, siquidem *Bellonius* cinereæ duplam esse scribat: cum rufa vulgaris cinereæ nè sesqualtera quidem sit.

A. 6. *COTURNIX*, *The QUAIL*. Figurâ corporis atque etiam colore non multum differt à *Perdice*, verum duplo propemodum minor est, *cauda* perbrevi: *Frumento* vescitur; èstque avis migratoria.

7. *COTURNIX Indica* Bonpii. Cicuratur *Gallinærum* in modum: *Mares* quoque non secus ac *Galli* pugnacissimi sunt. Coiore plumarum *Coturnici* admodum respondet, verùm *rostro* est paulò longiore: sonum quoque per intervalia edit, ut *coturnices* solent, verùm longè diuersum à *Coturnicum* voce, & ad *Ardeæ stellaris* mugitum accendentem. *Frigide* admodum naturæ est. *Columbae* aut *Turturis* magnitudinem non excedit.

A. 8 *ORTYGOMETRA Aldrov.* An *Rallus terrestris?* *Crex Aristotelis* ex vocis similitudine, *The DAKERHEN, or RAIL*. Corpore est ad latera compresso, & *Galliruarum* simili: *cruribus* etiam longis & supra tibias nudis, *cauda* brevi, *rostro* longiusculo, quibus omnibus notis cum aquaticis avibus convenit. Color testaceus, & *Coturnici* perquam similis, unde nomen.

In *Anglia* rarer est; *Turnerus* nusquam nisi in Northumbria vidit & audivit: At *D. Tancr. Robinsonus* se in *Eboracenfis* provinciæ tractu Septentrionali *Rallus terrestres* saepius cepisse nobis retulit. In *Hibernia* frequens habetur.

*Gallinaceum genus digito postico carens.*

A. 1. *OTIS* seu *Tarda* avis Aldrov. *The BUSTARD*. Magnitudine eximia *Gallo-pavonis* æmula, quodque tridactyla sit digito postico carens, tardi etiam volatilis & à terra difficulter se levans, ab aliis omnibus hujus

hujus generis Avibus abundè distinguitur. *Caput & collum cinereum, venter albet; Dorsum lineis transversis nigris & rufis varium.* In campis spatiofis circa *Norwum Mercatum & Royston* oppida in agro *Cantabrigiensi*, inque planicie, ut audio, *Salisburyensi*, & alibi in vallis & apertis locis invenitur.

2. *ANAS campestris*, *Cannæ petiere Gallorum*, seu *Tetraz Bellonii Aldrov.* Ornithol. lib. 13. c. 13. Eadem videtur *Stelle Avi* Aldrovand. Tardè persimilis est, sed duplo minor. *Mutinae Italæ* in foro venalem vidi-  
mus & descripsimus. Qui plura de hac Ave velit *Bello-*  
*nium & Aldrovandum* consulat.

### C O L U M B I N U M genus.

**COLUMBINI** generis Avium Notæ communes sunt, Figura corporis peculiaris, *Cuculum* referens; *Tibie breves Alæ, prælongæ; volatus pernix; Rostrum rectum, angustum, longiculum; Vox gemebunda; bina dutaxat ova una vice ponere, sed sæpius in anno parere; cibum pullis ex ingluvie sua in os eructare, quod optima ratione à Natura provisum est: ut sci. in ingluvie maceratus & emollitus, (victus enim *Columbis* è granis leguminum & seminibus durioribus est) à pullorum ventriculis facilius subigatur & digeratur. Quin & pedes Columbarum omnium, quotquot hæc tenus observavimus rubri sunt. *Picuipinime tantum Brasiliensi* pedes albescunt. *Marcgr.* In *Columbino* genere mas & femina laborem incubandi inter se partiuntur.*

A. 1. *COLUMBA domestica* seu *vulgaris*, *Пigeon*. The COMMON PIGEON, or DOVE, by some called Culvers. Color plerunque cœruleus aut cinereo-cœruleus, cum purpureo aut rubente in collo splendore, qui pro diverso ad lucem objectu variat. *Dorsum* inferius supra uropygium album. *Cauda* oblonga, nec ramen ultra alas multum protenditur. *Pondus librale.*

*Columbarum domesticarum* variæ species apud nos in *Anglia* aluntur.

*Domesticæ*

## 60 SYNOPSIS METHODICA

1. *Domesticæ majores*, Italij Tronfi & Asturnellati, nosstratis R U N T S. Coloribus non minus variant quam domesticæ vulgares. Magnitudine etiam differunt. Sunt enim *majores* Gallinæ ferè pares, tardioris volatûs; & *minores*, agiliores magisque volaticæ.

2. *Gutturoſæ*, Anglis & Belgis CROPPERS dictæ, quia ingluviem aëre attracto mirum in modum inflant, ut toto reliquo corpore major evadat.

3. *Tremule laticaudæ*, B R O A D - T A I L'D SHAKERS, sic dictæ quod caput & collum ultro citroque perpetuò ferè motitent; & à caudæ pennarum numero quæ non pauciores 26 esse dicuntur. Caudam plerunque cum obambulant erectam tenent Gallinarum instar.

4. *Tremule angusticaude seu acuticaude*, Narrow-tail'd SHAKERS.

5. *Columbae tabellariæ*. CARRIERS. Columbis vulgaribus pares sunt aut minores, colore obscurè cœruleo aut nigricante. Oculi Accipitrini, circulo lato cutis nudæ, tuberosæ, furfuraceæ, albidae ambiuntur: superior etiam Roſtri mandibula ejusmodi cutis fungoïæ dupli area seu crusta oblonga à capite ultra medium extensa obducitur. Harum usus est ad literas ultro citroque transmittendas.

6. *Cucullatæ seu Jacobæ*, Anglis JACOBINES, Belgis Cappers, quia in occipite seu summa cervicis parte pennulæ sursum reflexæ occiput cingunt, cuculli Monachalis in modum. Roſtrum his breve, oculorum irides colore margaritarum.

7. *Turbitæ dictæ*, TURBITS, cuius nominis rationem nescio. Roſtrum his brevissimum, crassum velut Rubicillæ, vertex planus, pennæ in pectore utrinque reflexæ.

8. *Barbaricæ seu Numidicæ*, BARBARY PIGEONS. Roſtrum præcedentis simile. Oculos cutis nudæ tuberosæ furfuraceæ circulus latus ambit ut in Tabellariis.

9. *Percusſores*, SMITERS. Hæ inter volandum tam fortiter alas quatunt, ut duorum aſſerum simul colligitorum ſonitum ſuperent,

10. *Gyratrices* seu *Vertagi TUMBLERS*. Parvæ sunt, variorum colorum; inter volandum miros motus in ære exhibent, retrosum in caput se circumvolvendo, globi aut pilæ projectæ speciem exhibentes.

11. *Galeatae HELMETS*. His *Caput*, *cauda*, & *Alarum* remiges coloris à reliquo corpore diversi semper sunt.

12. *Equites LIGHT HORSEMEN*. Spurium genus sunt altero parente *gutturoso*, altero *tabellario*, adeoque participant de utroque, ut patet ex *rostri* tuberibus & gutture inflato.

13. *BASTARD-BILS* Anglis dictæ, id est, *Rostris* spurii præditæ. *Numidicis* maiores sunt, *rostro* brevi, *oculis* rubris.

14. *TURNERS* Anglis, *Cirro* à vertice retro dependente, & bifariam jubæ equinæ in modum diviso insignes.

15. *FINNIKINS* præcedentibus similes, sed minores.

16. *MAWMETS* quasi *Mahometane*, oculis grandibus nigris notabiles, aliæ *Numidicis* similes.

17. *SPOTS*, quod in fronte supra rostrum maculam habent, cui & cauda concolor; à corpore alis albo.

A. 2. *TURTUR*, Græcis *Τευγάνη*, *The TURTLE-Dove*. Magnitudine minor est præcedente, colore non multum dissimilis. *Gula* vinaceo colore pulchro tingitur. *Colli* latera perbellè illustrant, ceu torquis quidam, pulcherrimæ plumulæ, apicibus albæ, cætera nigrae.

3. *TURTUR Indicus* Aldrov. lib. 15. c. 9. *Femina*, exceptis pedibus, qui rubri sunt; & *rostro*, quod nigrat, tota candida est. *Mas* verò dilutè rufescit. Magnitudo nostrati eadem, vox eadem. *Iris* oculi crocea seu miniacea. *Torquis* tenuis & nigra est & collum circumcirca ambit.

4. *Turtur Indicus* seu *COCOTZIN Hernand.* Nieremberg. *Passere* nostro paulò major est. Universum corpus superne fuscum, plumas tamen singulas nigro ambiente colore. *Alarum* anteriora partim nigra sunt, sed majori ex parte fulvescunt: *cauda* extrema albo & fuscō.

## 62 SYNOPSIS METHODICA

fusco promiscuè colore tingitur. Plumæ quæ infernum corpus vestiunt albæ sunt; sed in lineas desinentes atras. *Caput* parvum: rostrum nigrum. *Cocotli* etiam *Hernand.* huic eadem est.

5. **T U R T U R** *Birbadensis minimus.* *Alaudæ* est magnitudine, & vel eadem præcedenti, vel ei certè simillima, avis. Quin & descriptio *Columba sylvestris* minimæ *Brasilienfis* huic per omnia ferè convenit: ut has tres unam & eandem avem esse suspicer.

6. *Columba sylvestris minimæ Brasilienfis*, **P I C U I P I N I M A** Marcgrav. *Alaudâ* paulò major est; rostro *Columbino* fusco; *iridibus* oculorum aureis. Totius superficiei supinæ pennæ obscure cinereæ seu lividæ, oris nigricantibus lunatis. Remiges alarum inter volandum ruffæ videntur. *Cauda* è cinereo fusca: *Ventris* pennæ albæ oris lunatis fuscis. *Pedes* albescunt præter normam aliarum.

7. **C O L U M B A** *sylvestr.* ex insula S. Thomæ Marcgr. Magnitudine est & figura nostratum, sed *rostro* superiùs adunco, coloris in medietate anteriori tota cœrulei cum albo paucò & flavo mixti, in posteriore sanguinei. *Iris* oculorum cœrulea. *Pennis* tegitur per totum corpus viridibus ut *Psittacus* quidam. Remiges alarum è viridi fuscescunt, ut & extremitas caudæ Sub ano & caudæ flavas habet pennis. *Crura* & *pedes* eleganter crocei.

8. *Columba L I V I A* Gesn. *Aristotelis Πελεάς.* *Columba* domesticæ specie persimilis est, paulò minor. *Plumæ* ubique cinereæ, sed in extrema cauda nigrescunt. Reliquam descriptionem apud Autorem vide. Paritate sua à *Vinagine* præcipue differre videtur. Qu. Annon eadem sit cum *Columba nostra rupicola*?

A. 9. **P A L U M B U S** *torquatus*, *The RING-DOVE*, or **QUEEST**, Φεωδ. Aristotelis aliisque Græcis. Septentrionalibus Anglis *Cufhat*. Magnitudine sua, & maculis ad latera colli utrinque albis, ceu torque, à *Columba vulgaris* aliisque speciebus differt. *Sylvas* frequentat, & in arboribus nidificat.

A. 10. **O E N A S** sive *Vinago*, *The Stock-Dove or Wood-pigeon.* Οινᾶς, Πελεάς. Magnitudine *Columba vulgaris*

par aut major, figurâ corporis similis, nec colore multum differt. *Collum* versicoloribus plumis vestitur, quæ prout variè luci objiciuntur, vel purpurâ vel virore splendidissimo nitent, ut nullum sericum æquè. *Pectus* anterius & alæ purpurascente aut vinaceo colore diluuntur, unde & nomen. In utraque alâ duplex habetur macula nigra.

A. 11. *COLUMBA rupicola*, THE ROCK PIGEON. Corpore est exiguo, colore cinereo. In *rupibus maritimis* frequens.

12. *COLUMBA Mexicana* HOILOTL dicta Hernand. Venter & pectus diluti fulva; supina omnia fusca ac maculis cœspersa nigris. *Alarum & caude* inferior superficies cinerea.

13. *Columba Mexicanæ montanae maxima*; domesticis pares sunt, colore subpurpleo, candidis humeris, coccineo *rostro* & *pedibus*. Hæc etiam *Hilotl* appellatur.

14. *Cehoilotl*, *Columba sylvestris* *pennis fuscis* præter eas quæ *pectus* & *extremas alas* tegunt candidas & pallentes: *irides oculorum coccineæ*.

15. *Tiacahoilotl*, *Columba sylv. species*, *Arabicis dictis quadantenus similis*, *rostro* incurvo, mediocri, rubeoque; *prona corporis & alarum parte rubea*, *supina cœrulea*.

16. *Columba minor* *Jamayensis*, ventre candido D. Sloane. The *White-bellied Dove*. Hujus descriptionem vide in *Appendice*.

17. *Columba cauda fascia notata*, D. Sloane. The RING-TAIL PIGEON. Hujus etiam descriptionem in *Appendice* dabimus.

18. *Columba minor* capite albo. The *Bald-pate*, D. Sloane. Nobis in *Appendice* describetur.

## TURDINUM genus.

**N**O TÆ hujus generis Avium sunt, *Magnitudo inter Columbas & Aicadas media, Rostrum longitudinis & crassitie mediocris, deorsum modice inflexum, Os intus flavum, Cauda longa, Vetus & baccis & insectis promiscuus.* Hujus autem generis tres species sunt seu genera subalterna; *Turd'*, *Merule*, *Sturni*.

A. 1. *TURDUS viscivorus major*, *The MISSEL-BIRD or SHRIKE*. Pectore est maculoso ut reliqui *Turdi*, maculis majoribus. *Turdum viscivorum* minorem, quocum coloribus convenit, multum superat. Carne mihi est delicata quam hujus generis reliqua. Hyberno tempore *Agriolii* baccis vescitur.

A. 2. *TURDUS viscivorus minor*, seu *simpliciter dictus*, *Kīχān*. *The MAIS, THROSTLE, or SONG-THRUSH*. Præcedenti similis est, sed minor. Carne inter aves, *Martiale* judice, laudatissima. *Nidum* interius oblitus, inque nudo luto *ova* ponit. Vere egregie cantat arboribus insidens.

A. 3. *TURDUS pilaris*. *The FIELDFARE or FELDEFARE*. Avis est migratoria & hyeme ad nos advolat, præcedente aliquanto major, capite, collo, uropygio cinerea, dorso obscurè ruffa. A rostro ad oculos macula utrinque nigra extenditur. Caro in cibis commendatur. Gregatim volat.

A. 4. *TURDUS Iliacus*, sive *Illas* aut *Tylas*, *The RED-WING, SWINE PIPE or WIND-THRUSH*. *Turdo* simpliciter dicto magnitudine par, & per omnia ferè similis est; pectore duntaxat minus maculoso, & alis subtus rubro *mai* *Aurantii* colore infectis, ab eo differt. Hæc etiam avis est migratoria & gregaria, & unà cum *Turdo pilari* hoc commeat.

5. *Turdus Americanus minor canorus*, ex cinereo albus, non maculatus *The AMERICAN SONG-THRUSH, MOCK-BIRD or NIGHTINGALE*, *Cen-*

*contlatolli*, i. e. Quadringentæ linguae, sive Avis polyglotta Hernandez. Nieremberg. Descriptionem vide in Appendix. Non facile curari aut in caveis incarcerari se permittit. Per totam fere Americam invenitur. In Jamayca insula observavit & descriptus eruditissimus Amicus noster D. Sloane.

6. **TAMATIA Brasiliensis** Marcgr. *Alaudæ* est magnitudo, tota punctis lata maculis nigris ut *Turdus minor*. *Venter* albet maculis fuscis: *guttur* & *collum* flavescit. *Rostrum* longum, rubrum, superiore mandibula productiore. *Cauda* caret. *Caput* majus quam pro corporis proportione, uti & *Rostrum*.

Avis est anomala & singularis, ob magnitudinem & maculas similes ad *Turdinum* genus retulimus.

Cæterum *Turdi* strictè dicti nomine sunt, *color* in dorso cinericeus, *Pectus* maculosum: *Merula*, color in toto corpore aut maximâ ejus parte simplex, & in plerisque speciebus nigricans. *Sturni* & congenerum, *rostrum* latius & planius seu depresso quam *Turdis* aut *Merulæ*.

7. **TURDUS Zeylanicus auriculatus** Hellalenia Zeylanens. Mus. Leyd.

## M E R U L A.

A. 1. **MERULA vulgaris**, Κοώνη Græcis: The BLACKBIRD. Colore undique nigro & *rostro* flavo ab aliis avibus distinguitur. Avis est solitaria, (ut nomen *Merula* indicat) & summe canora.

A. 2. **MERULA torquata**, The RING-OUZEL, or AMZEL. *Merulam* vulgarem magnitudine vel æquat, vel excedit, supina parte è fusco nigricans. Infima gula torque albo, digitum lato, lunulato exornatur, in montosis *Derbiensibus*, *Eboracensibus* &c. invenitur.

A. 3. **MERULA saxatilis**. The ROCK OUZEL. Præcedenti similis est, sed torque caret. In montosis *Peccii Derbiensis* propè vicum *Hathersodge* dictum in præruptis

F rupibus

rupibus è quibus lapides molares exscinduntur vidimus plures. Descriptionem vide in Ornithologia D. Willughby. It is frequent on the high Mountains of Caernarvanshire and Merionydhshire in Wales, where they call it Mwyalchen y graig, quasi dicas, Merula rupicola. I have also seen several of them on a high Hill in Ireland, called by the English, Mount Lemister, in Irish Stoa Lein. D. Lloyd. An hæc à præcedente, specie, an sexu tantum distincta sit, aliquando dubitavi, necdum mihi plenè satisfit.

4. PASSER solitarius dictus. Magnitudo & figura corporis Merule. Caput grandius quam pro corporis mole. Mares colore cœruleo, seu ex cœruleo purpureo undique splendent. Femina ex cinereo nigricat. Prona pars tota lineis transversis cinereis, nigris, albidis pulchre undulatis eleganter pingitur. Rostrum Turdino paulò majus, nigricans; crura, pedes, ungues nigri, & minores quam in congeneribus.

5. CYANOS seu Cœrulea avis Bellonii; Merula similis est, sed paulò minor, colore undique totius corporis cœruleo. Nidificat in montium summitatibus, ut in Creta, Citharea, Corcyra, Zacyntho & Eubœa observavit Bellon. in Gallia & Italia non reperitur.

6. Cyanos Indica : The INDIAN MOCKBIRD. Aulaude vulgaris magnitudine est. Rstro recto, acuto : colore per totum corpus undique cœruleo ; caudâ longâ. In Museo Tradescantiano ficcatam vidimus. Præcedenti forte eadem est.

A. 7. MERULA aquatica, The WATER-OUZEL, or WATER-CRAKE. Magnitudo paulo infra Merulam vulgarem, Dorsum nigricat cum cinerei mixtura ; pectus niveum : Aquas frequentat, & Pisces prædatur. In montosis Septentrionalibus & Cambrobritannicis satis frequens. Quamvis toto corporis habitu & pedum fabricâ aves terrestres referat, sub aquas tamen interdum se demergit.

8. MERULA Brasiliaca Bellonii & Aldrov. Color totius corporis, si caudam & alas excipias, quæ nimirum atræ sunt, adeò intensè rubent, ut omnem alium ruborem

fem supereat. *Cauda longa est: Pedes & crura nigra: Rostrum ut in Passere breve. Nos in Museo Tradescantiano avem Indicam rubram vidimus caudâ oblongâ, magnitudine ferè Turdi minoris.*

9. **MERULA rosea** Aldrov. *Sturnum marinum* vocant *Aucupes*, inquit, & forte recte, quamvis maculata non sit. *Merula* paulo minor est, *dorso*, pectore & aliis supernis roseo seu carneo colore; *capite* circato: *Alis & cauda* nigris. *Rostro* quâ capiti jungitur nigro, cetera carneo: *pedibus* ferè croceis. Apparet, inquit, in agris nostris & in fimo versatur.

10. **MERULA Indica** *pectore cinnabarinino*: an *Zacapu* Marcgr.? Hujus pellem suffultam vidimus in *Museo Tradescantiano*: Magnitudine erat & figura *Merulae*. Color in supina parte tota niger, oræ duntaxat plumarum circa uropygium cinereæ aut albidae. *Pectus* coccineum: *Rostrum* *Merulae*; *cauda* etiam longa *Merulae* similis. *Zacapu* Marcgrav. huic Avi persimilis est si non eadem.

11. **MERULA bicolor** Aldrov. duobus potissimum coloribus fusco scil. seu subnigro & luteo rubescente varia.

12. **MERULÆ** congener *ejusdem*, lineâ prope rostrum rubrâ.

13. **MERULÆ** congener *alia ejusdem*. Harum *descriptions* videsis apud *Aldrovandum Ornithol.* lib. 16. cap. 12, 13, 14. Priorē pictam duntaxat vidit, nec posteriorem vivām.

## STURNI & congeneres.

A.1. **STURNUS** Aldrov. & aliorum, *Ψαράς Αρετούσης*  
**STAR**E, or **STARLING**. *Rostrum* latius est & depresso quam *Turdis* aut *Merulis*, quam præcipue notâ ab iis differt, quibus aliâs magnitudine & figurâ similis est. Apices plumarum in collo & dorso flavescunt in mare, in foamina albican; aliâs nigricant cum cœruleo

## 68 SYNOPSIS METHODICA

quodam aut purpureo splendore, cui viride interlucet pro vario ad lucem objectu. *Insectis* solis aut carne velci aiunt, non baccis.

2. **S T U R N U S** *Indicus* Bontii. *Plumis* cyaneis aut subobscure cœruleis ac cinereis guttis interstinctus *Sturnum nostratem* refert, verū *cristam* flavam in cervice gerit, & *caput* nigris, mollibusque ceu holosericeis *plumis* vestitum est. Humanas voces multo accuratiū quām *Psitacus* imitatur.

3. **M E R U L A** *saxatilis* Aldrov. *Ruticilla major* Olinæ. *Turdus marinus* Florentinis. *Sturno æqualis* & similis est; *rostro* nigro, *pèibus* ex fusco plumbeis. *Mentum* non nihil albet. *Prona* pars corporis; albo aut incano, nigro, & subflavo coloribus varia. *Caput* & *dorsum* fuscum aut subnigrum, apicibus pennularum cinereis. *Cauda* ruffa seu fulva; quæ hujus avis nota characteristicæ est. Colores aliæ in maribus & fœminis plurimùm differunt. In *Italia* satis frequens est, vidimus & *Vienne Austriae*.

4. **S T U R N U S** *Indicus* Mus. Leyd.

5. **G A L B U L A** seu *Picus nidum suspendens* Aldrov. *Oriolus* Alberto. *Chloreas Aristotelis ex sententia* Aldrovandi; *Icerus* Plinii eidem. *Turdis aliquanto major* est; *Rostro* *Turdino*, sed majori & longiori, rubro: *Pedibus* plumbeis, præter alas & caudam, quæ maxima ex parte nigrant, mas ubique toto corpore, pulcherrimo colore flavo spectabilis est, ut colorum elegantiæ & splendore cum Americanis avibus certet. In *Germania* & *Italia* invenitur. Cum *Turdis* & *Merulis* Rostri totiusque corporis figurâ, magnitudine quoque & vietûs ratione, convenit.

### Aves minores seu AVICULÆ.

**A**VICULAS voco Aves omnes *Turdis* minores, quæ in genere dividi possunt in *Tenuirostras*, **S O F T - B I L D BIRDS**, quæ *rostra* habent tenuiora, infirmiora, pleræque etiam longiuscula; & *Craffirostras* **HARD-BILD BIRDS**.

BIRDS, quibus *Rostra* brevia, crassa, duriora & fortiora. *Priores* insectis præcipue aut fructibus mollioribus viuentant; *postiores* seminibus & granis durioribus, & siccis.

### A V E S minores rostris tenuioribus.

**H**Arum multa sunt genera 1. *Alaudæ*, Κορύδαλος, quorum notæ sunt *Calcaneum* five digitæ postici unguis prælongus, color testaceus terreusve; in sublime evolantes cantillare. Harum species sunt,

A. 1. *ALAUDA vulgaris*, *The common FIELD-LARK* or *SKY-LARK*. Color è testaceo & nigro varius, plumulis in ambitu cinereo-rufis, media parte nigris: *Cauda longa*; *Humi* nidificat.

A. 2. *ALAUDA arborea*, *Totovilla* Olinæ, *The WOODLARK*. A præcedente aliisque differt, 1. Quod minor ac corpore breviore crassioreque sit. 2. Quod extimæ caudæ pennæ summitatibus suis albcent. 3. Voce seu cantu *Merularum* æmulo. 4. Circulo plumarum albicanantium coronæ instar ab oculo ad oculum caput cingentium. 5. Quod extima alæ penna remex, secunda multo brevior sit, quæ in *Alauda vulgari* ei proximè æqualis. 6. Quod arboribus insidet, cum illa terræ plerumque.

A. 3. *ALAUDA pratorum* Aldrov. *The TIT-LARK*: *Alauda vulgari* dimidio ferè minor, viridior est, & minus pulchrè colorata. Arboribus etiam insidet.

4. *ALAUDA cristata major*. Germanis *Kommanicki*: *The greater CRESTED LARK*. *Alauda vulgari* major est, *rostro* majore & longiore; *capite* cristato, *cristâ* ex septem, octo, aut etiam decem duodecimve pennulis compositorâ. *Color* dorsi minus pulcher, nec adeò maculis distinctus ac in illa. *Cauda* brevior. Non adeò frequenter in sublime evolat, nec evecta tam longam inibi moram trahit: Tandem non ut illa gregatim volitat.

A. 5. *ALAUDA cristata minor*, *The lesser CRESTED LARK* *Alauda vulgari* longè minor est, & apicem corporis parvitatem longiusculum obtinet, pedesque rubros,

## 70      S Y N O P S I S M E T H O D I C A

& colorem totius corporis ad fuscum magis vergentem.

A. 6. *ALAUDA minor campestris* D. Jeffop. Ab *Alauda* pratorum differt, 1. Quod paulò major sit: 2. minus viridis: 3. Pedibus pallidioribus: 4. Calcaneis multò brevioribus.

A. 7. *ALAUDA minima Locustæ voce*. *Locustella* D. Johnson, *The TIT-LARK that sings like a Grass-Hopper*. *Regulo* non cristato minor est, superne è flavo: fuscescens maculis subnigris; subtus ex albo flavescens, summo spinæ alicujus ramulo insidens, corpore erecto, aperio ore, alis paulum explicatis, stridet more *Locustæ* sed sonantius. Nota Alaudarum maximè characteristica, & omnibus communis est, *Calcar* seu unguis digiti postici longissimus.

8. *Alauda Indica Mus. Leyd.*

9. *SPIPOLETTA* Florentinis, *Tordino Venetis*. *Alaudis* minor est, *Ficedulæ* par. *Rostrum* gracile, rectum, acutum, nigerrimum; pedes etiam nigri. *Calcar* seu unguis posticus prælongus, *Alaudæ* instar. Color in supina parte cinericeus cum quadam viroris mixtura. *Gula*, pectus, venter in nonnullis albent, in aliis pulchre flarent. *Pectus* autem gutture & ventre in omnibus obscurius est & maculatum. *Calcanei* longitudine ab aliis avibus; colore atro rostri & pedum ab aliis *Alaudis* differt.

10. *GIAROLA* Aldrov. *Magnitudo Alaudæ*. *Rostrum* rubicundum, intus & in rictus marginibus lutescens. Supinæ partis colore *Coturnicem* exactissimè refert, aut *Gallinaginem*. Verticis finis, collive initium albanticibus plumularum marginibus tanquam coronâ cingitur. *Venter* albus. *Cauda* vix pollicari est longitudine, angustissimis plumulis composita, & ipsa angusta, *Pedes* carnei, calcaribus *Alaudæ*. In omnibus ferè, præterquam *caudæ* pennarum colore, cum *Tottovilla* seu *Alauda arborea* conuenit.

Secund-

*Secundum Avicularum rostris tenuibus præditarum Genus esto Hirundineum.*

**H**IRUNDINUM notæ characteristicæ sunt, *Cæput* grande; *Rostrum* breve; *Oris hiatus* amplius, ad muscas aliisque insecta inter volandum facilius capienda; *Ale* longissimæ, & volatus pernix, ad eadem acrius insequenda; *Pedes* breves & exigui, nec enim multum incedunt; *Cauda* longa & forcipata, ad corpus expeditius flectendum & circumagendum; *Ova* alba; *Hyeme*, cum insecta in aere volitantia non inveniuntur, vel in latibula se subducere, vel in longinquas regiones avolare. *Hirundinum* species quatuor observavimus.

A. 1. **HIRUNDO domestica**, *The Common, or CHIMNEY-SWALLOW.* Χελιδών. Pars supina cœruleo saturo seu nigro purpurascente colore splendet. In Sincipite & sub mento macula albicans obscurè sanguinea. *Pectus* venter & plumæ subalares albicant cum aliquo rubore. *Cauda* valde forcipata, transversa macularum albarum linea distincta & ornata. In ventriculo disjecto scarabeos invenimus. In *caminis* nidificat.

A. 2. **HIRUNDO rustica** sive *agrestis* Plinii, *The MARTIN or MARTLET.* *Caput* ut in præcedente planum & depresso. Supina corporis pars ejusdem ferè cum illa est coloris sed obscurioris & minus splendentis; prona pars nivea: *Cauda* minus forcipata est, neque extimæ pennæ proximas longitudinem tantum excedunt. Sub tectorum sugrundiis inque fenestrīs nidificat, non in *caminis*, nec nidum construit hemisphæricum & superiore parte totum apertum ut *Hir. domestica*, sed ovatum superne tectum, rotundo tantum foramine ad latus relictō, per quod ipsa intrat & exit.

A. 3. **HIRUNDO riparia** Aldrov. *The SAND-MARTIN or SHORE-BIRD.* In *Hirundinum* genere minima est. A præcedente differt quod *uropygium* non ut in illa album est: pedes nudi, non ut in illa ad un-

## 72 SYNOPSIS METHODICA

gues usque plumosi. In riparum foraminibus nidi-  
ficat.

A. 4. *Hirundo apus* The BLACK MARTIN or SWIFT. Maxima hæc est inter nostrates, capite præ-  
grandi, oris hiatu immanni, Rostro perexiguo, debili, quo  
cum *Caprimulgo* convenit. Color totius corporis, exceptâ  
maculâ sub mento albicante, pullus cum quadam viroris  
tinctura. Crura brevissima, Pedes minutissimi, structu-  
ræ singularis, qualem in nulla præterea ave unquam ob-  
servavimus, digiti enim omnes [4] antici sunt; inque  
digito minimo unicum tantum ossiculum in reliquis tribus,  
præter aliarum omnium avium normam, non plura duo-  
bus, altero brevissimo, altero longiore. Ob alarum  
longitudinem & brevitatem pedum humo ægrè se tollere  
potest.

Julius *Scaliger* hujus generis Avem se vidisse asserit  
magnitudine *Buteonis*, sed facie ab his nullo modo dissimili:  
*cruribus* tamen atque unguibus ad prædam & pug-  
nam idoneis, nec minus Rostri aduncitate.

*Hirundo marina* *Aldrovandi* hujus generis non est, sed  
*Laris* annumeranda.

5. *Hirundo Americana*, Brasiliensibus TAPER A dicta,  
*Andorinha Lusitanis*, Magnitudo, Volatus, Rostrum Hi-  
rundineum Os amplum, quod aperire ultra oculorum  
regionem potest, ut *Ibijau major*, quo cum *Apode nostra-*  
*te* convenit, ut & alarum longitudine desinentium cum  
fine caudæ. Supina pars tota coloris est fuscum griseo  
mixti: guttur & pectus grisei cum albo mixti. Venter  
albus. Parùm differt ab *Hirundine apode nostrate*.

6 *HIRUNDINIS SINENSIS* nido eduli Bontii. In tractu  
inquit maritimo oræ *Sinensis* Aviculæ parvæ discolores,  
*Hirundinum* specie, certo anni tempore, ubi æstus pro-  
lificandi eas invasit, è locis Mediterraneis ad mare in sco-  
pulos meant, & ex spuma maris basin scopolorum allu-  
entis tenacem quandam materiam colligunt, ex qua ni-  
dos suos ædificant, in iisque ova ponunt, & pullos ex-  
cludunt. Cæterùm *Chinenes* hos nidos è scopolis avulsos  
ingenti quantitate per *Indiam* venales ferunt, gulosis in  
summas delicias: qui eos *Gallinæ* seu *Vervetis* decocto  
disso-

dissolutos avidè devorant, & *Ostreis*, *Fungis* cæterisque gulae irritamentis longè anteponunt.

Hoc genus *nidos* aliquoties vidimus in museis curiosorum: sunt autem describente *Wormio*, hæmisphæricæ figuræ, ovi *Anserini* magnitudine, substantia ichthyocollam referente.

**TERTIUM** genus *Avicularum* **PARI** consti-  
tuant, 'Αἰγιδαλοι Aristoteli.

**H**I S *Rostra* brevia & pro corporum ratione majora quam aliarum tenuirostrarum, nigra. Circa *arbores* plerunque versantur, & de *insectis* quæ ibi inveniunt præcipue vicitant, inque earum foraminibus nidiificant, unde forte nomen *Anglicum* Titmouse. *Turnerus* *cannabino* etiam semine vesci prodidit; & *nucibus* quas rostellis suis perforant. *Pedes* omnibus, præter *Parum caudatum* (qui sui generis Avis est, à *Paris* longè diversi) plumbei coloris sunt.

Quinque species hoc nomine donatas in *Anglia* obser-  
vavimus.

A. 1. **FRINGILLAGO** seu *Parus major*, 'Αἰγιδαλος *anglim* Aristot. *The great TITMOUSE or OX EYE.* Magnitudine est *Fringille*; Capite & mento nigro, macula alba insigni in utraque maxilla, nigro cinctâ; reliqua pars supina è viridi flavicat, præter uropygium quod cœrulescit: Prona pars corporis lutea est. *Pedes* Plumbei.

A. 2. **PARUS ater** Gesn. *The COLEMOUSE.* Caput huic nigrum cum macula in occipitio alba; *Dorsum* ci-  
nereo-viride, uropygium viridius. *Pedes* plumbei, à præcedente parvitate sua satis distinguitur.

A. 3. **PARUS palustris** Gesn. *Aldrov.* *The MARSH-TITMOUSE or BLACK-CAP.* Caput nigrum, maxilla albæ; *Dorsum* virescit; *Pedes* plumbei sunt. A præcedente differt. 1. Quod *major* sit; 2. Cauda majore; 3. Maculâ albâ in *occipitio* careat; 4. Prona facies albidior sit; 5. Minus nigri sub mento habeat; 6. Maculis albis in apicibus tegitum alarum prorsus careat.

A. 4. **P A R U S cœruleus**, *The BLEW-TITMOUSE or NUN.* Insignis nota qua à reliquis discriminatur est azureus *capitis* color circulo albo ceu *corolla* quadam cinctus. *A rostro* ad occiput per oculos linea nigra excurrit. *Dorsum ex* flavo virescit, prona pars tota lutescit. *Pedes* plumbrei.

A. 5. **P A R U S caudatus**, *The LONG-TAIL'D TIT-MOUSE.* *Vertex* huic albicat; *collum* nigrum est; *maxilla* & *gula* alba. *A rostro* supra oculos ad occipitum hinc inde linea lata nigra protenditur. Verùm non est cur notas hujus aviculæ characteristicas solicite conquiramus, sufficit ad distinctionem caudæ figura, *Pice caudatæ* similis; *Penne* enim extimæ brevissimæ, reliquæ hinc inde ordine longiores ad medias usque quæ omnium longissimæ, differentiâ seu excessu notabili: *Cauda* pro avis magnitudine longissima est. *Pedes* nigricant. *Nidificat* ut *Passer troglodytes*, fornice desuper arcuato, ex eadem cum reliquo nido materia & simili coagmentatione extructo, foramine unico ad latus relicto quo ipsa ingrediatur & exeat. *Ova* inter omnes aviculas numerosissimæ ponit.

6. **P A R U S cristatus** Aldrov. *The CRESTED TIT-MOUSE.* *Vertex* niger fimbriis pennarum albis. *Crista* ad digiti sere altitudinem assurgit. Alias notas adferre non est opus.

**P A R U S sylvaticus** Gesneri. Non alia avis esse **D. Willughby** & nobis videtur quam *Regulus cristatus*.

7. **P A R U S Indicus** Aldrov. *Fringillagini* congener videtur, licet maculam illam nigram prorsus non habeat. Tota tribus potissimum coloribus (si oculos excipias quorum *irides* luteæ) constat cœruleo, albo & nigro. *Vertex* & *collum* totum dilute cœruleum, pars prona tota candida: *Ale* cœruleæ, ut & *cauda*, quæ totum corpus adæquat, vestitrices dilutiùs, *Remiges* pennæ intensiùs. Hæc mihi suspecta. Puto Aldrovandum iconem pictam descripsisse. *Pedes* nigerrimi & exigui, quo à *Faris* differt.

*Quartum Avicularum genus MOTACILLAS.*

**C**AUDA his prælonga, quam perpetuè fere motant, undenomen. Circa aquas præcipù versantur. Harum duæ apud nos habentur species.

A. 1. **MOTACILLA alba**, The WHITE WATER-WAGTAIL; *Corpo ex albo & nigro cineróve vericolore.*

A. 2. **MOTACILLA flava**, The YELLOW WATER WAGTAIL. Prona pars corporis flavet, pectore obscuriore: Supina obscurè virescit, medio dorso nigricante. *Vertex ex viridi flavicat.* Magnitudine & figurâ cum alba convenit, & caudæ motitatione ferè continua.

3. **MOTACILLA cinerea**, an *flava altera* Aldrov. ? Magnitudo *Motacillæ vulgaris*, Vox acutior & clamoriosior. Supina pars corporis cinerea. *Caput non nihil fuscescit.* *Mentum & guttur albo & cinereo varia:* *Pectus & venter exalbo lutescunt:* *Uropygium circumcirca intensius luteum.* *Fluvios lapidosos frequentant, & insectis aquaticis vescuntur.*

4. **JAMACAI Brasiliens.** Marcgr. *Alaudæ est magnitudine;* *Cauda 4 ferè digitos longa:* *Caput parvum;* *rostrum digitale, rectum, nigrum, inferiù propè exortum cœrulescens.* *Caput nigrum, ut & collum inferiù, superiù luteum.* *Dorsum: totum, pectus, & infimus venter lutea:* *Alæ nigræ, maculâ in medio albâ:* *Cauda nigra.* *Pedes fusci.* Ob caudæ longitudinem, & plumarum colores non admodum diversos hanc Avem *Motacillis* subjunximus, an rectè nescimus; cùm de loco, victu, aut caudæ motitatione nihil tradat *Marcgravius.*

*Succedant Quinto in loco OENANTHÆ dictæ.*

**Q**UARUM Notæ, *Pedes nigri, ut & Rostrum;* *Cauda bicolor, exterioribus, pennis albis.*

A. 1. **OENANTHE sive vitifloræ**, The FALLOW-SMICH; *Suffexiensibus The WHEAT EAR,* quia messis tempore se ad montes *Downs* dictos recipit, ubi

## 76      SYNOPSIS METHODICA

ubi *scarabæis* aliisque insectis quæ ibi invenit pinguescit admodum, & in delicis habetur. Alibi ab *Uropygii* colore **WHITE-TAIL** dicitur ut Italis *Culo bianco*.

Magnitudine *Passerem* superat. Color capitis & *dorsi* cinereus cum quadam ruboris mixtura; *uropygium* supra caudam albet. Totus *Venter* rubore diluto tingitur, *Pectus* plus rubet. Supra oculos ad *occiput* linea alba extenditur, infra oculos in mariibus ductus niger ab angulis oris ad aures. *Rostrum*, pedes, unguiculi nigra.

**2. OENANTHE** altera Aldrov. Superiore minor est, *Passere* major; pennis omnibus, exceptis alarum remigibus (quæ nigræ marginibus luteis) ex ruffo flavescit, in *dorso* intensius, in *pectore* remissius. Retro oculos macula est oblonga nigra, figurâ quodammodo semilunari.

**A. 3. OENANTHE secunda nostra seu Rubicola;** The **WHIN-CHAT.** *Metacille* est magnitudine. Pars supina xerampelina, maculis nigris seriatim dispositis varia. *Venter* albicat cum aliqua rufi tintura, *Latera* & *pectus* summum ex ruffo lutea. Duæ maculæ albæ utramque alam insigniunt. A sequenti ave his præcipue notis distinguitur. 1. Quod pars corporis supina pulchrius sit colorata, plumulis media parte circa scapum nigris, marginibus albis; 2. Quod in utravis ala duas habeat maculas albas; 3. quod imæ pars *caudæ* alba sit. 4. Quod *caudæ* tam supra quam subtus incumbentes pennulæ ultra mediam caudam excurrant, & albarem penitus contegant & occultent: 5. Ductus albidi à rostro ad *occipitum* usque protendantur. *Rostrum*, pedes, unguiculi nigri.

**A. 4. OENANTHE nostra tertia, Muscicapa tertia** Aldrov. *Rubetra Bellonii.* The **STONE-SMICH, or STONE-CHATTER,** Turnero The **MOOR-TITLING.** Magnitudo *Linariæ*, caput *nigrum*, ut & collum; ad latera utrinque maculâ albâ notatur, adeò ut torquata videatur. Medium dorsum *nigrum* marginibus plumarum fulvis, supra *uropygium* macula alba. *Pectus* fulvum aut ex flavo rubrum; *venter* albet cum aliquo rubore. Macula alba dorso proxima utramque alam in utroque sexu ornat: quæ præcipua est hujus avis nota.

nota. *Rostrum*, pedes & unguis nigri ; quæ nota est omnibus *Oenanthis communis*. In montosis *Pecci Derbiensis*.

A. 5. *OENANTHE nostra quarta*, monticola, *Coldfinch Germanis dicta*. Venter ei albus, *pectus* luteo fuscum : *Caput* & *dorsum* è fusco seu viridi cinerea : tegetes caudæ pennæ nigræ. *Alarum remiges nigræ*, verū à quinta omnes fundum versùs albæ. *Rostrum* nigrum, compressum & ferè triangulare. *Pedes* nigri.

A. 6. *FICEDULÆ affinis*, an *Spipola prima*. Aldrov. *The WHITE-THROAT*. *Ficedulæ* est magnitudine, corpore productiore. *Supina* pars corporis ex ruffo cinerea ; summum *caput* magis cinereum. *Mentum* album, unde nomen : *Gula* ex albo rubet ; *Pectus* etiam & venter imus rubescit sed dilutiùs. *Rostrum* superiùs nigrificat, inferiùs albet. *Os intus* flavum. A *Ficedula septima* Aldrov. differt, quod illi cauda tota unicolor sit, huic extimæ ejus pennæ albæ.

7. *MUSCICAPA prima* Aldrov. *Boarina Bononiensis*. *Avicula* est oblonga, *rostro* etiam oblongo, ex fusco rufescente. *Supina* pars tota è plumbeo, cinereo, & subluteo colore mixta ; *prona* candidat. *Pectus* verò nigris maculis distinguitur. *Ale* ex nigro lutescente albóque variæ. *Tibiae* & *pedes* nigricant.

### Aviculæ cauda unicolore variæ.

A. 1. *STOPAROLA* Aldrov. eive persimilis *Avicula*. Magnitudine & colore *Passerculo fœminæ* similis est, verū corpore longiore & tenuiore. *Supina* pars tota cinerea aut fusca [colore murino] caput tamen maculis nigris conspergitur in vertice, ut recte *Aldrovandus*. *Prona* pars albida : *Gula* & latera nonnihil rufescunt. *Cauda* tota fusca : *Alarum remiges* nigricant, veruni interiorum margines lutei. *Rostrum* rectum nigrum, ad naribus latiusculum & depresso. *Mandibula* superior secundum longitudinem in angulum assurgit, unde *Rostrum* triangulum videtur, estque inferiore paulo longior, apice adunco ; *Rictus* amplius, *Os intus* flavum. *Pedes* exigui nigri, ut & *Aldrovandus* notat. In ventriculo *Scrabæi* ; *muscae*, &c. *Hortos* æstate frequentat in *Anglia*.

## 78 SYNOPSIS METHODICA

Muscis capiendis *Rostrum* comparatum est. In pullis dorsum maculis albis & nigris varium. Aviculam hanc prolixius descripsimus, ut cuivis attento ab aliis omnibus facilè possit distingui.

A. 2. **LUSCINIA** seu *Pbilomela*, 'Andōy. *The NIGHTINGALE*. Avis hæc, à cantu nocturno nomen adepta, omnibus seculis notissima est. At qui cantantem internoctu sæpius audiverunt, & vocem ejus optimè tenent, plerique tamen formam avis ignorant. Magnitudine est *Carduelis* aut *Ruticillæ*; corpore longiusculo, nulla ferè colorum varietate, aut pulcritudine spectabilis, supina parte totâ dilutè fulvâ, cum aliqua viroris mixtura, ut in *Turdo Iliaco*. Cauda fulvo saturatiore tingitur velut *Ruticillæ*. Venter totus albicat, *Pectoris* & gutturis plumariūmque subalarium color obscurior est admixto viridi. *Rostrum* subnigrum. *Pedes* coloris carnei obscurioris. *Os intus* flavum velut *Turdorum*.

A. 3. **RUBECULA** siue *Erythacus* Aldrov. 'Feistzō, Aristot. *The ROBIN-RED-BREAST, or RUDDOCK*. Hæc etiam avis ubique ferè gentium notissima, à pectore rubenti denominata, alia præter hanc notam non indiget descriptione. Pars supina tota, ut in *Turdis cinereo-viridis*. Hyberno tempore ad victimum quærendum etiam domos subintrat, hominibus velut amica & familiaris.

4. *Rubecula Indica*. Mus. Leyd.

A. 5. **RUTICILLA**, Φοινίκης Græcis, *The RED-START*. *Pectus*, partes subalares, uropygium, cauda ruffa. *Venter* imus albet. *Caput*, collum, dorsum colore plumbeo imbuuntur. *Sinciput* maculâ albâ insigne. *Gula* & *maxillæ* sub oculis nigræ. *Rostrum* & *pedes* nigri, *Os intus* flavum.

Tres adhuc alias *Ruticillæ* species tradunt & describunt *Gesnerus* & *Aldrovandus* 1. *Ruticilla Tertia* *Aldrovandi* cuius descriptio *Gesneriana* cum nostra *Ruticillæ vulgaris* exactè convenit. 2. *Rotschmentzel* *Gesn.* à cauda rubente dicta, ex pictura descripta. 3. *Wegflecklin* circa *Argen-toratum* dictæ pectore cœruleo imo tamen subrutto ex flavo,

flavo, *ventre* cinereo, *cruribus* fulcis, *mento* fusco & vario.

A. 6. CURRUCA Eliotæ, an Magnanina Aldrov. ?  
The HEDGE-SPARROW. Magnitudine est *Rubecula* ferè ; Color supinæ partis varius ex nigro & sordidè ruffo, mediis plumularum circa scapum partibus nigricantibus, exterioribus sordidè ruffis : *Caput* & *collum* non-nihil cinerascunt, maculis mediis obscurioribus : Infimum dorsum supra uropygium virescit aliquantulum, & maculis destituitur. *Prona* pars corporis cinerea seu plumbea, imus tamen venter albicat. Summa Avis hæc terreo & sordido est colore, à cuius aliquali cum *Passer* fœmina similitudine *Paffer sepiarius* dicta est, hujus ova colore pulchrè cœruleo tinguntur.

A. 7. FICEDULA septima Aldrov. PETTICHAPS Eboracensisbus. Beccafigo Italis. Magnitudine est *Linnæi*, corpore breviusculo. Color capitis, dorsi, alarum & caudæ ex cinereo, seu (*ut alii*) ex fusco viridis. *Prona* pars tota alba seu argentea, pectore duntaxat obscuriore cum aliqua flavi tintura. Nullâ ferè colorum diversitate insignis est hæc avicula. *Rostrum* nigricat. *Pedes* cœrulei-lescunt. In dissectæ ventriculo vinacea aliisque semina inveni.

A. 8. ATRICAPILLA sive Ficedula Aldrov. Συργάλις & Μελαγκόνης Græcis. The BLACK-CAP. Parva eit avicula, capite summo nigro, unde ei nomen, *collum* cinereum, dorsum totum obscurè viride. *Pectus* dilutè cinerascit, *venter* imus ex albo flavescit. *Rostellum* nigrum, tenuius quam *Paro*, *Pedes* plumbei.

A. 9. REGULUS cristatus Aldrov. *Trochilus* Plinio & Aristot cui & Πτερεύς & Βασιλίς, The GOLDEN-CROWN'D WREN. Parvitate sua, & maculâ croceâ seu dilutè coccineâ amoenissimâ (quam *cristatum* vocant) in vertice, ab aliis aviculis satis distinguitur. *Collum* & dorsum totum è viridi obscuro flavicant ; *Pectus* & *venter* colore viridi in album languente profunduntur. In illo nobis descripto Ventriculus insectis plenus erat. In summis arboribus, præsertim *Quercubus* versatur. We found it in Middleton Park in Warwickshire. Mr. Francis Joffe in

## 80 SYNOPSIS METHODICA

Yorkshire. *Also we are inform'd it is in some Woods about Oxford.* In agro Cardiganensi Cambriæ frequens est, nomine Britannico Syvīgw i. e. *Parus chrysocephalus* dicta D. Lhwyd.

A. 10. *REGULUS non cristatus* Aldrov. An *Asilus Bellonii?* an *Luteola Turneri?* Neque hæc, quod sciam, nomen *Anglicum* invenit. *The small YELLOW-BIRD.* *Regulo cristato tantillo major est.* Tota pars *supina* præter alas & caudam è fusco seu cinereo virescit: *Prona*, v. g. *gula*, *pectus*, *venter*, *alba* cum levī *viroris tinctura*: alias lutescit. Inter *Salices* plurimū versatur, perque arbores & frutices continuè reptat, & cantat voce stridula *Locustæ*. Variant coloribus hujus generis Aves; aliæ enim dilutiùs, aliæ intensiùs virent aut flavent.

A. 11. *PASSER troglodytes* Aldrov. *Turnero & Bellonio* perperam *Regulus*. *The WREN.* *Caput*, *collium*, *dorsum* ex fusco spadicea; *Alæ*, *cauda*, *Dorsum*, *lineis transversis nigricantibus varia*: *medium pectus albidius*, *inferius & ad latera lincas nigras transversas obtinet*. *Caudam* plerumque erectam tenet. *Nidus ex mulco constructus* ovi in alterum extremum erecti, *figuram* habet foramine in latere ad ingressum aperto.

*Aviculæ nonnullæ Aldrovando aliisque descriptæ, ad superiores referendæ & locis suis disponendæ.*

1. *LUSCINIOLA* seu *Roufette* Bellonii Aldrov. Tom. 2. Pag. 765. An eadem cum *Giarola* Aldrov. *rostro rubicundo, colore Coturnici simili.*
2. *Oenanthe congener* Aldrov. *ibid. p. 764*
3. *Spipola prima* Aldrov. quam nostræ *White-Throat*, eandem esse suspicamur.
4. *Spipola altera* Aldrov. *Pectore rubicundo maculis fulcis deorsum descendantibus distincto; supinè cinereo, ventre albescente; maculâ retro oculos ad ferrugineum accedente.*

accidente. *Oenanthe nostræ secundæ* similis est, si non eadem.

5. *Spipola tertia* seu *Boarina*, ex albo lutescens ejusdem. p. 732.

6. *Avis consimilis Stoparolæ* & *Magnaninæ* ejusdem. Magnitudo *Motacille*; *Rostrum* oblongum, acutum, rectum, nigrum; *Pedes* plumbei, supina parte pallidâ; iridibus oculorum albis.

7. *Grisola* Aldrov. *Rostrum* tenue & longiusculum; *Collum* & *pectus* maculis fuscis oblongis deorsum vergentibus interstinguitur. *Venter* totus candidat: supina pars tota fuscescit. *Crura* & *pedes* fusti vel nigricantes.

8. *Glareana* seu *Grien Vogelin* Gesn. Et huic *pectus* maculosum; cum iconem tantum pictam descriplerit *Gesnerus*, nos plura non addemus.

9. *Anthos æqualis Fringillæ*, *lutescens* Aldrov. Tom. 2. p. 75.

10. *Muscicapa secunda* Aldrov. seu *Borin Genuensium*. *Regulo* paulò major, *Rostro* gracili acuto; colore in supina parte dilutè cinereo; in prona ex albo ad luteum tendente. *Alæ* superiùs leucophææ: *uropygium* album. *Crura* & *pedes* spadicei.

11. *Salicaria* Gesn. *An Silerella D. Brown?* Avicula est minima; colore partim fusco, ut parte prona; partim subflavo, ut supina; [voces pronae & supinæ contraria nobis significatione usurpat *Gesnerus*] partim albicante, ut per latera & circa collum. *Rostro* gracili recto; *crusculis* subruffis.

12. *Ficedula quarta* Aldrov. Supinx partis color fuscus ad castaneum vergens. *Fæmina* prona tota albicat; mas ex albo ad cinereum vergit. *Alarum remiges* in mare nigræ sunt cum quibusdam intercurrentibus albis; in *fæmina* ad castaneum vergunt; quemadmodum & *cauda*, quæ in mare etiam est nigra. Contra fit in *pedibus*, qui in mare subcastanei sunt, in *fæmina* nigri.

13. *Strapazino* vulgo Aldrov. *Podex* & *cauda* ferè tota candidant, *capite* & *dorso* luteo ferrugineo, *pennis* *alarum* *seminigris*, & *semiluteis*. *Prona pars* ex albo leviter

leviter flavescit. *Rostrum* fuscescit. *Cauda* versus uropygium lutea, cætera nigricat.

*Aviculae exoticæ omnium minimæ, Marcgravio aliisque descriptæ.*

1. **G**UAINUMBI Marcgr. *Guaiminibique* Joanni de Laer, *Gouambuch* Lerio & Theveto. *Tominio* Joseph à Costa. *Ourissia* i. e. *Radius Solis* sive *Tamineio* Clus. *Hitzitzil* Hernand. *The HUMMING BIRD.* *Avicularum omnium minima* est. Parvitatem sua & pennarum coloribus cuiusvis serici, auri, aliusve metalli splendorem superantibus ab omnibus aliis Aviculis differt. *Alas* tanta perniciitate movere dicitur, ut motus visu percipi nequeat; quin & inter volandum strepitum quendam edere instar *Crabronis* aut *apiculae*; & à loco in locum tanta velocitate se transferre, ut volans sæpissime oculorum aciem omnino fugiat.

*Melie*, rore, & florum succo, quem linguis suis longissimis, à natura ad id comparatis, exsugunt, (alarum operis in aëre se per longum tempus librantes velut quietæ) alidicuntur hæ aves. Verùm cum ventriculum musculosum obtineant, nos *muscis* aliisque *insectis* potius vesci opinamur. Quod per totam hyemem obdormiscant, & velut torpidæ & semimortuæ jaceant, à multis proditum invenio. Sit fides penes Autores, mihi certe non persuaserint, cum in iis regionibus in quibus maxima harum Avicularum copia est, nulla fere hyems sit: & *Marcgravius* eas magno numero in sylvis per totum annum inveniri scribat.

Harum septem species depingit *Fr. Hernandez*, novem describit *Marcgravius*.

1. *Guainumbi major*, *supina* parte viridi; aureo, igneo, flavo intermicantibus; pronâ alba; alis spadiceis; cauda chalybis politi instar cœrulecente.

2. *Guainumbi major*, *supina* parte præcedenti concolore, pronâ viridi cum aureo colore splendente; albâ prope anum maculâ.

3. *Guain.*

3. *Guainumbi minor*, caudâ longissimâ forcipatâ, capite & collo nigro cœruleo splendente, dorso & pectore viridi aureo splendente, alis epaticis, cauda ex nigro cœrulecente, maculâ prope anum albâ.

4. *Guainumbi minor*, rostro incurvo, superiore mandibula nigra, inferiore flava : supina parte primæ speciei concolor est ; prona ex albo rufescens, cauda ex nigro vitescente, extremitate alba. *Cruribus albis.*

5. *Guainumbi minor*, rostro nigro : prona parte nigra cum cœruleo quodam splendore, macula prope anum albâ ; supina parte pennis aureo igneo & viridi mixtis coloribus tinctis ornata. Cauda eleganter brunnea cui cœruleus transplendet.

6. *Guainumbi minor*, toto corpore aureo, cum igneo dimidio & minimo viridi coloribus mixto splendente, *Alijs nigricantibus* ; *cruribus nigris* ; *cauda versicolore.*

7. *Guainumbi minor*, corpore toto cinereo fere, ut *Passer*, cui hinc inde mirè resplendens rubrum instar *Rubini* perlucet.

8. *Guainumbi major* : capite & collo supino rubi colore fulgente, gutture & collo prono, aureo politissimo ; imo ventre & initio dorsi nigerdine holosericea, reliquo viridi fusco perfuso : *Alijs fuscis*, maculâ profè anum albâ.

9. *Guainumbi major*, toto corpore exceptis alis (quæ ut in plerisque fuscæ) insigni viriditate cum auro transplendente, qualis in secundæ ventre cernitur, tincto. Plenæ descriptiones vide apud *Marcgravium.*

10. **G**UIRA GUACUBERABA Brasil. *Maregr.*  
*Magnitudo Carduelis* : Collum inferius, *dorsum*, & ventris extremitas lutea seu aurea : Caput superius & colum, dorsi medietas anterior, alæ & cauda dilutè viridis. Sub gutture ad oculos usque maculam habet magnam, nigram. *Rostellum rectum*, acutum, flavum, superne paulum nigricans : *Crura & pedes fusi.*

11. **G**UIRACOEREB A Brasil. *Marcgr.* *Magnitudo Fringille* ; *Rostrum* nigrum, acutum & paulum deorsum flexum. *Mitellam* in capite habet è thalassinis pennis. Reliquum caput, prona pars tota cum dorsi medietate posteriore cœruleis vestiuntur pennis lactescentibus.

bus. A pectore per initia alarum ad dorsum linea lata cœrulea transit transversim per exortum alarum ; totum autem collum superius cum medietate dorsi anteriore profundè nigris holosericeis vestitur pennis. Cauda sesquidigitalis nigra. Alæ magnæ, quæ ad medietates laterales flavescent, subtus ferè totæ flavicant. Pedes cinabarini.

12. JAPACANI Brasiliensibus Marcgr. Avis magnitudine Bemtere ; Rostro oblongo, nigro, paulum deorsum incurvato : Oculis aureis Capite nigricante : Reliqua pars supina ex Umbra & nigro mixta. Cauda superiùs nigricans, subtus alba. Prona pars tota ex albo & flavo mixta, lineis transversis nigricantibus striata. Crura fusca.

13. TANGARA Brasiliensibus Marcgr. Magnitudo Fringillæ : Rostrum rectum crassiusculum, nigrum : Pedes ex cinereo fuscii. Supra rostri exortum macula nigra. Totum caput & collum viride. Initium dorsi instar collaris ambiant pennæ nigerrimæ ; reliquum dorsum luteum : totus infimus venter egregiè cœruleascit. Alæ nigrae, earumque extremitates laterales cœruleæ. Initium alarum exterius thalassinum ; scapulares dorso incumbentes pennæ partim flavæ. Cauda sesquidigitalis, pennis nigris, lateralium extremitatibus cœruleis.

14. Hujus alia datur species magnitudine passeris ; Rostello è flavo fuscō, latiusculo, acuto. Plumago capitis egregiè miniata ; reliqui corporis cum alis & cauda splendidè nigra. Cauda brevis. Crura superiora alba, in latere exteriore maculam oblongam miniatam habent. Pedes cinerei.

15. QUAUH CHI CHIL seu *Avicula capitis rubei* Hernand. Guainumbi paulò major, infra candens, supernè virescens ex fuscō ; capite coccineo, rostro & pedibus atris. Avis est canora.

*Aves minores crassis & validis rostris.*

A. **G**ARRULUS *Bohemicus* Aldrov. *The SILK-TAIL Germanis.* Quam D. Lister Eboraci globo transfixam vidit, magnitudine *Turdum* ferè aequalibat. Huic in extremis alarum pennis 4 aut 5 apices parvi, coccinei, nudi, minimè plumis vestiti. In extrema cauda limbus latus luteus instar corticis citri, unde nomen *Germanicum*. Cætera maximam partem *Lanium* colore refert. Adde ex *Aldrovando Rostrum* nigerissimum esse, magnitudine *domestici Passeris*: Caput more *Alaudæ cristatae* apice retro vergente insignitum esse, colore rostrum versus subcastanei diluti; retro verò cinerei, ad fulcum inclinantis. Ob parvitatem suam, & Rostrum crassissimum huc potius quam ad *Garrulos* referendam duxi hanc avem, quamvis *Aldrovandus* fructibus eam velci, & præcipue uvis inhiare scribit, cum hujus generis aves seminibus potius delectentur. Nemini ergo de hac re liquem moveo.

A. 1. **C**OCCOTHRAUSTES *vulgaris*, *The GROSSE-BEAK, or HAW-FINCH.* Caput huic sed præcipue *rostrum* majus quam pro corporis mole, unde nomen *Anglicum*, nec alia characteristica opus est. Rarius, nec nisi per hyemem, in *Anglia* videtur.

2. **C**OCCOTHRAUSTES *Indica* Mus. Leyd. Q. an à sequenti diversa sit?

3. **C**OCCOTHRAUSTES *Indica cristata* Aldrov. *The VIRGINIAN NIGHTINGALE.* Merula par est aut paulò minor. *Torquis niger* oculos & rostrum cingit. *Rostrum* autem quale vulgari aut paulò brevius. Caput cristâ fastigiata insigne, quam sæpius motitat, tam versus rostrum, quam versus caudam. *Celor* totius pulcherrimè coccineus, in capite & cauda dilutior.

A. 4. **C**HLORIS Aldrov. *The GREEN-FINCH.* *Passer domesticus* major est, *Coccothrauste* minor: *Rostrum* hujus rostro simile, intundibuli figurâ, sed multò minus, *Supina* pars corporis viridis; *Pectus* ex luteo viride.

*Venter* albet. *In sepiibus* nidificat. *Seminibus raptorum,* carduorum, lapparum, & lubentissimè *Cannabis* vescitur.

A. RUBICILLA seu *Pyrrhula* Aldrov. *The BULFINCH, ALP, or NOPE.* *Caput grande, Vertex niger.* Pulcherrimus miniaceus color in mare pectus, gulam, & maxillas ad oculos usque illustrat. *Supina pars corporis cinerea cœruleâve cum aliqua ruboris tinctura.* Lubentissimè vescuntur arborum gemmis, unde non leve hor tulanis detrimentum inferunt.

*Rubicilla Americana, GUIRA TIRICA* Brasiliens. *Marcgr. Magnitudo Alaudae, rostrum superius fuscum, inferius album sive incarnatum: Crura cinerea.* Totum *caput* cum gutture & colli inferiore ac media parte egregiè sanguinei sunt coloris. *Oculi cœrulescunt.* Latera *colli*, totum pectus, ac infimus venter alba. *Collum superius nigricat albo paucō admixto.* *Dorsum & initium aliarum griseum;* reliqua pars ut & cauda nigra. *Oræ laterales in aliis albæ.*

A. LOXIA, *The SHELD-APPLE, or CROSSE-BILL.* Colores ter in anno mutare dicitur. *Rostrum contra omnium aliarum avium normam, ab utraque parte recurvum est, mandibulis versùs summitatem se decussantibus.* Avis est voracissima; *seminibus cannabis, & Abietum nucleis gaudet.* Aiunt eam uno vel altero rostri ictu pomum integrum confestim per medium dividere, ut ejus nucleis seu *seminibus* vescatur. Per *Autumnum* interdum sed rariūs in *Angliam* venit, non tamen apud nos perennat aut nidificat.

A. PASSER *domesticus* Στερδος, *The HOUSE-SPARROW.* Hæc avis ubique gentium vel nomine solo satis nota, colore est testaceo, terreóve. *Mari caput ex fusco cinereum, mentum nigrum, supra oculos duæ utrinque maculæ parvæ albæ.* Salacissima esse dicitur, & brevis ævi. *Frumenti granis lubentissimè vescitur, unde & segetibus infesta est.*

*Passerum*, præter vulgarem, 16 species exhibet & describit Aldrovandus: quorum lemmata duntaxat dabis.

1. *Passer stultus Bononiensium*; colore undique flavescente, maculis rufis oblongis deorsum descendantibus ubique conspersus.

2. *Passeribus congener Aldrov.* lib. 15. cap. 17. *Supina parte rufescente, prona candida, maculis subrufis ciblongis deorsum descendantibus ubique depicta.*

3. *Passer maculatus sive tricolor Aldrov.* lib. 15. cap. 13. *Colores sunt albus niger & subflavus.*

4. *Passer Albicilla Aldrov.* lib. 15. cap. 14. *Cauda ex cinereo candicat, cætera Passeri domestico ferè similis est.*

5. *Passer Illyricus Aldrov.* lib. 15. cap. 21. *Hunc tantum depictum vidit Aldrovandus. Passere domestico major est, colore alicuius ei similis.*

6. *Passer torquatus Bellonii.* *Passere vulgari corpore & rostro major oculos sub supercilio torque alba ambiente.*

7. *Passer pusillus in Juglandibus degens Bellon.* *Eriguet Gallis dictus, omnium minimus.*

8. *Passer Indicus caudatus porphyromelas Aldrov.* lib. 19. cap. 28. *cauda 5 digitorum, & alarum remigibus nigerimis, reliqua parte supina purpurea.*

9. *Passer Indicus macrourus, rostro miniaceo Aldrov.*

10. *Passer Indicus macrourus alijs Aldrov.*

11. *Passer Indicus brachyurus Aldrov.* lib. 15. cap. 24.

12. *Passer brachyurus nostras Aldrov.* *toto corpore flavescente; prona tamen parte magis albicante; Rostro intensius luteo.*

13. *Passer erythromelas Indicus sine uropygio Aldrov.* *toto corpore & alarum principiis coccineis, reliquo alarum atro. Passer Americanus Tijepiranga Brasiliensibus in omnibus ferè convenit cum hac ave, præterquam quod uropygio & caudâ donetur: Verum Avem ex imagine picta descripsit Aldrovandus, & fortasse Avis quæ pingebatnr cauda & uropygio mutila fuit.*

14. *Passer Indicus cyanerythromelas sine uropygio Aldr.* *Harum icones pictas descripsit Aldrovindus.*

15. *Passer montanus in Stiria & Corinthia frequens* nobis observatus. *Mentum nigrum, item macula ad au-*

## 88    SYNOPSIS METHODICA

res utrinque nigra. *Caput* ex fusco rubet. *Torquis* albus collum ad medium ferè & maculas ad aures cingit. *Cætera Passeris vulgari* similis.

16. *Passer sylvestris* Aldrov. lib. 15. cap. 16. *Vertex* ut in præcedente ferrugineus ad cinnabarinum tendens: *oculorum ambitus* albus. *Mentum & collum* inferius lineæ transversales nigriuscule percurrent.

**PASSER CULUS ZEYLANICUS arvensis guttatus**, *Wikurulla* Zeylanensis, i. e. degens in agris oryzæ consitis *Mus Leyd.*

*Idem alterius coloris.*

A. FRINGILLA, *The CHAFFINCH*. *Passere tanillo minor est, cauda satis longa. Caput* in mare cœrulescit, at quod naribus contiguum est nigricat. *Dorsum ruffum* cum cinerei aut viridis mixtura: *Pectus* rubet: *Venter* sub cauda albicat. In *sepibus* nidificat; Estque apud nos in *Anglia* frequentissima.

A. FRINGILLA montana seu *Montifringilla*, 'Oegawia' Aristot. *The BRAMBLE, or BRAMBLING, or MOUNTAIN FINCH*. *Supina pars* ad medium *dorsum* *Sturni* est colore, è nigro splendens, plumarum marginibus ruffo-cinereis; *infima pars dorsi* circa *uropygium* alba. *Gula* è flavo ruffa, *pectus* album. *Plumæ* ponè anum subruffæ. *Plumago* sub basi seu flexura alæ pulcherrimè flavet, supra *Mali aurantii* colore imbuitur. *Remiges* *alarum* nigræ, maculâ albâ notatæ. *Rostrum* nigrum. *Pondus & magnitudo* præcedentis.

A. MONTIFRINGILLA calcaribus *Alaudæ* seu *major*. *The great pied MOUNTAIN FINCH, or BRAMBLING, Aucupibus Eboracensibus, SEA-LARK*. *Alaudæ vulgari* magnitudine par est. *Vertex* è fulvo seu fusco rufescens, castanei fere coloris. Rufescunt etiam *collum superius, pectus* (sed dilutiùs) *uropygium*, & *latera*: *reliqua pars prona* alba. *Supina pars* è nigro & ruffo-cinereo eleganter variegatur, mediis plumularum partibus nigris, lateralibus è cinereo ruffis. In summis alis & imo dorso rufescit magis. *Alæ* nigræ cum macula in medio alba, seu spatio lato albo. *Rostrum* luteum apice nigricante. *Pedes & unguis* *nigerrimi*, postico prælongo

longo ut in *Alaudis*: quæ nota sola ad distinctionem sufficit.

In Septentrionalibus montosis, sed rariis, occurrit. D. Willughby in agro Lincolnensi eam occidit. In agro Eboracensi sœviente bruma sat copiose capiuntur.

### *Aviculæ Brasilienses PASSERI aut FRINGILLÆ affines.*

**T**IJEPIRANGA secunda species Marcgr. *Passeris* est magnitudine: pennis per totum corpus ex cinereo cœruleo mixtis: *Alæ* quodammodo ad thalassinum colorem accedunt. In ventre albicat. *Crura & rostrum*, (quod ipsi *Fringillæ* simile) cinerea.

2. **GUIRANHEEMGATU** Marcgr. Magnitudo *Passeris*: *Caput* superius & guttur luteum: reliqua pars prona flava. *Alæ* ex virescenti & flavo mixta & fusco distinctæ: *Crura* fusca. Egregiè cantat ut *Fringilla*. Possent hæc aves ad *Passeris* referri, quo & in Ornithologia D. Willughby eas retulimus.

3. **SAYACU Brasiliens.** Marcgr. Magnitudo *Fringillæ*: Color in toto corpore è cinereo & thalassino mixtus, in dorso splendens. *Rostrum & Oculi* nigri.

4. **GUIRAPEREA Brasiliens.** Marcgr. *Alaudæ* est magnitudine; *Rostro* brevi, crassissimo, nigricante; supina parte, & infimo ventre obscurè flavo: prona pars reliqua nigra. *Cauda & alæ* fuscae seu nigricantes, laterali extremitate thalassina. *Pedes* obscurè cinerei.

5. **TIJEGUACU PAROARA Brasil.** Marcgr. Magnitudo *Alaudæ*: *Rostrum* breve, crassum, fuscum, infernè albicans. *Caput* superius, item guttur & collum inferius in mare sanguinea, in foemina flava, sanguineo punctata: reliqua pars supina cinerea: *Alarum & caudæ* penæ fuscae oris albescientibus. *Latera collis, & prona pars corporis* alba. *Pedes* fusi.

A. I. **CARDUELIS**, an *Xenospizans* Aristot. ?'Anagris recentioribus Græcis, The GOLD-FINCH or THISTLE-FINCH.

**FINCH.** *Rostrum* coni figurâ, albidum. *Passere minor* est. Color verticis niger, maxillæ albæ, *Occipitium* etiam albicat. A vertice ad collum fere producta linea lata nigra alborem terminat. *Basin rostri annulus coccineus* ambit. Ab oculis ad rostrum hinc inde ductus niger extenditur. *Collum & dorsum anterius ex ruffo fulva vel cinerea.* *Uropygii, pectoris, laterum idem color sed dilutior.* *Venter albus;* *Alæ & cauda nigrae,* apices tamen pennarum principum in utrisque albi. *Alæ ductu pulcherrimo flavo transverso insigniuntur,* unde *Aurivittis* nomen *Aviculae* inditum. *Carduorum* feminibus vescitur hyberno tempore.

2. *Cardueli congener* Aldrov. Major *Carduele*; *Rostro fasciola crocei* coloris cincto. *Alæ nigriores quam in aliis;* quodque in illis lutei est in hac ferè pallescit. Fortè *Spurium* aliquod genus est.

3. *ACATECHICHICTLI* seu *Avis confricans* se ad *Arundines* Hernand. *Carduele* paulo minor est, desuper è fulco virescens, subtus pallescens ex albo. *Cantillat ut Acanthis,* & simili utitur alimonia.

4. *COZTOTOTL* seu *Avis pallida Mexicana* Hernand. *Canariensis* *Avis* magnitudine est, tota lutea, extremis tamen alarum partibus nigris. *Cantu Carduelis* imitatur.

### *Aviculae crassirostræ minimæ.*

**L**inarie notæ sunt, 1. Magnitudo infra *Fringillas*: 2. Color ex cinereo & fusco mixtus aut varius. 3. *Cauda* nonnihil forcipata. 4. Extimæ caudæ pennæ marginibus tantum albæ, 5. *Cantus* suavissimus.

A. 1. **LINARIA vulgaris**, The COMMON LINNET. *Caput* ex cinereo & nigro varium est, *Dorsum* ex nigro & ruffo. *Pectus* albet, inferior *Venter* circa podicem flavicat. *Prolobi regio* seu infima gula pulcherrimè rubet, fimbriis pennarum luteis seu luteo-ruffis. *Lini* semine vescitur unde nomen, sed & *Cannabis*, & *Cardui*, &

*Pbala-*

*Phalaridis, & Milii*, unde & *Miliaria* nonnullis dicitur.  
Pedum color obscurè fuscus seu nigricans.

A. 2. *LINARIA rubra major*, The GREATER RED-HEADED LINNET. Præcedente aliquanto minor est. & verticis colore rubro, minus tamen splendente, insignis. *Pectus* rubicundo colore tingitur.

A. 3. *LINARIA rubra minor*, The LESSER RED-HEADED LINNET. Præcedente *minor* est. *Synciput* colore rubro seu miniato splendente insigne. A præcedente differt, 1. Quod, ut diximus, *minor* est : 2. Quod *rostro* minore & acutiore. 3: Quod fœmina cum mare colore *verticis* rubro aliquatenus conveniat, secus quam illius fœmina, quæ hæc notâ caret. 4. Quod *pedes* huic nigriores. 5. Quod *caudæ* pennarum margines angustius albcent. 6. Quod *alarum* pennæ secundi ordinis albcent, & lineam albam ad alas transversam efficiant. Tandem 7. Quod avis hæc gregaria sit, non item illa.

A. 4. *LINARIA montana*, The MOUNTAIN LINNET. Præcedente duplo *major* est. *Rostrum* ejus simile, multo sci. pro corporis proportione minus quam secundæ speciei. Color *Linariae vulgaris*, *Uropygium* duntaxat pulcherrimo colore miniaceo splendet. *Cauda* prælonga ; Pennarum ejus omnium præter medias duas margines tam interiores quam exterores albent.

A. 5. *SPINUS* sive *Ligurinus* Aldrov. The SISKIN. *Caput* ei nigrum : *Corpus* supinum viride, scapi tamen pennularum in dorso nigricant. *Uropygium* è viridi flavicat ; *Gula* item & *pectus*, sed pallidiora sunt. *Venter* albus. *Plumæ* sub cauda flavescent, maculis fuscis oblongis secundum scapi ductum pectæ. *Area transversa* lutea alas distinguit. In caveis alitur cantus gratia. *Caudæ* mediæ duæ pennæ nigræ, reliquæ media plus parte pulcherrimè flarent summitatibus nigris.

6. *PASSER CANARIENSIS*. Magnitudo *Pari* vulgaris : *Rostrum* album, parvum, acutum. *Alarum* & *caudæ* pennæ totæ virides : exiguo sane discrimine ab *Aviculis* quas *Germani Citrinas* vocant, aut iis quas *Zifelas Germani*, *Itali Ligurinos*, nisi quod paulo major est, quam utraque illarum, huic aspectu similior, illa nonnihil

## 92 SYNOPSIS METHODICA

hil viridior. *Gesn.* Mas à foemina differt, quod pectus & venter & capitis pars superior quæ rostro adjacet illi magis lutea sunt.

7. **CITRINELLA** seu *Thraupis*, *Verzellino* Romæ, *Citril* Viennæ. A Spino seu *Ligurino* & *Serino* differt 1. Collo cinereo. 2. Prona facie tota viridi. 3. Cauda non-nihil forcipatâ. 4. Quod nullas in lateribus maculas habet. *Circa Romam* frequens est.

8. **SERINUS** *Gesn.* Viennæ Austricæ *Hirngrill* Aldrov. lib. 18. cap. 20. *Dorsum* non-nihil rufum mediis plumularum partibus nigris. *Caput* luteum, *Uropygium* è viridi pulchrè flaveat : *Pectus* luteo viride ; *venter* albus ; *latera* maculis nigris oblongis varia. *Rostrum* brevius & validius quam *Citrinella*, extremitate acutum.

**SPINUS** seu *Ligurinus* à *Serino* & *Citrinella* differt. 1. *Corpo* tantillo majore. 2. *Rostro* longiore. 3. *Capite* nigro. 4. *Cauda* breviore & dimidia plus parte lutea. 5. *Areâ* in aliis luteâ.

9. **AVICULA AMADAVADÆA** *Rostro Fringillæ*, *calcaribus Alaudæ*. Regulum cristatum magnitudine vix superat. *Rostrum* *Fringillæ* rubrum, superiore mandibula supernè nigra. *Supina* pars corporis fusca, circa *uropygium* obscure miniacea. *Remiges alarum* nigrae, ut & *caudæ* pennæ, mediæ longiores, exteriores ordine breviores. *Maculæ* albæ rotundæ exiguae in alarum remigibus & vestitricibus, in aliis plures, in aliis pauciores. *Pectus* & *venter* nigricant, *Pedes* albi.

10. **PETRONIA** marina *Bononiensibus* dicta. *Oenanthe congener* Aldrov. lib. 17. cap. 38. Ab aliis omnibus aviculis hæc distinguitur. 1. Quod circa medianam *gulam* maculam flavam pulcherrimam obtinet. 2. Quod singulæ *caudæ* pennæ interiore margine statim sub apice maculâ rotundâ albâ insigniantur ; aliæ nigricant, extremis ramen marginulis subviridibus. 3. Certissima nota ab *Hortulano* distinguitur, quod *Rostrum* ei longè majus & viridius sit. & *Chloridis* rostro æquale.

12. **TEITEI** Brasiliens. *Marcgr.* Magnitudo *Rubecula* : *rostrum* breve, crassiusculum, nigrum. *Supina* pars tota nigra cum purpureo seu cœruleo splendore : *pronæ* pars

pars tota lutea. Ad exortum Rostrum superioris post nar-  
res maculam haber luteam. Crura & pedes fuscæ. Fæmi-  
nae totius color viridis.

**A V E S tuberculo, seu eminentia dura in superiore  
rostri mandibula donatæ.**

A. 1. **E M B E R I Z A alba** Gesn. *Alaudæ congenere*  
Aldrov. An *Calandra ejusdem* & Bellonii?  
*Cenchramus* Bellon. **The BUNTING.** *Alaudâ vulgari*  
*major* est, colore non multum diverso ; vel potius testa-  
ceo terreove. *Mentum*, *pectus*, *venter* ex luteo albes-  
cunt. *Gula* maculas habet nigras oblongas. *Rostrum*  
*grandiusculum*, *tuberculo* magno in superiore mandibula.  
*Latera* mandibulae inferioris altiora solito in angulum  
quendam assurgunt.

A. 2. **E M B E R I Z A flava** Gesn. *Hortulanus* Bellon.  
*Luteæ alterum genus* Aldrov. *Chloris* seu *Lutea Aristotelis*  
Turn. **The Y E L L O W H A M M E R.** *Fringillæ vulgari* æ-  
qualis est. *Colore* luteo quo perfunditur & singulari  
rostri figura, facile cognoscitur. *Tegetum dorsi* & *scapu-*  
*larium* pennarum mediæ partes nigricant, *margines* ex  
viridi rufescunt. *Humi* nidificat.

A. 3. **P A S S E R T O R Q U A T U S** in *arundinetis* *nidi-*  
*cans.* An *Passer Arundinaceus* Turneri Aldrov.? **The**  
**R E E D - S P A R R O W.** Magnitudine est *Fringille*; *Rostrum*  
cum præcedentibus convenit. *Caput* nigrum : *maxillæ*  
circa oculos ruffæ : *Cervicem* torquis alba ambit, quæ ad  
angulos oris utrinque protenditur. *Mentum* & *gula* ni-  
gra ; *pectus* & *medius venter* albent. *Pennæ dorsales* &  
*alarum* vestitrices ex ruffo & nigricante variæ. *Uropygi-*  
*um* ruffum cinereo admixto. *Pedes* è carneo nigri-  
cant.

4. **L U T E A** primum genus Aldrov. *Cirlus* eidem dicta.  
Zivolo Olinæ à voce Zi Zi quam frequentissimè repetit.  
Magnitudo *Passeris*, *Rostrum* breve crassum : *Pectus* &  
*venter* subflava maculis fuscis conspersa. *Supina* pars  
tota

tota ex testaceo ad fuscum tendit. *Mas* plus lutei natus est in capite & circa collum.

5. *CIRLUS Stultus* Aldrov. lib. 18. cap. ult. Luteis superius descriptis magnitudine par est, eadem prorsus figurâ & formâ. *Capitis* novissima pars superior, & dorsum totum ferrugineum nigris maculis satis amplis interstinctum. *Prona* pars tota itidem ferruginea. Remiges alarum & cauda subnigra, oris ferrugineis. *Alis* maculæ albæ nonnullæ insunt.

6. *HORTULANUS* Aldrov. Venetiis *Tordino* à maculis consumilibus. *Emberizæ* flavæ æqualis & similis est. *Respirum* breve, in mare rubescens. *Gula* & *pectus* cinerea, reliqua pars *prona* ad *caudam* usque ruffa : *uropygium* intensius ruffum. *Maribus* pectora rufescunt, macula sub rostro flava ; *Caput* cinereo-viride. *Dorsi* tegumentum mediae partes nigræ, exteriore vel ruffæ vel cinereo-virides.

A *Passere torquato* differt, 1. *Loco*, cùm *Passer* torquatus inter *Arundines* plurimum degat. 2. *Colore*; nam *Hortulanus* magis rufus est, nec torquem ullam habet, quâ ille donatur : *Præterea* maculam flavam sub gutture obtinet, quâ ille caret.

*Sex* hujus Avis seu *Species*, seu varietates proponit Aldrovandus.

1. *Hortulanum* *flavum*, pennarum alæ remigum extremitatibus albis. 2. *Hort.* *totum candidum*. 3. *Hortulano* *congenerem*, *Capite* ex cinereo flavicante ; *collo* cinereo nigris maculis punctato ; *ventre* & *cruribus* pedibusque totis croceis &c. 4. *Hortul.* *collo viridi*, rostro rubicundo, *cruribus* cinereis, cætera nigricante. 5. *Hortul.* *albicillum*, toto etiam corpore pallidiore. 6. *Hortul.* *Spipolæ congener*, rostro longiusculo ; *pedibus* fuscis ; toto item corpore fuscescente, *pectore* & *alarum* extremitatibus albis. Hæc Avis cum rostro fit longiusculo ad Avicularum tenuirostrarum genus pertinet.

## AVES AQUATICÆ,

*Et primò FISSIPEDES que circa aquas versantur, iis tamen non innatant.*

## 1. Maximæ, singulares &amp; sui generis.

A. I.  R U S, *Régarō*, The Crane. Ex Europæis in Aquaticarum Fissipedum genere maxima est, *collo & cruribus longissimis, caudâ brevissimâ*; colore cinereo. Capitis vertex pilis potius quam plumagine vestitur. In *occipitio* areolam habet lunulatam nudam, aut raris pilis obsitam, rubicundam. Ductus, seu mavis lineæ latæ albæ binæ, à singulis oculis singulæ, retrosum tendentes coeunt ad verticem maculæ cujusdam triangularis cinereæ in suprema cervicis parte, infra lunulam sitæ, & deinde ad pectus continuantur. *Guttur & cervicis latera nigra.* Aspera arteria sternum ingreditur, ibique variè reflectitur, ut in *Cyngno fero*. In palustribus *Lincolniensibus & Cantabrigiensibus* magni horum greges hyberno tempore inveniuntur. *Carne* est satis sapida & salubri, nec enim *piscibus* vescitur, sed *granis*.

2. G R U S Indica. Præcedente minor est, ejusdem cinerei coloris: *Rostro* longiore. Præcipua differentia est, quod summum *caput* à rostro ad verticem cute scabram, rubram, raris pilis obsitam insigniatum. In Ornithotrophio Regio in *Parco S. Jacobi* hanc vidimus. Hæc est (ut puto) *Toquilcoyotl Franc. Hernandez*.

3. G R U S Balearica Aldrov. Nonnullis, & fortasse rectius, *Pavonis* genus habetur, nam ipso Aldrovando fatente & vocem & mores *Pavonis* imitatur. Figurâ corporis *Ciconiæ* similis est, *rostro* tamen breviore non *Ciconiæ* tanum sed & *Gruis* rostro. *Cristam* habet in capite rotundam, densam ex setis, *Porcinis* similibus, quaqua verum diffusis, compositam, colore spinularum *Erinacei* res

## 96 SYNOPSIS MÉTHODICA

vulgaris. In maxilla utraque macula alba lineâ rubrâ in summa parte terminata. Remiges alarum pennæ minores albæ, aliâs tota avis nigra est. Sub rostro rubra excrescentia velut palear quoddam utrinque dependet. Tibiae longæ. In regionibus propè Caput viride reperiuntur. Hanc etiam in *Ornithotrophio Regio* vidimus.

4. JABIRU Brasiliensium Marcgr. Belgis Negro. Magnitudine *Cygnum* superat: collo longo 14. dig. crasso; rostro nigro, recto, superiùs versus extremitatem paulatim incurvato, 11. dig. longo 2  $\frac{1}{2}$  lato. Lingua caret. Crura longissima, 2 pedum, nigrantia, supra genua nuda; Tota Avis alba *Cygni* instar. Collum fere totum nudum; hujusque medietas cum capite cute nigra tegitur, reliqua albâ. Rostrum in Museis curiosorum saepius vidi.

5. JABIRU GUACU Petiguaribus Nhandu apoa *Tupinambis*: Scurvogel Belgis. Rostrum magnum 7  $\frac{1}{2}$  digitos longum. Caret lingua. In summo capite mitra mgerit osseam, coloris albi & cinerei mixti. Caput & dimidia pars colli (quod 10 dig. longum) nuda, cute squamosâ cinereâ testa. Magnitudo Ciconiæ: Cauda brevis nigra; alarum etiam pennæ remiges nigræ, cætera tota avis alba. A collo longiusculæ pennæ propendent. Crura longa.

6. CARIAMA Brasiliensibus Marcgr. Magnitudine est *Ardeæ*. In capite ad rostri exortum cristam plumatam gerit nigram cinereo mixtam. Rostrum breve, ex oblicuro flavo fuscum: irides oculorum aureæ: Crura longa. Totum corpus pennis vestitur griseis seu cinereis fusco undatis, ut in *Falconibus*. Extremæ ale, & cauda fusca, obscurè flavo & griseo undata. Cauda demissa. Clamor *Gallo-pavonis*. Grui *Balearice* dictæ congener est.

7. ANHIMA Brasiliensium Marcgr. *Cygnus* major est, è *Ripacium* genere, rostro nigro, paulum adunco: iridibus oculorum aureis. In capite propè rostri exortum cornu gerit erectum, antrorsum incurvum, duum digitorum, rotundum, albicans. Ale amplissimæ; in cuiusque antica parte duo cornua recta, triangulata, ex ipso osse enata obtinet. Vertex plumulis albis & nigris variegatus est: guttur & superior pars colli nigrat, inferior ejusdem medietas & pectus variegantur pennis albis nigris.

gris & cinereis: *Venter* inferior albus. *Dorsum* & *latera* cum *cauda* & *alis*, exceptis *oris* extremis, nigra.

*Aves aquaticæ fissipedes piscivoræ, ranivoræ & serpentivoræ.*

A. 1. **CICONIA alba**, *The white Stork.* Πέλασγος Græcis. In littoribus nostris interdum sed rarius cernitur; apud nos non nidificat. D. Tancr. Robinson se templis Cathedralibus Ciconias insidentes saepius vidisse affirmat. *Ardeâ* cinereâ major est, *collo* tamen breviore & crassiore. *Caput, collum, pars corporis anterior, & venter alba*: *Uropygium* & *pennarum alæ partes inferiores nigræ*, unde *alis contractis* (sub quibus *cauda alba* brevissima occultatur) pars dorsi inferior nigra apparet. *Rostro* & *pedibus* est miniaceis, *unguis* latis, humanis similibus. *Rostro* autem crepitat creberrimo mandibularum ad se mutuo appulsi. *Ranas* & *cochleas terrestres* libenter esitat: *Serpentes* etiam vorare dicitur.

2. **CICONIA nigra**. Præcedenti *equalis* est. *Collum, caput, dorsum, ale nigræ, splendentes, cum aliqua viridis mixtura*; colore ei non absimili qui in *Cervis marinis* cernitur: *Venter, pectus & latera alba*. *Rostrum* viride, ut & *tibiae*, ad genua nudæ. Verùm Joan. Faber, *Notis in Animalia Novæ Hispaniæ*, gratissimum esse ait in oculorum orbita, in toto rostro, in cruribus pedibusque puniceum & minium Antiquorum sive Cinnabrium nostrum æmulantem ruborem. In quo diversa ejus *Ciconia nigra* ab Ave nobis *Francofurti* visa & descripta: Nostra forte junior erat. *Rostro* crepitat ut præcedens.

3. **Ciconia Americana**, MAGUARI Brasiliensibus Marcgr. Figura & magnitudine *Ciconiæ* similis est, & ex parte etiam colore. *Pedes quoque rubri* ut *Ciconiæ* nostratis: *Caudâ* pariter brevi est & albâ. *Caput, collum, totumque corpus albissimis vestitur plumis*. *Alæ in exortu albis integuntur pennis*, sed prope dorsum nigris: *nigredini autem persplendet viriditas*. *Rostrum* ab exortu ad medium

partem ex viridi flavescit, reliqua ex cœruleo cinerea.  
Rostrum crepitat ut Ciconia nostras.

**I**BIS nigra Bellonii. Corpore est Elorii, aut paulò minor : Capite Corvi aquatichi : Rostrum qua capiti jungitur pollicis crassitatem superante, sed per extremum mucronato, & incurvo nonnihil, atque fornicato, & omnino rubente, ut & cruribus quæ longa sunt & Ardeæ stellariæ similia. Collum etiam oblongum Ardeole instar habet.

Ægyptiis utilissima est ad serpentes, locustas & bruchos delendos quibus regio illa præcipue infestatur.

### ARDEARUM genus.

**A**RDEÆ piscivoræ sunt, unde & rostris longis, validis, acutis ad pisces feriendos donatae ; crura iis prælonga ad aquas altius ingrediendum ; digiti, præsertim pollicus, longissimi, ut in fluviis firmius stare possint : ungues validi & aduncí, medio ab interiore latere serrato, ad anguillas aliisque lubrica firmius retinenda. Certissima autem Ardearum nota, quâ ab aliis omnibus Avibus distinguntur, est intestinum cœcum singulare, ut in Quadrupedibus, cum pleræque aliæ geminum habeant.

**A. 1.** ARDEA cinerea major, *The common Heron*: Ερεδίδης. Vertex albus ; ab occipitio crista nigra longa dependet. Gula alba, maculis nigris pulcherrime picta. Color totius varius è cinereo, albo, nigro, flavicante, in quibus eminet cinereus. Arboribus insidet, inque iis nividicat. Rostrum è viridi flavicat : Crura & pedes virides. Sedet capite inter armos adducto, collo intorto. Piscibus præcipue & ranis vicitat, nec tamen herbas averatur, nam in dissectæ ventriculo Lenticulam palustrem invenimus.

**2.** ARDEÆ cinereæ tertium genus Aldrov. Cum nullam notam insignem habeat, quâ à cinerea majore certè possit distingui ; descriptio ejus integra videatur apud ipsum, vel in *Ornithologia* D. Willughby,

**3.** ARDEA

3. ARDEA *cinerea minor*, Germanis Nycticorax. The lesser Ash-coloured HERON or NIGHT-RAVEN. *Ardea cinerea* vulgari minor est multò & collo breviore. *Dorsum* & *vertex nigra*; *Collum* cinereum: *Gula* & *venter* sublutea. *Rofum* nigrum. à rostro ad oculos linea alba extenditur. Ab occipite tres plumulæ oculi cirri, 5 dig longi retrosum dependent. *Ale* & *cauda* cinereæ. *Pedes* ex flavo virescunt. *Nycticorax* vocatur quoniam internoctu clamat voce absona & tanquam vomiturientis.

A. 4. ARDEA *alba major*, The great WHITE HERON, A *cinerea* majore differt, 1. Colore undique candidissimo, & planè niveo. 2. *Magnitudine*, quâ illi cedit. 3. Longitudine *caude*. 4. Quâ *cristâ* careat. Hanc in Anglia D. Johnson observavit

5. ARDEA *alba minor* seu Garzetta Gesn. & Aldrov. Ab alba majore differt quod longè minor sit, quodque *cristam* habeat, quâ illa caret.

6. *Ardea alba minor*, tertia Aldrov. Præcedente minor est sed carnosior. *Vertice* & *cervice* crocea, pectore quoque, sed remissius. *Collum* quâm in aliis *Ardis* brevius.

7. *Ardea haematopus* seu Cirris, Virgilii Scaligero: Aldrov. *Ardearum* sere minima est, collo admodum brevi, tota ferè ex croceo ad colorem Castaneæ vergens, prænè intensius, supinè & super alas remissius. *Cauda* tam exigua, ut cā proflus carere videatur. *Rofrum* ad caput cœruleo-viride, extremum atrum. *Crura* & *pedes* saturatè rubri.

8. *Ardea* quam SGUACCO vocant in vallis dictis Malalbergi Aldrov. *Caput* cirratum: *Rofrum* brevius sed robustum: magnitudo præcedentium par. Color ex luteo ferrugineus: *Caput* totum collumque luteo, albo & nigro variant, Pronè ad ventrem candicat, quemadmodum etiam cauda, & potior alarum pars.

9. *Ardea vulgo SQUAIOTTA* dicta Malalbergi Aldrov. *Rofro* est luteo, in extremo nigricante, *cauda* brevi, pedibus viridibus. *Apex capitinis* 30 pennis constat, quarum mediæ albæ sunt, extremæ nigrae. Sunt & in tergo- re ejusmodi elegantes pennæ, coloris rubicundi, radicibus albis.

## 100 SYNOPSIS MÉTHODICA

10. *Ardea minor alia*, rostro arcuato Aldrov. Ad collum & pectus, quod nigris maculis, ut in *Ardea*, deorsum descendantibus conspersum cernitur, albicat. Cætera Avis tota *leucophaei* coloris est, prouè remissioris, supinè intensioris.

A. 11. ARDEA *stellaris*, The BITTOUR or BITTERN. Color totius corporis varius est ex ruffo & nigro, seu potius ruffus nigris lineolis & lituris variegatus. Pedes virides & strum ad basin crassum, paulatim in mucronem acutum tenuatur. Septentrionalibus Anglis The MIRE-DRUM dicitur à mugitu, qui à longinquò exaudiiri potest. Aristoteli 'Oxyès i. e. piger à segnitie & tardio volat, nec immerito, dicitur. In Juncetis & Arundinetis latitat. Vox mugitum referens Avem hanc ab aliis omnibus nobis cognitis abunde distinguit. Magnitudo *Ardeæ cinereæ vulgaris*.

12. ARDEÆ STELLARIS tertium genus Aldrov. Epidauro missa undique sibi concolor erat, nempe subruffa, prouè minus, supernè magis.

13. ARDEA STELLARIS major seu rubra Aldrov. Spuriuni genus esse videtur inter stellatam & cinereum, quamvis ad hanc magis accedat; unde rectius inscriberetur, *Ardea cinerea pectorē & laterib⁹ ruffis*: Dorsum obscurius cinereum: Ad scapulas setæ longiusculæ ruffæ. Vestitrices minores Alæ pronæ ruffæ, femora ex albo ruffa: utrinque juxta pectus areæ latæ ruffæ: in quarum medio ad latera colli linea lata nigra: imum collum ruffum. In reliquis cum *Ardea cinerea* convenit.

### ARDEÆ EXOTICÆ.

14. SOCO Brasiliensis Marcgr. Toto habitu *Ardeam* referre videtur; magnitudine *Ardeæ minoris*, cauda brevi. Caput & collum brunnis quibusdam pennis, sed quæ punctulis nigris variegatae sunt, vestiuntur; Venter quoque ad eundem modum. Sub alis denique nigro & albo variegatae sunt pennæ.

15. *Ardea Brasiliensis* COCO: dicta Marcgr. Magnitudo Ciconie; Rostrum 6. dig. longum: Irides oculorum aureæ; cutis circa oculos cinerea: Guttur & totum collum

Jum alba sunt : Summitas *capitis* & latera nigra cum ci-  
nereo mixto. Ejusdem coloris *cristam* pulchellam gerit,  
è qua duæ elegantes plumæ deorsum posteriùs dependent,  
5<sup>o</sup> dig longæ, nigro cinereæ. Anterior collum secun-  
dum longitudinem maculatum est plumis è nigro & cinc-  
reo mixtis. In *coli* parte anteriore & infériore elegantes  
habet plumas, longas albas, subtile propendentes, (in  
in dorso cinereas) quas in pileis gestare solent. Supina  
pars reliqua, dorsum, alæ, cauda, dilutè cinerea,

16. ARDEA Brasiliensis rostro serato, cinereæ similiç  
Marcgr. *Anati domesticæ* par est aut major ; *Rostri* medi-  
estate anteriore tam superiùs quam inferiùs dupliciter fer-  
rata, 4½ dig. long. *Irides* oculorum aureæ. Totum  
*caput* & *collum* superius pennas habet longiusculas, palli-  
dè flavas, nigro undatas. *Collum* inferius, *pectus*, & *in-  
fimus venter* plumas habent albas fusco undatas, *dorsum*  
& *alæ* fuscas flavo undatas. *Alarum* remiges è nigro &  
cinerio æquali parte mixtæ sunt, extremitatibus albis :  
*Caudæ* pennæ transversim albo lineatæ.

17. GUIRATINGA Brasiliensibus. Garza Lusitanis,  
*Ardeæ* species Marcgrav. *Albardeole* est magnitudine &  
figura : *Rostro* recto acuto, flavo, 4. digit. longo. Per  
totum corpus albissimis vestitur pennis, in *collu* elegan-  
tissimis plumulis albis. *Avis* hæc à quarta specie seu  
*Ardeæ* alba majore *Europæa* nulla fere in re, excepta mag-  
nitudine. differt.

18 ARDEOLA Brasiliensis Marcgr. *Columbae* magnitu-  
dine vix par, *collo* longissimo (7. dig.) Ad basin rostri cu-  
tis melini coloris. *Caput* supernè coloris est chalybei,  
pennis pallidè fuscis inspersis. Totum *Collum*, *pectus* &  
*venter* infimus plumis albis & leucophæis velut variegatus.  
*Dorsum* nigrum, & ex parte chalybeo-fuscum, cerei co-  
loris pennis admixtus. *Alarum* pennæ longæ virentes,  
in extremitate maculam habent albam ; reliqua super-  
ficie ex fusco, chalybeo, cereo & leucophæo eleganter  
variegata. *Pedes* melini.

In omnibus hisce *Ardeis* Rostrum longum est, rectum,  
acutum, inferiùs ad exortum aut flavidum, aut flavo-viri-  
de, extremo nigrum. Crura superiora ad medium par-

tem nuda: Oculorum irides auræ: Cauda brevis, nec ultra alas extensa.

19. ARDEÆ congenet Aldrov. seu nigra. Licet collo sit quām Ardeæ longè breviore, reliquo tamen corporis habitu Ardeam exprimit. Coler ubique infirmis, nigricans, excepto collo, quod albo torque circundatum, & rostro quod luteum est, & extremo nigra maculâ, tam infima quām superna patte, notatur.

20. ARDEOLA litoralis variegata Mui. Leyd.

21. XOXOUKQU! HOACTL, Hoëton, seu Ardea cinerea minor Mexicana cristata. Crispa septem purpurascensibus plumis constat. Nomen inventum à voce, sonat enim Hcho. Rostrum ferratum nigrum. Hernand. cap. 6. & cap. 126.

22. Ardea MEXICANA minima candidissima. HOITZILAZTATL dicta Hernandez. Rostro est purpureo, ad exortum luteo, pedibus pallidis & purpurascensibus cruribus.

1. Platea sive Pelecanus Aldrov. Leucorodius seu Albardeola aliis, Belgis Lepelaer. The PELLICANE or SPOONBILL. Colore totius corporis, Cygni instar, candidissimo. Figura rostri plana & depressa, prope extremitatem in circularem ferè figuram dilatata ad similitudinem cochlearis; & magnitudine insigni Ardeam cinereum superante ab aliis avibus abundè distinguitur.

2. TLAUHQUECHUL seu Platea Mexicana Hernandez. Nicrenberg. Specie similis est præcedenti, sed coccineo pulcherrimóque universi ferè corporis colore, aut ex albo rubrescenti, depili penè capite carente cum universo ferè collo & parte pectoris, & fascia nigra latiuscula caput à collo distinguente. Rostrum latum & circa finem obrotundum cinereumque.

3. Platea Brasiliensis ALIA dicta, Lusitanis Colherado Marçgr. Magnitudo Anseris: Figura Plat. Europæ. Tota alba est, sed in dorso & alis dilutè incarnati coloris perlendentis. Rostrum album. Præcedenti eadem esse videtur.

*Aves aquaticæ fissipedes mediæ magnitudinis  
& minores,*

I. Rostris longissimis curvis.

A. 1. **N**UMENIUS sive *Arcuata major*, The CURLEW. Magnitudine ad *Phasianum* accedit. Color ex cinerascente & nigro varius, nos Grey vocamus seu griseum. Carne habetur delicata. In maris littoribus arenosis invenitur.

A. 2. **A**RQUATA minor nostras, a WHIMBRELL, Venetiis Taraniolo. In arenosis ad *Tese* fluvii ostia frequens. Præcedente dimidio minor est, rostro plus digito breviore; vertice obscurè brunneo absque maculis; *Dors*o, quatenus alis tegitur, albo, secus quam in illo; in universum toto corpore obscuriore est seu magis fusco.

*Gallinulam phæopum* Gesn. Aldrov. l. 20. c. 40. cum hac Ave eadem esse suspicor:

*Gallinula phæopus*, altera, seu *Arquata minor* Gesneri, quin cum nostrate *Arquata* minore eadem sit minimè dubito, cum & nomina & descriptiones convenient.

3. **F**ALCINELLUS Gesn. & Aldrov. Magnitudine & tota fere corporis specie *Ardeam* refert. *Caput*, *collum*, *dorsum*, *pectus*, *venter*, *femora*, *uropygium* coloris sunt spadicei ad fuscum tendentis; sed *collum* & *pectus* etiam maculis quibusdam fuscis oblongiusculis reiperguntur. In medio *dors*o macula quædam est coloris viridis obscuri, qui color etiam in alis & cauda conspicitur. *Rostrum* subnigrum est, valde longum & anteriùs falcatum. *Pedes* rostro concolores. Ad Ibidem accedit.

4. **C**URICACA *Brasiliensium* Marcgr. Mafarino Lusitanis. *Numenio* similis est, magnitudine *Anseris*: *Pedibus* rubris; *Rostro* incurvo, 6. dig. longo, coloris ex igneo fusci. *Caput* & *collum* plumas habent albas cum flavo mixtas. Circa *oculos* & sub origine *gutturis* cutis nigra. *Totum corpus* nigris pennis vestitur, excepto *dors*o, capite

## 104 SYNOPSIS METHODICA

pite & ventre, ubi cinereæ obscuræ; & in medio alarum albae cano mixtae ut in *Ciconiis*.

5. *ACACALOTL* seu *Corvus aquaticus Hernand.* Nieremberg. *Rostrum* arcus instar incurvum est, duos palmos longum, cyaneum. *Caput, collumque* pennis fuscis, albis, ac viridibus teguntur, ac paulisper flavescentibus. *Plumæ infernæ* fuscæ insertis rubris, superiores verò promiscuè purpureæ, subnigræ, virides atque splendentes. Ab externis oculorum ungulis usque ad rostrum unciaæ unius intervallo deplumis & glabra est pellis, virensque ex albo.

6. *GUARAKA Brasiliensibus Marcgr. Numenius Indicus Clus. exot. Magnitudo Albardeolæ: Rostrum* ensis Polonici figurâ longum & incurvum. *Crura* longa & tenuia, ex albo grisea, uti est & *Rostrum*. Tota avis vestitur pennis elegantis coloris coccinei: Remiges duntaxat alarum nigras habent extremitates. *Clusi avi crura & rostrum* pæne ut ochra flavescebant. Primùm exclusa coloris est nigricantis, & coccineum illum colorem ætate paulatim acquirit.

7. *GUARAUNA Brasiliensibus Marcgr. Magnitudo est Facu, Rostro recto, paulò deorsum inclinato, flavo, extremo fulvo.* Tota pennis vestitur fuscis, multâ umbrâ mixtis, *Caput autem & collum* albo punctulatum, ut in *Facu*.

## II. Rostris longissimis rectis.

A. I. *SCOLOPAX, Gallinago maxima, The WOOD-COCK.* *Perdice tantillo minor* est; supina parte è ruffo, nigro & cinereo variâ, pulcherrimo alpestru. *Pectus & venter* cinerea lineis transversis fuscis. Autumno ad nos advolat, & per totam hyemem huc moratur. Vere primo iterum discedit. *Sylvas* præsertim humidas & rivulos ad sepes frequentat. Apud nos interdum nonnullæ sociis discedentibus casu aliquo relictae nidificant & pariunt. Carne habetur delicata, & cruscula præcipue commendantur. Ob stoliditatem infamis est haec avis, adeò ut *Scolepax* Anglis pro stolido proverbialiter accipiatur:

A. 2. **GALLINAGO minor**, *The SNIPE, or SNITE.* Magnitudine *Scolopace* duplo minor est, colore non multum diversa, verum in dorso pulchrius colorata in scapularibus pennis colore vario ex nigro & subruffo viridi sericeo interlucente, *Pectus* & *venter* fere tota alba. In *palustribus* & circa *rivulos* versatur.

A. 3. **GALLINAGO minima** seu *tertia* Bellonii, *The GID, or JACK-SNIPE, or JUDCOCK.* *Gallinaginis minoris* subdupla est, unde *Gallis Deux pour un* dicitur. *Uropygii* color cœruleo-purpureus splendens, ei qui in *Sturni* dorli cernitur simillimus. *Pennæ* scapulares interiore limbo cœruleo splendente colore nitent, absque ulla tamen purpuræ mixtura.

A. 4. **BARGE** seu *Ægecephalus* Bellon. *Fedoa Gesn.* *The YARWHELP, or YARWIP,* *Scolopaci* similis est & æqualis, aut tantillo major. *Caput* ex ruffo cinereum, mediis sc. plumularum nigris. *Dorsum* ruffo nigro & albicante coloribus varium, mediis sc. pennularum nigris, marginibus ex albo rufescientibus. *Pectus* sordidè albicat; in mare lineis nigris transversis depictum. In ave quam descripti *uropygii* seu *dorsi* infimi regio maculâ albâ triangulari, vertice caput spectante, insignis erat. In *maris litoribus* arenosis versatur, & victimum quærit.

A. 5. **FEDOA nostra secunda** seu *Totanus* Aldrov. *The GODWIT, or STONE-PLOVER.* *Uropygium* albo torque seu annulo cinctum, ut in *Pygargæ* Accipitre. *Differt* à præcedente 1. Colore *caudæ*, cuius *pennæ* in illa a: eolis transversis albis & nigris alternis variæ; in hac ima parte & pinnulis exterioribus albæ exteriores interioribus ordine magis magisque, mediis duabus penitus nigris. 2. Colore *dorsi* & partis supinæ, quæ in hac varia est, in illa uiicolor. 3. *Magnitudine*, quâ ab illa deficit.

A. 6. **FEDOA nostra tertia**, *The STONE CURLEW* Cornubiensibus. *Differt* à superioribus, quod *rostrum* habeat brevius tenuissime quam illarum utravis.

A. 7. **HÆMATOPUS** Bellonii. *Pica marina* Gallosum & Anglorum, *The SEA-PIE.* *Rostrum* triunciale, rubrum,

rubrum (uti sunt & pedes) ad latera compressum; Digo postico caret. Color totius ex albo & nigro varius, unde Picæ nomen. Patellis vixit, ad quas subruendas rostrum valde accomodum nacta est. In litoribus maris Occidentalibus frequens habetur.

A. 8. PLUVIALIS major Aldrov. *Limosa Venetorum* Gesnero; item *Glottis* eidem & Baltnero. *Rostrum* nigrum 2 $\frac{1}{2}$  digitos longum. Color *supinæ* partis ex fusco & cinereo albicante varius [Gray] *Prona* pars tota alba, ut & infimum dorsum seu uropygium. *Cauda* lineis albis & fuscis alternis undulatis varia. *Crura* longissima, colore inter viridem & lividum medio. In *Dunelmensis* Episcopatus maritimis observavit D. Rad. Johnson, amicus noster singularis non ita pridem defunctus, totius Historiæ Naturalis peritissimus.

9. HIMANTOPUS Plinii Aldrov. lib. 20. cap. 30. *Prona* parte tota candidat; *supina* nigricat. In collo tamen superno maculæ sunt nigrae, deorsum vergentes. *Crura* femoraque mira longitudine, admodum gracilia & debilia, eoque debiliora ad insistendum, quod *pedes* dígito postico careant, & anteriores pro pedum longitudine breves sint. *Pedes* & *crura* sanguinea, unguis nigri. *Rostrum* nigrum, palmum & amplius longum.

10. Crex Bellonii. Cruribus ut *Chevalier* Gallis dicta, i.e. *Limosa*, longis est, major tamen illâ, *Elorio* minor; *rostro* etiam longo & nigro, nigris quoque tibiis & toto capite; *Collo* tergore & pectore candidis, superiores aliæ corporis partes ad cinereum tendunt. *Ale* subnigrae sunt, quas prope costas linea alba utrinque transversim secat. Circæ Nilum Bellonius vidit; & *Aristotelis* Crecem inde esse conjicit, quod dum clamat *Crex* *Crex* saepius repeatat.

11. Totanus alter, an Totanus Gesneri Aldrov.? An *Callidrys rubra* Bellonii? *Pedes* è flavo rubent: *Rostrum* brevius non nihil quam Pluvialis majoris Aldrov. superius traditæ: *Collum* & *caput* è fusco cinerea, supra oculos linea alba, cætera cum illa convenient. Fortè sexu dimittat differt. *Callidrys rubra* Bellon. ab hac differt quod *collum* & *pennæ* sub alis & *uropygio* cinereæ sint, quodque in temporibus utrinque maculæ binæ nigrae, quæ ceu  
umbram

umbram præbent superciliis, quæ & ipsa maculâ albâ insignia sunt.

*Aves circa aquas versantes, rostris mediæ longitudinis.*

A. 1. **TOTANUS** Gesn. Item *Gallinula erythropus major* ejusdem. *The RED-SHANK, or POOL-SNIPE.* *Vannello minor* est, ad *Pluvialem* accedens. *Color supinæ partis ex fusco cinerea aut virescens : Gula albo & nigro varia, lineis nigris secundum longitudinem pennarum ductis. Prona pars alba. Cauda & pennæ eī proximæ lineis albis & nigris transversis cymatili ductu variae. Rostrum duos digitos longum, ad exortum rubrum, versus extremum nigricat. Pedes pulchrè rubent, unguiculis nigris. In arenosis maris litoribus ubique circa Angliam frequens.*

2. **GAMBETTA** Aldrov. lib. 20. cap. 26. *Totano* Gesn. *affinis* est : *Vanello aliquanto minor : supina parte ex fusco cinerea seu grisea, colore *Anatum fœminarum* aut *Arquatae*. Pedes & crura longa lutea : unguis nigris. Rostrum quam Totani brevius, colore alijs simile. Cauda semipalmaris quam alæ complicatae excedunt & occultant.*

A. 3. **AVIS PUGNAX** Aldrov. *The RUFFE, Anglicè dicta, à plumarum longiorum torque sub capite gulam cingentre ; fœmina, The REEVE dicitur. Rostrum præcedentis simile : cui & Avis magnitudine respondet, pondere quincunciali. Mira est in maribus colorum diversitas, ut nè duæ per omnia sibi mutuò similes inveniantur. Post pennarum defluxum media æstate omnes similes esse aiunt. Mires admodum pugnaces sunt, nec desistunt antequam hic ab illo occidatur. Supina pars in fœminis cinereo, albo & nigro coloribus varia : prona tota albicat. In palustribus *Lincolniensibus* æstate circa *Crowlandiam* nidificat.*

## 108 SYNOPSIS METHODICA

A. 4. **OEDICNEMUS** Bellonii. *Charadrius Gesn.*  
*Aldrov.* **The STONE-CURLEW.** *Avis est majuscula,*  
*pondere sesquibrali ; Rostro recto, duos digitos longo,*  
*extremo acuto, ad nares usque nigro, inferius luteo.*  
*Sub oculis area est nuda, flavo-viridis. Pedes lutei ; di-*  
*gito postico carent. Tibiae infra genua admodum crassae*  
*funt, unde Oedicnemus Bellonio nominatur. Color Ar-*  
*quatæ simillimus, unde STONE-CURLEW Norfolci-*  
*ensis dicitur, apud quos circa Thetfordiam invenitur.*  
*Bellonius cum primò versaretur in Anglia eam obser-*  
*vavit.*

A. 5. **CANUTI** avis i. e. **KNOT** *Lincolniensibus* ;  
*an Pilvenkegen Aldrov. ? An Callidrys nigra Bellonii ?*  
*Pondus 2  $\frac{1}{2}$  unc. Color capitinis & dorsi ex cinereo fuscus.*  
*Linea transversa alba alas distinguit. Rostrum sesquidi-*  
*gitale nigrum. Pedes virescunt ; Ungues nigri. Caro in*  
*deliciis habetur.*

A. 6. **TRINGA minor**, *The SAND-PIPER*, *Ebo-*  
*raccensibus.* *An Cinclus secundus seu minor Aldrov. ? Gal-*  
*linula hypoleucus Gesn.* *Pondere ad duas uncias accedit.*  
*Collum medium cinerascit, alias supina facies tota ex*  
*fusco viret, lineis transversis obscurioribus pulchre varie-*  
*gata. Caput pallidius, lineis non ad pennulas transversis*  
*sed secundum scapi longitudinem ductis. Latera, pectus,*  
*venter alba. Rostrum summum ex fusco nigricat, imum*  
*albicat. Pedes pallide virescunt. In maritimis.*

A. 7. **TRINGA** Aldrov. *Cinclus Bellon.* *Magnitu-*  
*dine Merulam æquat, vel etiam superat. Color supinæ*  
*partis in fusco subviridis, & Serici instar splendens.*  
*Pennæ scapularum & interscapulii, necnon alarum remi-*  
*ges corpori proximæ, & vestitrices pleræque punctulis*  
*albis crebris ad margines pinguntur. Caudæ incumbentes*  
*pennæ niveæ. Gula alba maculis fuscis : Pectoris autem &*  
*ventris totius, color niveus. Rostrum sequidigitale, ob-*  
*scurè viride, rectum, ad latera compressum. Pedes è*  
*livido virescunt. Ungues nigri. Ala notha interior ni-*  
*gricat, lineis albis crebris obliquis in angulum obtusum*  
*ad scapum coeuntibus perbellè depicta.*

S. TRINGA

8. TRINGA tertia Aldrov. Giaroncello & Pinirolo Italij dicta. Huic Rostrum quam superiori multò nigrius & aliquanto brevius. Eadem est corporis specie, coloribus tantum aliquid evarians: nam cum utraque colore præser-tim fusco & castaneæ sit in capite collo, tergo, aliisque; illa in omnibus his partibus plus fuscæ, haec plus alterius coloris obtinet.

9. GALLINULA melampus Gesnero Aldrov. lib. 20. cap. 45. Rotknüsel Baltner. Colore est ruffo vel sub-rubicundo cum maculis fulcis in collo & circa oculos. Corpus fuscum est cum maculis quibusdam sordidi colo-ris. Alas maculæ albæ distinguunt. Rostrum & pedes ni-gri. Diversa videtur avis quam Aldrovandus Giarolæ nomine pro hac describit: cuius descriptionem vide.

10. GALLINULA erythra Gesn. quam Germani Matkern vocant. Matkneltzel Baltner. Etsi corpus to-tum ferè rubicundum sit (ventrem albicanter rubro ta-men subruffum & crura leucophæa excipio) obscurior tamen is rubor in dorso est, & maculis nigris interceptus, clarior in alarum aliquot pennis in quibus longissimæ ad rubricæ fabrilis colorem accedunt. In collo inferiùs puncta quædam albicanter. Rostrum nigricat non abique ru-bore.

A. 11. ARENARIA nostra i.e. SANDERLING; aliis CURWILLE T. Tringam minorem magnitudine nonnihil superat, rostro digitali, recto, nigro, gracili, Gallinaginis simili. Crura, pedes, unguiculi nigri, & quod præcipue notabile est, digito postico caret. Caput parvum. Supina pars tota ex nigro & albo vel cinereo varia pulchram speciem exhibet. Venter & partes sub-ulares nive candidiores. Linea alba transversa in alis ex-pansis supinis cernitur, qui in apicibus pennarum secundi ordinis hæret. In maris litoribus arenosis degunt, & gregatim volant. Avis est tridactylos, quâ notâ ab aliis di-stingui facilis.

A. 12. DUNLIN Septentrionalium Anglorum D. Johnson. Descriptionem vide in Historia D. Willughby. Venter mediis nigrescit, albo undulatus. Pars supina tota rufa, maculis nigris majusculis ubique interstincta

## IIO SYNOPSIS METHODICA

cum modico albo. *Gallinagini* minimæ par est. *Rostrum* & pedes nigra : posticus digitus brevissimus. Q. Annon hæc avis eadem sit proximè sequenti ;

A. 13. **CINCLUS** prior Aldrov. *Schæniclos* seu *Junco Bellonii*, quam *Galli Alaudam* marinam vocant. *The STINT*, in *Suffex* *The OX-EYE*. *Alaudæ vulgari æqualis* est aut tantillo major. Figura *Gallinaginis*, *rostro* etiam simili, sed nigro,  $1\frac{1}{4}$  digit. longo. *Pedes* fuscæ seu è nigro virides. *Color* in supina parte, exceptis alarum remigibus & primi ordinis vestitricibus, cinereus seu rufus, maculis nigris in mediis plumulis varius. In hac & prædictis hujus generis avibus alæ longæ sunt, ad extremam caudam cùm complicantur pertingentes. Pennæ alarum rectrices ima parte quatenus vestitricibus occultantur albæ, cætera fuscæ. Circa maris litora plerunque versantur & gregatim volant.

14. **CINCLUS** tertius Aldrov. Eisdem est coloribus cum precedente, nisi quod caudam habet albam, & lineis nigris transversim secantibus ornatam ; eadem etiam corporis specie & conformatione. *Rostro* differt. Illa enim ferè æquale habet, hæc quâ capitî jungitur crassiusculum, & sensim deinde magis magisque attenuatum. *Crura* etiam aliquanto longiora & crassiora obtinet.

15. **CHIQUATLI** sive *Noctua Hernand*. *Rusticulae nostrati* par est, *rostro* longo, tenui, & pullo. Inferiora corporis pallida sunt, nigris quibusdam plumis circa cælium interseritis ; cætera ex fulvo fuso & cinereo permixta. *Irides oculorum* luteæ. In montibus versatur & humipeta est,

---

*Aves aquatice fissipedes circa aquas versantes rostris brevibus ; Insectivora.*

A: I. **CAPILLA** sive *Vannellus*, *The LAPWING* ; & alicubi *BASTARD PLOVER*. *Septentrionalibus à sono vocis ficto nomine, The TEWIT.*  
Ayis

Avis hæc ubique notissima & passim obvia est. *Columbae domesticæ* magnitudine, *rostro* brevi recto digitali. *Caput* crista insigne. Coloribus pulchris ornatur: in *capite* supra cristam nigro; item in *gula* & summo *pectore*, qui color torquem dimidiatur seu lunulam refert. *Maxillæ* albæ, *venter* quoque & *pectus*: sub *caudâ* pennæ pulchrè spadiceæ. Medium dorsum & scapulares pennæ amœno virore splendid: purpurea utrinque macula juxta alas. Vestitrices etiam alarum superiores purpureo, cœruleo, viridi, coloribus variè commixtis nitent; inferiores albent. In *palustribus* & *aquofis* invenitur, nidificat autem humi in campestribus siccioribus.

**A. 2. PLUVIALIS viridis**, The GREEN PLOVER. Magnitudine est *Vannelli*. Color in *supina par'e* tota niger, maculis luteo-viridibus crebris pulchrè respersus. Media sci. cujusque plumulæ pars nigricat, oræ circumcirca maculis luteo-viridibus pinguntur. *Rostrum* rectum nigrum digitale. *Pectus* varium ex fusco & flavoviridi: *Venter* albus. *Pedes* nigri. Quid plura? *Digito* postico caret, quod ei ad distinctionem à reliquis sufficit. *Caro* delicatissima habetur hujus & sequentis.

**A. 3. PLUVIALIS cinerea**, The GREY PLOVER. Hujus etiam caro non in minore estimatione est. *Rostrum* nigrum, digitali plus longitudine. *Pedes* folidè virescunt. Magnitudo priori par. *Caput*, dorsum, tegetes alarum plumæ nigricant, apicibus ex cinereo viridibus. *Mentum* album. *Gula* lineolis seu maculis oblongis fuscis distinguitur. *Pectus*, *venter*, femora alba. *Cauda* areis seu spatiis transversis albis & nigris varia.

**A. 4. MORINELLUS Anglorum**, The DOTTERELL. Pluvialis cinereæ propemodum colore, verùm ea multò minor est, ut quæ 4 tantum uncias pendeat; postico insuper digito caret, quo illa donatur. Stulta admodum avis esse creditur ad proverbium usque & imitatione capi. *Rostrum* Pluvialium, rectum, nigrum, digitale ferè. *Caput* maculis albis & nigris pulchrè variegatum. *Dorsum* ex cinereo & nigricante varium, plurimis singularibus media parte circa *scapum* nigricantibus circum

## 112 SYNOPSIS METHODICA

circum oras cinerascentibus. *Uropygium* & collum cinerascent magis. *Pectus* & alarum inferior facies solidè flavicascat, *venter* albet.

Hæ Aves bis in anno, *Aprilii* sci. & *Augusto*, loca paludosæ relinquunt, & in campos montosos gregatim se recipiunt. Transmigrationis autem causa ex vieti petenda est. Nam tum temporis cibi quoddam genus ibidem reperiendum appetunt: quod ut certò scirem, plurimum ventriculos dissecui, inque iis maximam partem *Scarabæos* quosdam minutos & nigricantes inveni, at inter alia & *Cossos* & *Cochleas* terrestres exiguae adverti. *D. Lister.*

A. 5. *MORINELLUS* marinus *D. Brown.* An *Cinclus* Turneri? *The TURN-STONE, or SEA-DOTTEREL.* *Aveum* hanc in maritimis *Cornubia* vidimus. *Rostrum* rectum, nigrum, digitale, à basi crassiore in acutum apicem lensim tenuatum, nonnihil depresso, firmius quam in *Gallinagineo* genere. *Supinae* partis totius (medio dorso excepto quod albet) & summi pectoris color fuscus, mediis plumarum nigris aut nigro purpureis, oris cinereis aut ex ruffo albidis. Secluso pectore prona facies tota nivea. In ipso *uropygio* macula nigra transversa grandis. Juxta commissuram brachii cum cubito in aliis macula alba habetur. *Caudæ* pennarum inferior medietas alba, superior nigra. *Crura* brevia, colore croceo.

A. 6. *CHARADRIUS* sive *Hiaticula*, *The SAILARK.* Magnitudine *Alaudam* vulgarem nonnihil superat. *Rostrum* digitæ brevius, inferiore medietate aureum, summâ parte nigrum. Hujus basin areola nigra cingit, quæ deinde ab angulis oris per oculos ad aures usque producitur, tandemque *caput* medium transversim obit, lineam latam vittamve albam ab interiore unius oculi cantho ad alterius interiore ductam circumambiens. *Occiput* cinereum: *mentum* album: *Collum* duplice torque cingitur, superiore albo, inferiore nigro. *Dorsum* & alarum tegetes minores cinereæ. *Pectus* & *venter* alba. *Alæ* nigræ, lineâ longâ transversâ albâ. *Pedes* pallidè flavi, unguis nigri. *Digitæ* postico caret.

*Avicula*

Avicula hæc *Americæ* cum *Europa* communis est, & *Matuitui* nomine à *Marcgravio* describitur.

A. 7. *Junco prima Aldrov. lib. 20. cap. 55.* *Magnitudo Passeris: Rostrum nigrum, canaliculatum, durum, extremitate aduncum: Capite superne, cervice, ventre colore castanearum cello prono & pectore albicante. Reliquæ corporis partes è fusco ad nigrum tendunt.*

---

*Aves aquis innatantes fissipedes, & primò Gallinulæ, quarum digitæ nullas habent membranas appensas.*

**GALLINULARUM** notæ sunt caput parvum, *Rostrum* breve & modicè inflexum: *Corpus* ferè adductum, gracile & ad latera compressum. *Ale* brevissimæ, concavæ, & *Gallinaceis* similis; *Cauda* per brevis, *Crura* longa; *Digitæ* longissimi; *volatus* breves.

A. 1. **GALLINULA chloropus major** Aldrov. *The COMMON WATER-HEN, or MORF-HEN.* *Mas* 15 uncias pendebat, *Fœmina* 12. *Rostrum* digitale, *Mandibula* inferior ad angulum usque ex albo flavescit, indè rubescit. *Superior* minus flavescit in extremo, sed per nares ad calvitie in vertice rotundæ extremum rubet. *Rubor* ubi desinit in *rostro* tanquam cera superinducta abradi potest. *Pedes* virescunt. Ab exortu *ale* in ejus basi linea alba per totam longitudinem ad extremas usque pennis procurrit. *Dorsum*, & *alarum vestitrices pennæ* ad ferrugineum accidunt, aliæ ubique in supina parte nigricat. *Pectus* plumbeum est, *Venter* cineralcet. Sub *cauda* plumæ albæ, quas inter natandum caudam crebro erigens ostendit. *Pedes* virescunt. *Crura* supra genua maculâ rubrâ insignita.

A. 2. **RALLUS aquaticus** Aldrov. *Ortygometra Bellon.* *Gallinula chloropus altera* Aldrov. fortè etiam *Gallinula Serica* ejusdem. *The WATER RAIL*, nonnullis, *A BILCOCK, or BROOK-OUZELL.* *Gallinulæ vulgaris* similis est sed minor, *Coturnice major.* *Rostrum* duplo

plo quam præcedenti longius, ad latera compressum, inferiore parte ad caput rubicundum, superiore nigricans. Calvities admodum exigua & vix observabilis. Color in supina parte tota varius est à nigricante & sordide luteo seu olivaceo. Mentum album, gula rufescit cum cinerei mixtura; Pectus magis cinereum est, verum per ejus medium areola alba. Plumæ albæ sub cauda, ut in præcedente. Verum præcipue observabiles & velut characteristicæ hujus avis sunt plumæ in femoribus & lateribus nigræ, transversis lineis albis pulchre variegatæ. Secundum alæ basin linea alba ut in *Chloropode*. Pedes coloris carnei obscurioris. Celerrime curvit, & juxta aquarum ripas delitescit. Ambulat potius quam natat in aquis.

3. *Gallinula chloropus* altera Aldrov. in plerisque notis cum hac ave convenit: differt quod rostrum inferius & superna parte aliquo spatio flavescit: Collum & caput nigricant; Dorsum cum superna alarum parte coloris castaneæ sunt; Crura virent. Eandem tamen specie avem esse existimo, sexu fortasse diversam. Crura enim in hoc genus Avibus pro sexus diversitate colore differunt.

4. *GALLINULA Serica* Gesneri Aldrov. Tom. 3: pag. 470. Colore atro & ruffo per totum ferè corpus, nisi quod venter albet, pulcherrime distincta est. Color ater in ea holoserici instar splendet. Crura alta & fusca sunt, digiti prælongi. Q. an diversa sit ab *Ortygometra Bellonii*?

5. *POLIOPUS Gallinula minor* Aldrov. Grinetta Italica: Mediolani Gillerdine. An *Gallinula* alia *chloropus Fulicæ similis*? Bellonii Aldrov. Tom. 3. pag 496. Omnia quas hactenus vidimus *Gallinularum* minima est. Colore cum *Rallo aquatico* ferè convenit, nisi quod medio dorso inter alas ductus niger maculis albis conspersus, cernitur, cui & alii duo adjacent, hinc inde in vestitribus alarum. In costa aut basi alæ à scapulis ad extimæ remigis apicem linea alba, ut in *Gallinula majore vulgaris*, extenditur. A *Gallinula aquatica* majore & *Rallo vulgaris* paritate sua, ab hoc etiam brevitate rostri, aliæ figurâ similis, distinguitur.

6. *GAL-*

6. **GALLINULA ochropus major** Gesnero Aldrov. lib. 20. cap. 42. *Rostrum* imum (pedibus concolor,) luteum nempe. Septem in ea colores (ut pictura ostendit) dilcreti apparent: Reliquam descriptionem videsis apud Gesnerum: Nos enim iconibus pictis non multam fidem adhibemus.

7. **GALLINULA ochra** Gesneri, quam Germani Wynkernel appellant Aldrov. lib. 20. cap. 48. Corporis ferè totius color subviridis, sed sordidus & obscurus, prona parte magis fusca. *Caput*, *collum*, *pectus* & alæ punctis & maculis albis insigniuntur. *Cauda* albicat aliqua ex parte: *Rostrum* partim nigrat, partim puniceum est. *Crura* lutea.

8. **Gallinula Brasiliensis** JACANA dicta Marcgrav. *Columba* est magnitudine; *cruribus* flavo-viridibus, dito postico enormis longitudinis: *Cauda* brevi; colore in *dorso*, alis, & ventre ex viridi & nigro mixto; in collo & pectore qualis in collo Pavonum aut Columbarium quarundam cernitur; sub cauda albo. *Rostrum* ab initio ad medietatem egregii miniati coloris est reliqua parte flavo viridis. *Caput* tegumento membranaceo rotundo Turkoidis colore tegitur.

9. **Gallinula Brasiliensis** AGUAPÉ CACA dicta. Priori figura & magnitudine par, differt alarum colore magis brunnecente. Caret mitellâ, at in qualibet ala corniculum habet directum, quo se defendit.

10. **GALLINULA Brasiliensis tertia** Marcgr. Prioribus figurâ & magnitudine par. *Supina* pars tota exceptis alis (quæ virides extremitatibus brunnis) brunna. *Prona* pars itidem brunna. *Rostrum* rectum, croceum, cum cuticula ruffa in exortu illius & parte capitis anteriori. In qualibet pariter alæ parte antica corniculum habet simile, flavum.

11. **GALLINULA Brasiliensis quarta** Marcgr. Figurâ est ut reliquæ; *Rostro* flavo; mitella cutacea in initio capitis propè Rostrum exortum rubens. Totum *caput*, *collum* & pars corporis prona nigra; *supina* exceptis alis ruffa seu dilute brunna. Remiges alarum thalassifici coloris, extremitatibus nigris. *Pedes* cinerei. Quælibet ala

## 116 SYNOPSIS METHODICA

ala anteriori parte corniculum habet acutissimum croceum.

12. **GALLINULA aquatica, TAMATIA Brasiliensis** Marcgrav. Capite & oculis magnis est, dorso & collo incurvatis, incedens. *Rostrum* 2 dig. longum primum latum, instar *Anatis* quidem sed anteriùs acuminatum, superiore *mandibula nigra*, inferiore flavescente. *Pedes & digiti* (qui longi ut in *Gallinulis*) è viridi flavicant. *Caput nigrum*, reliquum corpus brunnum, admixtis *pennis* in ventre albicantibus.

13. **PORPHYRIO** ni picturæ nos fallunt (Avem enim ipsam nec nos, neque *Gesnerus* aut *Aldrovandus* viderunt) è *Gallinularum* genere elt. *Cæruleus* ei toto corpore color. Media *caudæ* extremæ pars in cinereo albitat. *Rostrum* & *crura* purpureo colore splendent. *An* detur hujusmodi avis dubitatur?

14. **QUACHILTO** sive *Porphyrio Americanus Hernández*. *Nieremb.* Internoctu canit *Galli gallinacei* modo. Color illi purpureus ex nigro, insertis carentibus *pennis*. *Rostrum* initio pallet, adolescentibus rubet, calvities circa Rostri exortum. *Fulicam* imitatur. *Crura luteo-viridia*: *irides oculorum fulvæ*.

15. **RALLUS** *Italorum* Aldrov. lib. 19. cap. 16. A vulgari *Fulica* differt, quod in *alis* & circa *oculos* plus albi coloris habet. *Rostrum* nigrum: *crura subviridia*; membranæ inter digitos non ita dissectæ, calvitium nullum, quantum ex pictura assequor, inquit *Gesnerus*. De hac ave quid ult.?

16. **ACOLIN** seu *Coturnix aquatilis Mexicana Hernandez*. *Gallinulae* species est.

*Fissipedes aquaticæ, pedum digitis membranis auctis.*

**A. I. FULICA, The COOT.** *Gallinula vulgaris major* est, unciarum 24 pondere, colore undique nigro; in *pediore* & *ventre* dilutiore & plumbeo. *Rostrum*

*Rostrum* sesquidigitale, ex cœruleo album; à rostro ad verticem assurgit *Globus carneus*, mollis, glaber, rotundus, quem *calvitem* vocant. *Pedes* cœrulei seu ex fusco virides. Ad articulos digitorum membranæ circulares appensæ prætensæ. *Aquis* innatæ ferè semper hæc avis.

2. **FULICA major Bellonii**: Gallis *Macroule* vel *Diabolus de mer*: *Aquis* dulcibus se semper immergit, & colore est tam exquisitè nigro, ut penecillo inductus ei videatur. *Alba capitidis* macula latior est quam in *Fulica*; imò & paulò major corpore est. *Crura* ad se attrahit, *digitosque* habet latos, & ab invicem se junctos, ut *Fulica*.

3. *Fulicæ Mexicanæ* altera species *Tobaccoachillini* dicta. In omnibus præterquam colore cum præcedentibus convenit; qui infernè, itemque circa *caput* & *collum* purpureus, supernè ex pallido virens cum cyaneo & fulvo. *Rostrum* niveum est, & prope apicem luteum.

## Aves aquaticæ palmipedes, & primò Rostro angusto.

### I. Cruribus longis.

A. i: **R ECURVIROSTRA**, *Avosetta Italorum*. Magnitudine *Vannellum* superat. Color in *prona* corporis parte tota nivens: it, *supina* partim albus, partim niger, *Cauda* tota alba. *Crura* longissima, pulchre cœrulea, supra genua ad tres digitos usque nuda. *Rostrum* nigrum, tenue, longum,  $3\frac{1}{2}$  digit. figurâ singulari, sursum reflexa seu arcuata, quo ab aliis omnibus nobis hæcenus visis avibus differt. In *Angliae* maritimis, præsertim *Orientalibus*, non infrequens est.

2. **PHOENICOPTERUS**, *Gallis Flammant*. *Collum* & *crura* habet longissima: *Rostrum* latiusculum, singularis & insolitæ figuræ: *Mandibula* nempe superior incurva, depressa, dentata; *inferior* craifior, extremum

nigricat, aliàs obscurè cœruleum est. *Collum & corpus* alba sunt; *alarum remiges* nigræ. *Vestitrices colore phœnico seu flammæo pulcherrimè rutilant*, unde ei *nomen*. Ad litora *Gallie Narbonensis* hyberno tempore advolat; unde & circa *Martiguez* in *Gallo-provincia*, & *Monspelium* in *Gallia Narbonensi* non raro capitur. Invenitur in *America* circa *Insulas Antillas* seu *Caribbeas*, testibus *Hernandez*, *Rechesfortio* & *Du Tertre*.

3. *TROCHILUS vulgo Corolla Aldrov.* *Crura* habet inter *Palmipedes* exceptis *Phœnicoptero* & *Recurvirostra* seu *Avosetta longissima*, unde cuius plurimum vallet. *Avis* est varia, *rostro* recto, luteo, in fine nigro; *ridu* magno; *oculorum iridibus* albis & spadiceis, dupli circulo. Prond ad ventrem usque canticat: *Caudam* duæ pennæ albæ extremitatibus nigris cooperiunt. *Supina pars tota coloris* est ferè ferruginei.

### Aves aquaticæ palmipedes cruribus brevioribus & primo Tridactylæ:

*Palmipedibus omnibus, exceptis tribus prædictis, Tibiae* breves: *Crura* ad articulum secundum plumis vestita: *Digiti postici breves: Digitus anticus extimus intimo brevior: Uropygia minus* erecta quam aliis Avis.

1. *PENGUIN nautis nostratis*, que Goifugel *Hoyeri* esse videtur. An *Penguin* *Batavorum* seu *Anser Magellanicus Clusii?* *Magnitudine* ad *Anserem domesticum* accedit. [Clusio eum superat] Color *supinæ* partis niger, prænæ albus. [Collum Clusio albis pennis tanquam torque cinctum] *Alæ* minimæ & ad volandum ineptæ videntur. [Clusius alarum expertem esse scribit, sed earum loco binas parvas coriaceas pinnas habere; ad latera tanquam parva brachia propendentes, pennis tamen testas, &c] Rostrum *Alæ* simile, sed longius latiusque, nigrum, ad latera compressum, versùs extremitatem fulcis obliquis 7 vel 8 exaratum in *superiore mandibula*.

*mandibula*, in *inferiore* 10 : inferior quoque *mandibula* in angulum deosum extuberat. Nullæ autem in *rostro* lineæ albæ sunt, quemadmodum in *Alka*. A rostro ad oculos utrinque linea alba protenditur. *Digito* postico carèt. *Clusius* tamen digitum posticum appingit, male ut puto, cùm eandem cum nostra avem describere videtur, *Olaï Wormii* avis, quam domi vivam per aliquot menses aluit, supra oculos aream rotundam candidam habuit. *Daleri* magnitudine, ut perspicillis dotatam jurares : nec alæ eam obtinuere formam quam *Clusius* expressit : latiores enim erant paulò cum limbo albo. *Wormii* avis, ex insulis *Ferroensibus* delata erat ; *Clusii* ex insulis *Freti Magellanici*, tanta intercapedine à se invicem remotis inque diversis mundi cardinibus sitis, ut eandem utrobius Avis speciem reperiri vix sit credibile. Nobis descripta in *Repositorio Regiae Societatis* Londini, inque maledic *Joan. Tradescanti* sicca visa est ; & cum *Clusiana* potius quam *Wormiana* (si modò Aves diversæ sint) convenit.

2. **M E R G U S** Bellonii *Alkrov.* Tqm. 3. Pag. 240. cum *Alki* Hoieri, eadem avis esse videtur. Ad litora Cretæ invenitur ; Indigenis Utamania dicta : Ab *Alki* magnitudine differt *Querquedula* pari ; & rostri colore, quod nigrum superiore, album inferiore parte.

A. 3. **A L C A** Hoieri Clus. *Worm.* mus. The RAZOR-BILL, Occidentalibus *Anglis* : Septentrionalibus, The AUK : Cornubiensibus, The MURRE. *Anate domesticæ* minor est : *Supina* corporis pars tota nigra ; *prona* alba quoisque aquis immergitur : Quod congeneribus etiam Avibus, *Lomæ* Hoieri, *Anati Arcticæ* Clui. & *Columba* Groenlandicæ dictæ commune est. *Rostrum* 2 dig. longum, nigerrimum, compressum, angustum. Superior *mandibula* extremo adunca, duobus sulcis [interdum tribus] transversis canaliculata, quarum capiti proximus, *Rostrum* fere transcurrens, albus. Quin & ab utroque oculo ad angulum Rostris superioris linea candida angusta extenditur. *Ova* in omnibus hajus generis majora sunt quam pro Corporis mole. In rupibus inaccessis, & clivis præruptis, in multis circa *Angliae* partem Occidentalem

insulis, ova deponunt, incubant, & pullos nutriunt, cum *Anate Arctica Clus.* & *Lemvia Hoieri*. Quod abeant, & ubi hyemem transfigant, hactenus incognitum.

A. 4. *LOMWIA insula* *Farræ Hoieri*, *The GUILLEM* *Cambri-brittannis* & *Monensisibus*: *Northumbris* & *Dunelmensisibus* *A GUILLEMOT*, or *SEA-HEN*. *Eboracensisibus* *A SKOUT*, *Cornubiensibus*, *A KIDDAW*. *Aikæ* similis est sed major, *Supina tantum pars ex nigro cinerea* potius est quam nigra. *Rostro* potissimum differt, quod 3 ferè digitos longum, rectum, teretusculum, acutum, per totum nigrum. *Unà* cum *Alkis* & *Lundis* degit, eodemque modo & in eisdem locis parit. Stolidior tamen est & facilius capitur.

A. 5. *ANAS ARCTICA Clus.* *Pica marina* vel *Fratercula* *Gesneri Aldrov.* *Feroensisibus* *Lunda* *Worm.* *Mus.* *nominibus* *Anglicis* non indiget: nam *Wallis Septentrionalibus*, *PUFFIN*; *Meridionalibus*, *GULDENHEAD*, *BOTTLENOSE* & *HELEGUG*. *Anglis Septentrionalibus* circa *Tese fluminis* ostia *COULTERNEE*, or *COUNTERNEB*. circa *Scarburgum*, *AMULET*. *Cornubiensibus*, *A POPE*, dicitur. *Anate domestico* minor est. *Rostrum* breve, latum, ad latera compressum, contrario scilicet modo quam *Anatum rostra*, triangulare, bicolor, ad caput lividum, versus extremum rubrum. Tres ei sulci insculpuntur; in parte livida unus, in rubra duo. *Pedes* rubent, & retrorsum siti sunt, ut *Avis* propemodum erecta incedat. *Prona* pars praeter *caput* & *collum* nigra, *supina* alba. *Vertex* niger, *torquis* etiam niger à vertice productus gulam circuit: *Maxillæ*, *mentum*, capitis latera à vertice ad torquem dictum *alba* aut *pallide cinerea*, adeò ut oculi atque aures spatiis hisce albis includantur.

Oninibus hisce avibus, ale exiguae, brevibus pennis compositæ, nihilominus celerrimâ earum agitatione, propè æquoris superficiem quam citissime volant. Quinimo aves prædictæ, *Anser Bassanus* & fortasse etiam hujus generis reliquæ unicum duntaxat una vice *ovum* parvunt & *pullum* educant. Est autem ovum illud pro corporis mole longè maximum, ut modò diximus.

**6. COLUMBA** *Groenlandica* Hollandis, **The GREEN-LAND-DOVE or SEA-TURTLE.** Ob quam rationem *Columbae* nomine insignita sit hæc avis non capio, ni fortè ob magnitudinem parem. Amplam in supina utriusque alæ facie maculam albam obtinet, *Alæ quoque subtus albae*, aliæ tota nigra est *Fulice* colore. *Rostrum* longius quam præcedentis, non compressum ad latera, acutum, extremo nonnihil incurvum & prominens. A nominis convenientia hanc avem *Basse Insulae* turturem esse mihi persuadeo. *Fredericus Martens* Hamburgensis *Avem* hanc à voce pipiente pullorum seu pipionum *Columbarum* simili *Columbam* à nautis dictam ait. *Urinantur* plurimum, & diu sub aquis durare possunt. *Gregatim* non volant, sed plerunque binæ simul, rariùs singulæ. *Volatus Perdicum* similis est, *alas* quippe celerrime motitant; nec in sublime evolant; sed ut hujus generis reliquæ paulò supra maris superficiem. In *rupibus* nidificant non in *Groenlandia* tantum sed & in *Spitzberga* regione frigidissima & perpetuis nivibus damnata, ut quæ vix decem gradibus ab ipso polo boreali distet.

*Palmipedes tetradactylæ, digitis omnibus membranis connexis.*

**1. ONOCROTALUS** sive **PELECANUS** *Aldrov.* **The PELECANE.** *Anser* maximo longè major est, *Cygnus* vel par, vel magnitudine etiam superior. *Color* totius corporis albus: *collum* tamen flavicat, & dorsalia pennarum scapi nigricant: *Caudæ* quoque & alarum tegetes è fusco cinerascent, ut in *Anseribus*. *Rostrum* versùs caput coloris plumbei est, extremitate flavicante; *mandibula* superior lata & depressa, *apice* incurvo seu adunco: inferior velut duæ longæ costæ, altera extremitate junctæ, intercedente membrana crassa seu cute lutea, quam *bursam* vocant, quam ita nonnunquam rostrum versùs retrahit ut amplius ferè non sit conspicua; eandem poltea ita dilatari sibi permittit,

ut

ut plurimarum etiam aquæ librarum, ad 30 usque, capax sit. Lingua caret. Nares ad supremam rostri partem juxta plumas capitis sitæ, rotundæ. In capitibus vertice elevatae quædam pennæ emicant, cristam æmulantes.

Singulare in hac ave est, quod offa pellucida solida omni omnino medulla carent inquit Aldrovandus, de quo qu. ult. Du Tertres concava esse scribit, medullâ tamen carere.

Invenitur in India Orientali, inque America Meridionali sociosè; olim in Italia circa Ravennam: unde Martialis eum Ravennatem vocat, Turpe Ravennatis guttur Onocrotali, Manè & vesperi tamum pilcantur; tota die quieti sedent. Quamvis palmipedes sunt, & mole corporis maxima, arbribus insident in ilque nidificant, teste du Tertres, in Hist. Nat. Inf. Antill. quod & Corvi aquatici & Graculus palmipes, nostra experientia, faciunt, & reliquæ fortasse hujus generis aves.

Onocrotali Mexicanani dentati iconem & descriptionem vide apud Jo. Fabrum Notis in Animalia Novæ Hispaniae Recchi. Ego equidem dari ejusmodi Oncrotalum rostro dentato ægrè inducor ut credam, cum præter Fr. Hernandez nemo rerum Americanarum naturalium scriptor ejus meminerit.

A. 2. ANSER Bassanus, The SOLAND GOOSE. Magnitudo Anseris. Rostrum longum, rectum, obscurè cinereum, extremo nonnihil incurvum seu hamatum, non procul ab unco appendiculâ utrinque, ceu dente quodam, donatum. Rictus ingens; nares nullæ; lingua exigua, Os intus nigrum; Rostrum mandibulæ serratae. Color in adultis & senioribus undique albus, exceptis alarum remigibus majoribus quæ nigricant, & vertice qui ætate fulveicit. Alæ longissimæ, ut cum in terram deciderit ægrè se levare possit.

In insula Bassa in medio Edinburgi æstuario sita, magno numero quotannis nidificant, in rupibus nec alibi usquam, quod sciam, in Britannia.

A. 3. CORVUS aquaticus, The CORMORANT. Magnitudo paulò infra Anserem. Color in supina parte fuscus cum quadam obscura viroris tinturâ splendens.

Pectus

*Pectus & venter albicant. Cauda longior quam in aliis Avium palmipedum generibus. Rostrum 3 ½ digitos longum, extremo aduncum. Lingua exigua & penè nulla. Nares nullæ; Crura valida brevissima.*

A Graculo palmipede præter magnitudinem in eo differt, quod basin rostri membrana seu cutis nuda flavicans obvestit, ad cundem ferè modum quo Cygni feri nobis dicti. Arboribus insidet, & in iis nidificat.

A. 4. *CORVUS aquaticus minor*, Graculus palmipes dictus. The SHAGGE, in the North the CRANE. A præcedente differt 1. Magnitudine, quâ ab eo multum deficit. 2. Pronæ partis seu ventris colore, qui in hoc fuscus est, in illo albicans. 3. Numero pennarum caudæ, quæ in hoc 12 tantum sunt, cum in illo 14. 4. Quod cutis ad basin rostri non usque adeò nuda sit, ac in illo, nec ejusdem flavi coloris. 5. Tandem tenuitate & longitudine rostri, ad 4 usque digitos extensi, quamvis avis minor sit. In mari Cornubiam alluente, & Hibernico ad insulam Monam & alibi invenitur. Scenkus in Hollandia in arboribus nidificat cum aliis multis avibus aquaticis.

5. *SULA Hoieri Clus.* *Anseri Bassano affinis, si non eadem.* Ab Anseri Bassano differt Rostrum acumine, & colore circa oculos nigro, crurum exilitate, & nigro mediarum caudæ pennarum colore; in reliquis cum eo convenit.

6. *AVIS TROPICORUM* nostratis nautis, item Du Tertre Hist. des Antilles. The TROPICK BIRD. Magnitudo Anatis, Rostrum rubrum 2. dig. longum, non-nihil incurvum, acutum. Venter albus: Dorsum album, transversis lineolis nigris undantibus pulcherrime variegatum. Remiges alarum pennæ partim albæ, partim nigrae. Cauda (si vel pelli suffultæ, vel eis qui Avem misserunt fides sit) duabus tantum pennis longissimis, 18 i.e. digitorum, angustis, acutis constat. [Præter has pennas alias breves adfuisse suspicor] In Museo Reg. Societatis Londini vidimus.

Du Tertre Pedes hujus Avis rostro concolores, hoc est, rubros Coralii instar facit, verum in Ave sicca quam nos descripsimus, Crura alba fuere, pedes nigri. *Avis Tropico-*

*picorum* dicitur, quia nullibi nisi intra *circulos Tropicos* di-  
ctos invenitur; qua nota ab aliis omnibus *Laris* differt.

7. ANHINGA Brasiliensibus *Tupinambis* Marcgr.  
*Mergi aquatichi* species, *Anatis* magnitudine, *rostro* recto  
acuto, utrinque serrato dupli dentium ordine: *capite*  
parvo, *collo* tenuipedali; *cruribus* brevibus. *Color* in capite & collo superne è griseo subflavescens, inferne & sub  
guttura griseus; reliqua pars prona argentea. Initium  
*dorsi* pennis fuscis tegitur sed quarum quælibet in sui me-  
dio maculam habet oblongam ex albo pallidè flavam, ita  
ut punctulatum appareat: reliquum dorsi nigrum: *Re-  
miges* pennæ nigræ; sequitur ordo pennarum ab uno la-  
tere nigrarum, ab ab altero canarum. *Crura & pedes* ex  
obscure flavescente grisei sunt coloris.

*Palmipedes tetradactyle digito postico soluto, &  
primo Rostro recto angusto acuto, brachypteræ  
& urinatrices, COLYMBI dictæ.*

**COLYMBIS** Rostra angusta recta acuta, Capita  
parva; Alæ etiam parvæ; Pedes retrorsum siti jux-  
ta caudam, ad expeditius natandum & urinandum; Cru-  
ra lata, plana, & compressa; Ungues lati, humanis simi-  
les. Digitæ ad latera membranas extensas obtinent, in  
nonnullis in aliis membranis connexi sunt.

A. 1. **COLYMBUS** *cinereus major*. *The great Ash-  
coloured DIVER, or DOUCKER.* Icon hujus quam  
transmisit D. Brown *caput cristatum* exhibet.

A. 2. **COLYMBUS** *major cristatus & cornutus*, *The  
greater crested DIVER.* Cristatus cornutusque est, plu-  
nulis circa verticem & collum supremum eminentibus, supe-  
rius nigris, ad latera ruffis. Mentum & spatium circa  
oculos album, cui ruffus color conterminus. Pectus &  
venter alba ruffo tincta. Alæ fuscæ: remiges minores  
albæ: *Dorsum* nigricat admixtis plumulis cinereis. Ex  
agro Eboracensi transmissa est à D. Jeffop avis occitæ pellis.  
Acithi

*Acitli Hernandez* ab hac Ave parùm differt. Eadem, inquit, prorsus esset, nisi caput majori insigniretur cristâ.

A. 3. *COLYMBUS* sive *Podicipes minor*, *The DIDAPPER* or *DIPPER* or *DOBCHICK* or *DOUCKER* or *small LOON*. Corporis figurâ Querquedulae similis est, terria ferè parte minor. Color in dorso fuscus, in ventre argenteus. Mentum album. Pectus ventre obscurius. Dissecti ventriculus gramine & herbis repletus erat. *Bellonius* eum piscibus lubentissimè vesci scribit.

Hæc tres species caudâ prorsus carent.

A. 4. *COLYMBUS maximus caudatus*, *Mergus maximus Farrensis* sive *Arcticus Clus.* *The greatest tailed DIVER* or *LOON*. Magnitudine ad *Anserem* accedit; figurâ corporis longiusculâ est, Caudâ rotundâ, capite parvo. Color in supina parte tota fuscus seu obscurè cinereus, maculis albis in collo rarioribus, in dorso crebrioribus pictus. Singulæ sci. plumulæ duabus maculis seu lineolis albis propè apicem, hinc inde unâ, notantur. Guttur & collum primum canescunt: pectus & venter alba. In alia ave caput nigrum fuit, itemque collum, in cuius medio torquis albus digitum latus, punctulis albis crebris constans. Fortè hæc mas fuit. Asperitate hyemis compulsus interdum hoc advolat.

A. 5. *MERGULUS melanoleucus rostro acuto brevi* *D. Brown.* Rostro est brevi, modicè inflexo. Supina pars tota præter lineam in alis transversam albam nigricat. Mentum, gula, pectus ad medium usque ventrem alba. Palmipes est & caudatus. Posticum digitum pictura non exhibet.

6. *COLYMBUS major Aldrov.* quem in transmarinis multoties vidimus, magnitudine excepta, quæ illius dupla est, à Colymbo minore in paucis differt, ut descriptione nova non indigeat.

7. *COLYMBUS Arcticus Lumme* *Wormio dictus.* A quarta specie differt, quod minor sit, *Anatis nimirum* magnitudine, quod in illa inaculæ pauciores sint in cervice, plures in dorso, cum in hac vice versa pauciores sint in dorso, plures in cervice: quod in illa quælibet plumula duas habeat maculas, in hac unam tantum: item macu-

lā quadratā nigrā sub *collo*, undique variegatis ex albo & nigro plumulis instar zonæ cincta.

Lumme *Friderici Martens* diversa ab hac Avis est, & ad quintam nostram speciem propius accedit.

8. *COLUMBUS maximus* *Gesneri*. *Ein grosse Zee fluder*. In *Acronio lacu* capitur *Anser major*; Prona pars corporis alba est, supina cinerea & nigra. Si à quarta specie distinctus sit mihi incognitum fateor. D. *Johnson* Avem hujus generis in Anglia sibi visam scribit maculis in dorso nullis, quam tamen à quarta specie diversam non esse opinatur.

---

II. *Palmipedes Roſtro angusto, acuto, non aduncō, macropterae & volatice LARI dictae*. *Anglicè Guls or Sea-Mews, & alicubi Sea-Cobs*.

**L**Arorum notæ sunt, *Roſtrum* validum, oblongum; angustum, acutum, ac parumper in extremo incurvum, in minoribus tamen speciebus rectius: *Nares* oblongæ; *Aīe* oblongæ & validæ; *Pedes* parvi: *Corpus* levissimum, multis & densis plumis indutum. Clamosos esse, volaticos, famelicos, & pīcivorus.

---

**LARI** tridactyli, seu postico digito carentes.

I. **RATHS-HERR** i. e. Senator *Friderici Martens*. Avis est *Spitzbergenfis*, *rostro angusto, acuto, tenui, nigro*; *pedibus nigris, tridactylis*, nam digito postico caret. *Corpus totum Cygnei* instar niveum. *Aīe longæ, cauda etiam longiuscula, lata, Larine instar*. Candore nivem ipsam superat, estque avis admodum speciosa & decora. Aquæ non libenter innatat, verū in sicco potius moratur. Solitaria plerunque est; Ad prædam tamen magni greges convolant.

2. STRUNDT-JAGER i.e. Konstgñgs. Avis Spitzbergensis Friderico Martens descripta & depicta. *Rostrum* habet obtusifuscum, nonnihil incurvum, nigrum (quantum meminit Autor) *Pedes* tridactylos ; *Crura* non longa : *Caudam* ut in aliis LARIS, in qua tamen *penna* insignis præ aliis in longum exporrigitur. *Summum caput* nigrum : *Collum* circulus seu torquis obscurè luteus ambit. *Supina pars reliqua brunnea* seu leucophæa, prona alba. Cur Strundjager vocetur, vide in LARO cinereo Bellonii.

3. BURGHER-MEISTER Spitsbergensis Frid. Martens in omnibus fere cum Laro nostro cinereo maximo convenit, præterquam quod postico digito careat.

### LARI tetradactyli seu postico digito donati.

A. 1. **L**ARUS maximus ex albo & nigro seu cœruleo nigricante varius, marinus ingens Clus. The great black and white GULL. Anserinæ ferè magnitudinis est. *Rostro* luteo, ad latera compresso, extremo nonnihil adunco. *Mandibula* inferior versus apicem in angulum infernè extuberat, macula utrinque dupli, inferiore nigra, superiore rubra tinctum. *Caput* (quod grande est) *collum*, *pectus*, *venter*, *cauda* alba. *Medium dorsum* & *Alæ* præter apices remigum nigrae. *Crura pedesque alba* ; *ungues nigri*. Nos è dissecti ventriculo Passerem pisces integrum exemimus. Cestriæ hunc nauci sumus.

A. 2. **L**ARUS cinereus maximus, The HERRING-GULE Magnitudine ad Anatem domesticum accedit : *Rostro* flavo, præcedentis figurâ, cum prominentia angulari in inferiore mandibula, liturâ amplâ rubrâ utrinque notatâ. *Pedes* nunc lutei, nunc carnei coloris : *ungues nigri*. *Caput*, *collum*, *uropygium*, *cauda*, totâque prona facies alba. *Dorsum*, alarum tegetes & rectrices, exceptis 5 extimis (albo maculatis) obscurè cinereæ. In maritimis frequentissima est hæc avis.

A. 3. **L**ARUS cinereus minor, The common SEA MALL or MEW, Pondera est librali : Præcedenti similis, sed longè

longè minor. Protuberantiâ in inferiore rostri *mandibula* longè minore: *Pedes* pallidè virides.

A. 4. *LARUS cinereus* Bellonii, *TARROCK* Cornubiensibus. *Columba domesticæ* magnitudine est, nec figurâ multùm dispar. Pronæ partis totius color niveus. *Caput & collum* superius album, nisi quòd ad aures utrinque macula nigra. inferiorem colli partem nigredo occupat. *Dorsum* medium & *scapulæ* cinereæ. *Cauda alba*, apicibus pennarum tigris. *Rostrum* digitale, nigrum. *Pedes* lividi, *ungues* nigri. *Digiti* postici quoddam rudimentum obtinet potius quàm digitum, tuberculum sci. carneum nullo *ungue* munitum: quâ notâ ab aliis omnibus speciebus facile distinguitur.

*Avis* hæc *Friderico Martens* nomine *Kudge-ghef* à voce seu clamore quem edit imposito, describitur; ejus autem excrementis *Larus Strun-jager* dictus inhians, eam persequi & insectari non defistit, donec alvum dejiciat; ut fimo vescatur; quem antequam in aquam decidit intercipit & avidissime devorat. Hoc (inquit) ego ex aliorum relatu non credidisse nisi propriis oculis ipse sàpius vidisem. Eandem nobis historiam retulerunt *Cornubientes*.

A. 5. *LARUS cinereus*, *Ornithologi* Aldrov. item *cinereus tertius* Aldrov. *Cephus Turneri & Gesneri*. *The Pew-it or Black-cap, called at Chester The Sea-crow*. Magnitudo *Columbæ*, *Rostrum* sanguineum modicè inflexum, *Pedes* etiam obscurè sanguinei, *Ungues* nigri. *Vertex* niger, in nonnullis totum *caput & gula* ad medium usque è nigro cinerascunt. Medium *dorsum* cinereum, item alarum tegetes: *Collum, cauda, pectus, venter* alba. *Gregatim* nidificant & pariunt.

A. 6. *CATARACTES noctis*, *Skua* *Hoieri* Clusio. *The GANNET*, ut puto, *Cornubiensem*. *Anati domesticus* par est, vel eo major. *Rostrum* validius, majus, brevius quàm in aliis *Laris*, nigrum, extremo aduncum, ad *nares* usque membranâ tectum, *Accipitrum* instar. *Pedes* nigri, *unguis* aduncis validis, quales in nulla hactenus *Ave* palmipedè observavimus. *Color* dorsi *Buteonis* similis è cinereo seu murino ferrugineus. *Venter & reliqua*

qua pars prona dilutior. *Caudæ & remiges* alarum pennæ nigræ, fundis albis. *Tota facies* Avem rapacem refert.

Pellem suffultam in cœnaculo cujusdam Generosi suspensam nobis describendam impetravit Vir Clariss. D. Gualterus Needham non ita pridem defunctus.

7. **CATARACTA** Aldrov. quam *Accipitrem* Palumbarium adeò exactè exprimere scribit, ut vix discernas, à *Catarracta* nostra præcipue differt 1. *Corporis* parvitate. 2. *Unguis* minoribus; quibus non obstantibus, eandem specie avem fuisse existimo: Pictura enim fallax est, ut rectè Plinius; *Aldrovandus* autem Avem ipsam non vidit, sed imaginem ejus pictam tantum.

8. **LARUS major cinereus** Baltner. cui, ni pictura fallat, corpus totum obscurè cinereum supina parte; exceptis alarum *remigibus* majoribus, quæ nigricant, & vertice seu summo capite, ex viridi obscuro nigricante: *Rostrum*, rectum miniaceum, *pedes* nigricantes. Excepto pedum colore accedit ad *Cepphum* Gesneri & Turneri i. e. *Pewittam* seu *Melançoryphon* nostratem.

9. **LARUS albus major** Bellon. Nivis instar candidus est, sub *alis* tamen aliiquid habet cinerei. *Oculi* nigro ambiuntur colore. Prope *aurium* regiones utrinque macula est nigra, in reliquis ad *Pewittam* nostram accedit.

10. **LARUS major** Aldrov. *hybernus* Baltner. A *Laro* nostro hyberno differt iridum *oculorum*, *rostri*, & *pedum* colore; cum in hac ave *rostrum* & *pedes* lutescant. Cum autem *Lari* hujus descriptio apud *Aldrovandum* exactè respondeat avi illi quam *Leon. Baltner*, auceps & piscator *Argentinensis*, sub titulo *ein Winder* Meb. i. e. *Lari* *hybni* descriptis & depinxit: ab hyberno nostro *Laro* *Coddy moddy* dicto Avem diversam existimo.

11. **CEPPHUS** Aldrov. *Rostrum* mediocre, colore carneo, ad *mandibularum* latera ruffo, in extremo (quod aduncum est) nigro: *Oculorum* irides albicant. *Capue* (quod paulo minus est quam in *Laris*) cum prona parte tota ex albis & fuscis, intercurrente etiam colore Boeticō & luteo, maculis variegantur. *Alæ* nigrefcunt, pennis in fine lutescentibus. *Caudæ* pennæ majores etiam nigrefcunt, *Crura* & *tibiæ* viridefcunt: *Pedes* & *membra*

## 130 SYNOPSIS METHODICA

*na* digitos intercedens fuscescunt. *Rostro* & pedum tibiae rūmque formā *Larum* refert, in cæteris potius *Anatem*.

12. *Larus Brasiliensis* GUACA GUACU dictus, *Lusitanis* Gaviota Marcgr. Magnitudine est Gallinæ; *rostro* recto, longo crasso, flavo. *Caput* superius nigrum, ut & ultima medietas *alarum* & *caude*: prona pars tota & initium *alarum* alba. *Ova* ponit in arena, figura, magnitudine, & colore Gallinaceorum.

A. 13. WAGELLUS Cornubienium. *Martina* Venetis. *Amstelodamensis* The BURGO-MASTER of GROENLAND. *Mallemuck* Spitzbergensis Frid. Martens, ut nobis videtur. The GREAT GREY GULL. *Pondus* 22 unciarum. *Colo*r tam in prona quam supina parte ex albido seu cinereo & fusco varius, (gray Angli vocant,) qualis in *Anate vulgari* vel *Numenio* ave cernitur. Quæ uropygio innascuntur & caudæ incumbunt pennæ maximam partem albæ, in medio duntaxat maculis fuscis majoribus pictæ sunt. *Alarum* remiges nigræ. Pennæ caudæ, areolis alternis albicantibus & nigris transversis variae; propè summam partem ductus seu annulus latus niger, supra quem apices pennarum albent. *Rostrum* 3 digit. longum. totum nigrum. *Collum* breve, *Caput* grande, quod semper ad armos contrahit inter standum & ambulandum, quod & alii *Lari* faciunt. A *capitis* magnitudine (ut conjicio) *Amstelodamenses* hunc Burgo-master vocant. Circa Cornubiam frequens.

Alia avis est quam Fridericus Martens pro Burgermeister describit, nimirum *Larus noster cinereus maximus*: Verrum pedes ei tridactyli.

A. 14. LARUS fuscus sive hybernus, The WINTER-MEW, in agro Cantabrigensi the CODDY MODDY dictus, *Pondus* 17 unciarum. *Caput* album maculis fuscis varium. *Collum* & ingluviei regio nonnihil fuscescit, aliâs prona facies tota alba est. Medium dorsum cinereum; scapulares pennæ maculis fuscis variae; *Tropygium* album. *Caudæ* pennarum extremi apices albent, succedit area nigra fuscunciam lata; reliqua parte alba. *Rostrum* duos digitos longum, à naribus ad extrellum è fusco albidum. Eminentiam habet in inferiore mandibula,

la. *Circa prata humida, paludes, fluvios multis milliaribus à mari remotos hyberno tempore versatur.*

A. 15. *STERNA fusca* D. Johnson, *The BROWN TERN.* An *Larus cinereus minor* Aldrov. ? Pars *prona* tota alba, *supina* fusca. *Alæ* partim fuscæ, partim cinereæ : *Caput nigrum*. Gregariæ sunt hujus generis aves.

### LARI minores cauda forcipata.

A. 1. **H**IRUNDO marina, *Sterni Turneri*, *The SEA SWALLOW.* *Pondus 5 unciarum. Corpus* tenue longiusculum ; *Cauda* forcipata, unde *Hirundinis* nomen indepta est. *Prona* pars tota, (excepto pectore medio quod nonnihil cinereum) ut & *uropygium* alba. *Dorsum* & *supina* alarum facies obscurè cinerea. *Caudæ* pennæ extimæ semipedales & majores, limbo exteriore ex cinereo nigricant. *Rostrum* longum, rectum, rubrum, extremo nigricans. *Pedes* rubri. Circa *Caldez* insulam *Walliae* Meridionali adjacentem *Spurres* dicuntur, alibi *Scrayes* à sono vocis quam edunt, sunt enim improbè clamofæ.

A. 2. *LARUS piscator* Aldrov. & Gesn, *The LESSER SEA-SWALLOW.* *Alæ*, *cauda*, & *velocitas Hirundinis* ; *Rostrum* rubrum ; *Vertex* niger ; *Dorsum* & *alæ* cinereæ ; *Cauda* bifurca, sex pollices longa.

A. 3. *LARUS niger* Gesneri, *The SCARE-CROW*; Homines perquam aversatur. *Caput ei*, *collum*, *venter* nigra ; *Alæ* cinereæ ; *Cauda* parùm forcipata ; *Pedes* minimi, rubri. *Mas* sub mento maculam habet albam.

4. *LARUS niger fidipes alis longioribus* Aldrov. *Alis* & pectore planè cinereis est seu leucophæis ; *Alis* etiam longissimis & finem versus nigricantibus : *Cauda* breviuscula cinereâ ; *podice* albo ; *pedum digitis* satis longis, & insignibus mucronibus armatis, nigris ; *tibiis* brevibus, etiam nigris ; *cipite* insuper, *collo*, necnon & *rostro*, (quod longiusculum est, & in extremo leviter aduncum) nigro.

5. *LARUS niger fidipes alter, alis brevioribus* Aldrov. *Magnitudo* præcedentis i. e. *Merula* par, sed *alis longè* brevi-

brevioribus, & cauda è contrario multò longiore: color cinereus; caput nigrum, ut & Rostrum, quod gracile & aliquantulum recurvum. Pennæ sub cauda candicant: Pedes rubescunt, parvi ut Hirundinibus; digitæ 4 membranulæ quodam rudimento interjecto.

Duarum sequentium Avium notitiam & descriptiones D. Johnson debemus.

A 6. *LARUS miuor fidipes nostras*, *The small black cloven-footed SEA-SWALLOW*. Hirundine marina minor est: Rostrum sesquidigitale, acutum, nigrum. Caput nigrum; Dorsum & alarum superior facies obscurè cinerea: Gula & pectus nigricant: infimi ventris pennæ sub cauda niveæ. Cauda forcipata, extimis pennis  $3 \frac{1}{3}$ , mediis  $2 \frac{1}{2}$  digitos longis, extimæ utrinque albæ sunt, reliquæ dilute cinereæ. Pedes exiles è ruffo nigricantes, digitis aliquousque divisis, infima tantum parte membranâ connexis. Vox ab *Hirundinis marinae* voce vix potest discerni.

A. 7. *LARUS fidipes alter nostras* D. Johnson. Merula par est, aut è paullò minor. Rostro tereti, tenui, acuto, nigro. Vertex niger seu obscurè ruffus; ad collum latera & sub collo rubet. Prona pars tota alba, Dorsum, alæ fuscæ, maculis subflavis. In alis transversa linea alba in apicibus pennularum. Alæ longæ, cauda brevis. Digitæ pedum non connexi, sed membranulis ad latera utrinque extantibus sinuosis & eleganter ferratis instructi. Avis hæc singularis est, inter Fulicas & Laros ambigens. Apud D. Johnson siccum vidiimus.

8. *Larus minor ex albo & nigro varius* Mus. Leyd. Anova Lari species sit, an aliqua ex descriptis nos latet?

9. *Larus cinereus minimus* Mus. Leyd.

10. *Larus Americanus minor stolidus*, corpore fusco-rubente, vertice albo. D. Sloane. A NODDY. Passer stultus Hernandiz, Nieremberg. Descriptionem vide in Appendice,

*Aves Palmipedes rostro in extremo aduncō, non ferrato.*

1. **AVIS DIOMEDA** Aldrov. & Gesn. Magnitudine est gallinæ, collo & cruribus longiusculis; colore fusco seu cinereo obscuro, ventre canticante: Rostro luteo, præter uncum qui nigricat. Laros cum toto corpore, tum alis potissimum refert. De Ave hac, (quæ in insulis Diomedea *Tremiti* hodie dictis invenitur) diligentius inquirendum. Descriptio enim quam ejus habemus apud Gesnerum & Aldrovandum mutila est & imperfecta. Cæterum ad Avem Diomedeam *Aldrov.* aut potius ad Puffinum Anglorum, nam Diomedea minor est, accedit Avis.

A. 2. **SHEARWATER**, i. e. Aquæ superficiem radens Clariss. Viro D. Thomæ Brown dicta, cuius iconem pictam nobis communicavit. Magnitudine Anati cedit, caput grande, ut in Laris. Pars supina, caput nimirum & dorsum, fusca seu obscurè brunnea: menum, gula, pectus alba: Pedes carnei. Rostrum teretiusculum, oblongum, extremo hamatum ad Corvi marini modum, nigricans. Alæ longæ complicatae ad extremam caudam pertinebant.

*Avis stulta prior* Du Tertre esse videtur: notæ enim pleræque convenient. Stulta autem appellatur, quod cum navem appropinquantem videt, statim advolat, & vel malis, vel antennis infidet, sequé interdum vel manibus capi permittit.

3. **MAIGUE Brasiliensium** Pisoni. Magnitudo & figura Anleris: Rostrum in extremo aduncum, ad modum Corvi aquatichi Gesn. quo cum etiam fusco seu subnigricante colore convenit: Colli tantum pars interior flava. Caput crassiusculum est & rotundum. Circa fluviorum ostia in mari vivit: in littore autem nidificat & ova ponit. *Velox* est, natatrix & urinatrix,

A 4. **PUFFINUS** *Anglorum, The MANKS PUFFIN:*  
 Reperitur etiam in insulis Sorlingis Sillies dictis, Magnitudine Columbam domesticam superat. Color in supra parte tota fuscus aut niger, in prona albus. Rostrum sefquidigitale aut longius, angustum, nigrum, Vannelli figurâ. Mandibula superior extremo adunca. Corvi marini modo, ad basin carne nuda obducitur in qua nares. Alæ longæ; cauda palmum longa. Digitum posticum habet. In cuniculorum foraminibus nidificat; unicum ovum ponit & pullum educat. Tota die pescatur, nec ante crepusculum ad nidum & pullum reddit, quem iterum summo manè deserit.

---

*Palmipedes rostro angusto, in extremo aduncо  
serrato; seu MERG 1.*

A. 1. **MERGANSER** Aldrov. *The GOOSANDER*  
*Harle Bellon.* Pondus 4 librarum. Dorso est lato & plano. Caput & colli superior pars è viridi splendente nigricat. Supina pars corporis ex albo & nigro pulchre variegata est. Cauda cinerea. Prona pars corporis (seclusis alis quæ subtus albicant) gilva. Rostrum angustum, serratum, aduncum, digitus manus medii longitudine, partim nigrum partim ruffum. Pedes coloris miniacei elegantis. Ampullam seu Labyrinthum in trachea habet magnum, osseum, atque insuper Arteria ipsa in duplicem ventrem turgescit. Cirrum in capite propriè dictum non habet, plumæ duntaxat laxiores sunt & furectiores solito, unde & Caput justo majus appetet.

A. 2. **MERGUS serratus longiroster major** Gesn. Aldrov. Merganser fæmina ut puto. *The DUN DIVER* or *SPARLING FOUL.* Sexus in hoc avium genere, coloribus mirum in modum inter se differunt. Huic caput torpidè ruffum Capitis plumæ non nihil extare videntur & retrorulum vergere cirri in medium; Mentum album, Dorsum totum cinereum; Prona pars gilva ut in mare. Alæ in utroque sexu pro corporis mole exiguae, quas inter

ter volandum celerrimè movet, & paulò supra aquæ superficiem mira celeritate fertur. Hæc etiam ampullam seu labyrinthum in aspera arteria habet : quod maribus proprium opinati sumus.

A. 3. *Mergus major cirratus* Gesn. *Albellus* alter Aldrov. *The WHITE NUN.* Magnitudine ad Anatem fistularem accedit, 24 unciarum pondere. Vertex, caput, collum alba, exceptâ maculâ, sub crista seu cirro à vertice retro dependente, nigrâ, circum ambientे, & in acutum angulum desinente, aliâque utrinque ab angulis oris ad oculos protensâ. Prona corporis facies tota nivea. Dorsum nigrum. Torquis dimidiatus niger duplex à dorso versùs gulam descendit. Alæ variae sunt ex albo & nigro. Cauda ex cinereo nigra. Rostrum cinereum seu plumbeum ; cuius coloris sunt & pedes, digitis membranâ fuscâ connexis.

Fæmina hujus generis *Mergus Glacialis* Gesnero dicitur, cui Caput totum & genæ ruffæ, gula albet. In summo pectore supra prolobum coloris obscurioris velut torquis quidam cernitur. Crista nulla. Supina pars tota, alis exceptis, è cinereo fusca.

A. 4. *Mergus cirratus fuscus*. A Mergansere fæmina differt 1. Magnitudine qua illi multùm cedit. 2. Colore in dorso obscuriore, & fusco potius quam cinereo. 3. Crista in capite oblonga retro dependente. 4. Macula alba in alæ basi. Ob cristam à capite longam retrorsum dependentem, fortè hæc fæmina fuerit *Mergi cirrati*, aliæ tamen notæ repugnant.

5. *Mergus Rheni* Gesnero Aldrov. T. 3. p. 275. Excepta magnitudine qua eam accedit, & cirri absentia, Avem Albellum dictam per omnia refert, ut ego sane eandem putem : eò magis quod *Leonardus Baltner* auceps & pisator Argentinensis, diligens sanc & industrius, qui aves omnes Rhenum frequentantes sedulò observavit, descripsit, & delineari fecit, non aliam hujus generis avem præter Albellum exhibit, quam *Nomæ albæ* titulo insignivit.

*Aves Palmipedes latirostræ majores, seu  
ANSERINUM Genus.*

**A**Nserini generis notæ sunt 1. Moles corporis major. 2. Collum oblongum. 3. Alæ amplæ; cauda quoque ampla & in circularem circumferentiam terminata. 4. Annulus circa uropygium albus. 5. Dorsum elatius & rotundius, nec acleò planum & depresso ut in Anatino genere. 6. Rostrum ad basin crassius, versùs apicem tenuius & magis resumum quàm Anatibus.

**A.1. CYGNUS mansuetus, The TAME SWAN.** Magnitudine quàm omnes hujus generis aves superat, colore undique niveo, lculo carneo nigro antrosum flexo ad basin rostri, à reliquis hujus generis insigniter differt.

**A.2. CYGNUS ferus, The WILD SWAN, or ELK, & alicubi, The HOOPER.** Non tantum feritate sua, sed & aliis accidentibus, quæ specificam, ut vocant, distinctionem arguunt, à præcedente distinguitur. 1. Magnitudine & pondere ei cedit. 2. Color non undique niveus est, ut in illo, sed medium dorsum & minores alarum pennæ cinerascunt, fuscis etiam pennis interdum albis intermixtis. 3. Rostrum ad basin cute nuda pulchrè lutea obducitur. 4. Aspera arteria mirabili modo sternum ingreditur inibique reflectitur.

**A.3. ANSER domesticus, The TAME GOOSE** Cygno minor est, Anate major. Collo breviore quàm Cygnus, longiore quàm Anas. Color ut in aliis avibus domesticis varius, vel fuscus sci. vel cinereus, vel albus, vel ex fusco & albo mixtus. Mas plerunque albus est. Rostrum & pedes in junioribus lutei, in adulcis plerunque rubri. Cùm irascitur, sibilum edit Serpentis instar.

**A.4. ANSER ferus,** Magnitudine Anserem domesticum æquat, estque figurâ corporis ei persimilis, nec colore multum abludit: in universum supinæ partis color obscurè cinereus seu fuscus; pronæ albidus, sensim lucidior

dior ad caudam usque, ubi prorsus niveus. Caudæ etiam superne incubentes pennæ albæ. Rostrum basi & apice nigrum, media parte croceum.

A. 5. BERNICLA seu *Bernacula*, The BERNACLE, or CLAKIS. Ansere domestico minor est, Rostro nigro, Anserino multò minore & breviore. Mentum, maxillæ, & quod rostro contiguum est, albet, excepta tamen areola à rostro ad oculos nigrante. Collum ad sternum usque supra subrufisque nigrum. Prona pars corporis alba cum aliqua cinerei mixtura, infimæ tamen femorum plumæ paulò supra genua nigræ. Cauda nigra. Alæ (pennæ coloribus abicante, nigro, cinereo transversim sitis distinctæ) pulchram speciem exhibent. Dorsum nigrum & cinereo varium. Maritima Lancastriæ frequentat.

A. 6. BRENTA, The BRENT-GOOSE, *Anas torquata* Bellonii. Anate paulò major est, & figurâ corporis longiore. Caput, collum, & pars superior pectoris nigra. Ad medium tamen colli utrinque macula seu *lincola* alba torquis speciem exhibens. Dorsum coloris Anserini seu fusco-cinerei; versùs caudam nigrat magis, verum pennæ caudæ proximæ albescunt. Rostrum superioris simile. Pedes nigrant.

D. Johnson hanc fœminam superioris esse existimat, quod cum Berniclis congregetur & unà volitet. In maritimis Septentrionalibus.

In Sussexiæ & Hantoniæ maritimis frequentem esse à D. Tancredo Robinson habeo.

A. 7. BRENTHUS, The RAT, or ROAD-GOOSE. Ansere domestico dimidio minor est. Rostrum vix unciale, nigrum uti & pedes. Vertex & pars colli nigrant. Plumæ ad imum rostrum, gula, pectus fusca. Reliqua pars prona alba; lupina cæsia seu subfulca. Pennæ alarum rectrices, ut & caudæ, nigræ: Hæc tamen utrinque albas aliquot habet. In maritimis Dunelmensis & alibi in Septentrionalibus. D. Johnson.

Insignissimus Vir D. Martinus Lister, M.D. Literis Septembri mense, Anno 1685. ad nos datis, duas aut forrè tres adhuc species superaddit; Eæ sunt,

A. 1. *Anser Hispanicus* parvus, Brentæ magnitudine ; figurâ & colore, ad Anserem domesticum accedente. *Cur Hispanicus dictus sit me latet, nisi quod ab Hispania ad nos advolare credatur.*

A. 2. *Anser maximus niger*, *The W H I L K* dictus, ineunte Bruma primum adveniens : Raro alibi quam in pratis paucisque observatus, ubi herbis vescitur.

A. 3. *Anser palustris noster*, *G R E Y L A G G* dictus. Huic magnitudo Anteri domestico suppar. Caput ex fusco nigricat, & ad medium collum infuscatur. Dorsum ex cinereo livefcit ; ipsæ autem alæ & earum Remiges nigricant. Uropygium albescit, ejusque pennæ externæ albidae sunt. Venter cinereus, is vero imus sensim fit niveus. Rostrum à capite ad medianam ferè partem nigrum, deinde subpurpleum, ipso etiam apice nigro : in superiore mandibula nonnisi unicus denticulorum ordo, atque idem simplex in inferiore ; item huic lingua uno denticulorum ordine armatur. Pedes subpurplei sive carnei coloris, unguis fere albidi, excepto medii digiti, qui ex majori parte nigricat. Pendet libras  $7\frac{1}{2}$  fere. In paludibus agri Eboracensis nidificant : ipsi & eorum Pulli mense Maio pinguefcunt, & in deliciosis habentur. Haec tenus *D. Lister*, qui tamen hanc speciem ab Ansere fero vulgari nobis descripto diversam esse non fidenter affirmat, quoniam descriptiones in omnibus fere, excepto Restri & pedum colore, convenient.

8. *ANSER Cygnus Guineensis*, nonnullis *Anser Hispanicus*. *The SWAN-GOOSE*. Linea è fusco nigricans à capite per collum summum ad dorsum extenditur. Rostrum, nigrum à cuius radice tuberculum exurgit eidem imminens, qui in maribus & senioribus major est. Torques albus inter oculos & rostrum caput ornat. Pedes rubescunt, & in nonnullis etiam Rostrum. Collo decenter erecto incedit hæc avis.

9. *ANSER Gambensis*. *The GAMBO-GOOSE*, or *SPUR-WINGD GOOSE*. Anatæ moschatæ figurâ similis est, & magnitudine par ; pedibus tamen longis rubentibus ; Rostrum etiam rubescit. Maxillæ, mentum, & venter albent. Dorsum purpleo obscurò colore splendet. Caput ca-

runculâ rubrâ donatur. Verùm nota maximè characteristica est validum calcar à primo alarum articulo prodiens.

10. ANSER *Canadenis*, *The CANADA GOOSE* Figurâ corporis Anseri domestico responderet, nisi quòd paulò longior sit. Dorsum ex fusco cinerascit Anserini instar, uropygium nigrum est, verùm infimæ plumæ supra caudam albæ sunt; infima etiam pars colli albicat, reliquo nigro. Ab occipite sub oculis per mentum semitorquis albus extenditur. Venter albus: Cauda nigra, ut & majores alarum pennæ remiges, ininores & vestitrices è fusco cinerascunt, ut in Anseribus. Pedes nigri. In Ornithotropheo Regio S. Jacobi vidimus & descripsimus.

11. ANSER sive *Anas montana Spitzbergensis* Friderici Martens. Magnitudo ei mediocris Anseris: Rostrum Anserino quàm Anatino similius. Pennis vestitur ex albo & nigro variis, estque Avis pulcherrima. Anatum more urinatur & sub aquas se demergit. Fœmina Perdicis est colore. Gregatim volant. In insulis humilioribus nidificant, & quatuor fere unà vice ova ponunt, pallide cœrulea, nostratum Anatum ovis paulò majora.

### *Palmipedes latirostræ minores, seu ANATI-* *NUM genus.*

A Natini generis notæ sunt. Pedes quàm pro corporis ratione majores; Corpora minora quàm Anseribus; crura breviora & posterius sita; Dorsum latius & planius, adeoque corpus magis compressum seu depresso; Rostrum denique latius, magisque resumum. Sunt autem vel *Feræ*, vel *Domesticæ* seu mansuetæ. Feræ itidem duorum sunt generum. 1. *Marinæ*, quæ in aquis saltis vixum querunt, & plerunque circa mare versantur, rostris latioribus magisque resumis. Digito postico ample, tenui, seu membranâ aucto; caudâ longiusculâ;

culâ, non tamen acutâ. 2. *Flaviatiles seu aquarum dulcium, Plash-Ducks.*

---

### Anates MARINÆ.

A. I. **TADORNA Bellonii, Vulpanser quibusdam, The SHELDRAKE, or BURROUGH-DUCK, called by some, BERGANDER.** Magnitudine inter Anatem & Anserem media est. Rostrum ei breve, latum, nonnihil recurvum, rubrum, præter nares & unguem extremum, quæ nigra. Gibbus propè basin superioris mandibulæ exoritur oblongus, carneus. Capit & colli superior pars è viridi obscuro splendente nigricant. Reliquum colli, & prolobi regione nivea. Pectus & Scapulæ pulcherimo leucophæo seu mali Aurantii colore imbuuntur, qui velut annulus quidam totum corpus anterius cingit. Reliquum pectus & venter alba, area tamen nigra ad anum usque producta nigrum medium dividit; ponè anum pennæ leucophææ. Dorsi pennæ ut & alarum, præter eas quæ in extremitate articulo sunt, albæ: Scapulares longæ dorso incumbentes nigræ. Caudæ pennæ albæ apicibus nigris. Breviter: Avis hæc pulcherrimis coloribus, albo, nigro, leucophæo distincta & varia è longinquo spectabilis & cognitu facillima est.

In maritimis Cambriæ & Lancastriæ plurimas vidi-  
mus: quin & Orientale Angliæ latus magno numero fre-  
quentant.

2. **ANAS capite ruffo major. Capo rosso maggiore Romæ.** Magnitudine Anatem vulgarem æquat super-  
ratve. Rostro sanguineo, ad caput crassiore; pedibus,  
rubris, membranis digitos connectentibus nigris. Capite  
plumulis densis extantibus grandiore. Vertex plumi-  
gine sericea peramœna dilutiùs rusta, velut in cristam  
assurgente vestitur. Irides oculorum miniatæ. Collum  
totum, scapulæ, pectus, venter totus, nigro colore im-  
buuntur: laterales sub alis, & quæ alas subtus vestiunt  
plumæ albæ rubore dilutæ; ut & alarum remiges, su-  
pina parte, apicibus nigris; Corpori tamen proximæ 6,

ut

ūt & vestitrices, cinereæ, exceptis iis quæ in summa alæ costa existunt, quæ lineam albam efficiunt. Hanc a-  
yem Romæ nocti sumus.

A.3. A N A S S. Cutberti seu Farnensis, An *Eider* plumis mollissimis Wormii? *The CUTBERT-DUCK.* Anatem vulgarem magnitudine superat. Mas ex albo & nigro varius est. Dorsum album, cauda & rectrices alarum pennæ nigræ. Pedes nigri. Rostrum Anatino longitudine suppar, mandibula superior extremo nonnihil in-curva. Fœmina colore ad Tetraonem fœminam accedit. In utroque sexu plumulæ latera rostri convestientes, in angulum utrinque ad medias usque nares [sub naribus] procurrunt; quod huic generi peculiare est, nec me in ullâ aliâ Anatis specie hactenus observâsse memini. Nullibi apud nos quâm in insula *Farna* parit aut conspicitur: Pullos recens editos ad mare secum dederit, cùm-que eis discedens terram nunquam respicit: quòd abeat incognitum.

A.4. A N A S *niger* Aldrov. *The great BLACK DUCK.* Anate vulgari major est. Rostrum latum & breve utrinque flavescit, medio nigret, cum ungue rubro. Caput & colli pars superior in nigro virescit. Corpus reliquum totum nigrum præter lineam unciam transversam albam in medio alarum, & maculam ponè oculum utrumque albam. Crura & pedes externa parte rubra, internâ ci-trina, membrana & unguis nigerrimi. In intestinis ad rectum ferè cochlearum & testarum minuta frustula indigesta reperi, at verò in intestino recto satis concocta & quasi in arenulam comminuta: quod notatu dignum.

A.5. A N A S *niger minor*, Eboracensibus S C O T E R. Anate tantillo minor est, sed figuræ rotundioris. Color totius corporis undique pullus seu niger, plumis in mento & pectoris medio admixtis cinereis. Rostrum circa nares lutescit, aliàs nigrum. Pedes nigricant. In mare Ro-strum præcipue est notabile, 1. Quòd nullum habeat in superiori mandibula ligulam seu unguem, præter normam aliarum omnium hujus generis Avium. 2. Quòd superior mandibula supra nares juxta frontem in insig-

nem magnitudinem extumescat, in binas velut nates divisum, quas linea flava intercurrit & distinguit. In vadis Lancastrenibus frequens est. Gallis *Macreufe* audit, Vid. *Transact. Philosoph.* N. 172.

A. 6. **FULIGULA** fortè Gesneri, *The SCAUP DUCK*. *Anate vulgari* paullò minor est; Rostro lato, cœruleo, laminâ superiore multò latiore. Caput & pars colli è nigro vireicit. Pectus nigrum. Venter albus, asperso imâ parte subflavo; circa podicem subnigra est. Dorsi pars superior fuliginosa, media alba, lineis fuscis transversis cymatili ductu varia. Alæ fuscæ maculis albis cum linea transversa alba variæ. Veùm colores, præsertim capitum & colli in hoc genere in infinitum variant. Pedes unâ cum membranis & unguibus è fusco cœruleo lescunt.

A. 7. *ANAS cristata*, *An Fuligula prima* Gesneri Aldrov. ? *Mergus cirratus minor* Gesn. *Querquedula cristata* sive *Columbis* Bellonii, *The TUFTED DUCK*. *Anate minor* est, pondere bilibrali; corpore brevi, crasso. Rostrum latiusculum, præter apicem (qui niger est) pallide cœruleum. Pedes lividi seu obscurè cœrulei; membranæ digitos connectentes nigrae. Caput è purpureo nigricat, cirro setunciali ab occipite retrosum dependente. Color in supina parte tota, inque collo & summo pectore fuscus obscurior & propemodum niger; imum pectus & venter ad annum usque alba aut argentea. Mediæ alæ pennæ remiges niveæ.

A. 8. *ANAS platyrhynchos mas* Aldrov. *Clangula* Gesn. *Quattr' occhii* Ital. *The GOLDEN EYE*, i. e. *Anas chrysophthalmos*. *Anate minor* est, corpore crasso, brevi iusculo; capite itidem crasso, obscurè viridi, seu è viridi aut purpureo nigricante. Ad angulos oris macula majuscula subrotunda alba, unde nomen *italicum Quattr' occhii*. Irides oculorum aureæ unde *Golden Eye* nomen. Collum totum, tam pronum quam supinum, scapulæ, pectus, & venter totus alba. Interscapulium & inferior pars dorsi tota nigricat. Alæ ex albo & nigro variæ sunt. Cauda penitus nigra. Crura perbrevia crocea, membranæ digitos connectentes fuscæ seu nigricantes.

*Anas*

Anas fera capite subruffo minor nobis Will: *Ornitholog.*  
pag. 282. descripta hujus fœmina est; ut auctores nobis  
retulerunt.

A. 9. *Anas platyrhynchos altera sive clypeata Germanica:*  
*Anas latirostra Schw.* latirostra major. *Gesn.* Aldrov. *The SHOVELER.* Anate vulgari aliquanto minor est. Rostrum oblongo, nigerrimo, versus apicem multò latiori quam ad basin, clypei instar excavato, extrema circumscriptione subrotundo, ab aliis congeneribus facile distinguitur, si aliae notæ deessent. Crura & pedes miniacea, minora quam in aliis Anatibus. Caput & collum ad medium usque pulchre cœruleescunt, item minores tegumenta aliae pennarum ordines. Mediæ alarum pennæ remiges notam viridem saturatiorem splendentem obtinent. Prolobi regio albicat: reliquum pectus & venter totus ad podicem usque rubent: infra anum nigrat. Dorsum fuscum viridi aut cœruleo purpureo splendente colore dilutum. Cauda ex albo & nigro varia. Uno verbo Avis est pulcherrima.

A. 10. *Anas fera fusca* Gesneri Aldrov. item *Rothalss* Gesneri *Penelops Veterum* Aldrov. An fera 8. feu *Erythrocephalus* 1. Schevench. *The POCHARD or great REDHEAD* EDWIDGEON. *Penelope vulgari*, [*The Common Wigeon, or Wiener*] dicta major est, & pro magnitudine brevior crassiorque. Caput & collum ferè totum saturè fulvum aut rufum; inferior pars colli, & pectoris summa nigra; media pars pectoris alba, inferior lineolis fuscis varia. Medium dorsum & alarum vestitrices cinereæ, lineolis transversis fuscis undulatis pulchre variegatae. Cauda tota nigrat. Alarum remiges è fusco cinerascent, apicibus mediariis 11. albis. Rostrum extremum aliquousque nigrum, media pars cœrulea, basis iterum nigra. In maritimis frequens habetur.

Nota hujus avis characteristica est unus idemque per totas alas color, sine ullis diversi coloris pennis in mediis alis.

11. *Anas fera fusca minor*, An *Anas Fuligula altera* Gesneri Aldrov. p. 227? *Glaucium* sive *Morillon Bellon?* *Capo rosso Venetijs*. Magnitudine est inter Penelopen & Quer-

Querquedulam media: Rostro obscurè cœruleo, ad margines pallidiore, Apice seu uringe rotundo nigro: Oculorum iridibus lacteis aut eburneis. Capite satis crasso, toto ruffo ieu ferrugineo: in angulo tamen mandibulæ inferioris macula exigua alba cernitur: collo brevi, cuius medium torquis fulcus arbit. Supina pars fusca; exceptis alarum remigibus, quæ albæ summitatibus fuscis, adcò ut cùm ala extenditur lineam latam transversam albam efficiant. Pectus infra torquem ad armos usque ruffum, qui color ad medium propè scapularum pertingit. Reliquum pectus & venter summus albidus, imus ad orificio usque excrementorum fuscus. Plumæ sub cauda niveæ, ad femora longiores ruffæ. Crura & pedes nigricant.

*Glaucium Bellonii* huic similis & congener Avis est, si non eadem. Differt magnitudine quâ excedit, & torque circa collum albo.

12. *Anas Sfera capite subruffo major*. An *Anas Schellent* dicta *Gesnero Aldrov.* p. 223? *Penelopi* par est, aut major; rostro 2. dig. longo, media parte ultra nares sordidè flavicante: Oculorum iridibus pulchrè flavis: Capite sordidè ruffo; collo cinereo, supina parte reliqua obscurè fusca seu nigricante. Macula lata alba in utraque ala media. Prona pars corporis ad caudam usque alba lineâ transversâ ad podicem fuscâ. Pedes obscurè flaviant, articulis & membranis digitos incertedentibus nigris. Verùm colores in hac & aliis Anatibus variant nonnihil in diversis individuis.

13. *Anas platyrhynchos pedibus luteis* Aldrov. *Platyrhyncho vulgari paulò major* est; Rostro partim fusco, partim subluteo. In toto corpore coloris ex subluteo cinerei maculæ fuscae sunt disseminatæ, densæ & exiguae in capite, majores sed rariores in collo, dorso, uropygio & cauda; multò adhuc majores & crebriores in toto dorso. Alas fuscas medias linea alba transversim secat, post quam macula cœrulea tetragona. Hanc altera linea alba excipit. Crura lutea; digitos fusca membrana conjugit.

*Avis* est fæmina, nobis nondum observata;

A. 14. *ANAS caudacuta, Havelde Wormii similis si non eadem. The Swallow-tail'd SHELDRAKE of Mr. Johnson.* Penelopes minoris magnitudine est, Rostro brevi resimo, ad basin, & extremum nigro, media parte rubro. Caput, collum, & anterior pars pectoris alba, ut & dorsum anterius usque ad scapulas, verum ponè aures fuscæ mixtura quædam habetur. Dorsum reliquum, alæ, pectus ad medium ventrem nigra; reliquus venter albus. E scapulis utrinque descendunt plumæ longæ, acuminatæ, albæ. Cauda 16 habet pennas, extimam utrinque totam albam, medias 4 rotas nigras, quarum duæ reliquis, tribus unciis longiores sunt, & valde acuminatæ; reliquæ pennæ exteriorē margine albæ, interiorē nigræ. Pedes pallidè cœrælei, cum membranis nigris.

*ANATES fluviatiles, aquas dulces præcipue frequentantes.*

A. 1. *ANAS torquata minor, Aldrov. Bischas major, The common WILD DUCK.* A. 36. ad 40 uncias pendet. Rostrum ex viridi flavum, 2  $\frac{1}{2}$  digitorum. Pedes crocei, unguis fuscæ. Mari Caput & collum summum pulchre virescunt. Succedit torquis albus, qui tamen posteriore parte à circulo deficit. A torque gula ad pectus usque castanea. In alis mediis color purpureo-cœrnleus splendens, & niger eminent. Verum reliquæ plumaginis colorum descriptionem vide in D. Willughbeii Ornithologia. Fœmina magis decolor est, neque enim caput ei viride, neque collum torquatum; verum utrumque ut & totum corpus ex albo, fusco & ruffo nigricante varium ut in anate fœmina domestica. Mediæ 4 caudæ pennæ reflectuntur in mare.

A. 2. *ANAS platyrhynchos rostro nigro & piano, Aldrov. The GADWALL, or GRAY* Magnitudine Penelopen majorem æquat superatve & ad Anatem proximè accedit. Corpore est longiusculo. Rostrum quale Anati vulgari, aut potius Querquedulae, cuius latera crocescunt, media pars nigra est, uropygium totum nigrum, Dorsum fuscum

cum fimbriis plumarum ex albo ruffis. Mentum & maxillæ albæ, maculis parvis fuscis punctatæ. Caput ex cœruleo nigricat. Inferior colli pars, superior pectoris, & scapulæ plumagine pulcherrima, ex albo & nigro varia, vestiuntur. Latera itidem lineolis & nigris pulcherimè vatiegantur. Pectus albet; ventet fordescit maculis transversis nigris. Cauda brevis alba 16 pennis composita; quarum mediae duæ supernè fuscæ. Pennæ alarum remiges fuscæ: habetur tamen macula alba in media ala, quem colorem superius terminat color è nigro purpurâ nitens: in tertio vestitricum ordine maculæ ruffæ seu rubræ sparsæ. Hac ergo velut characteristica nota hæc Avis ab aliis omnibus sui generis distinguitur, quod tres in singulis alis, aliam super aliam diversi coloris maculas habeat, albam, nigram, ruffam.

*Anas muscaria*, Muggent Gesnero Aldrov. lib. 19. cap. 41. Sic dicitur quod muscas supra aquam volantes capter. Magnitudo & figura fere domesticæ Anatis. Rostrum latum, simum, croceum. Color plumarum per totum fere corpus varius est, ex nigricante, charopo, albo & mustellino alicubi mixtus, alibi distinctus. Pedes flavent: digitii membranis nigricantibus coherent. Collum tam supina quam prona parte ~~est~~ est quibus diximus colotibus. Vertex magis nigricat; qui color etiam in alis habetur.

A. 3. *Penelope* Aldrov. An *Anas fistularis?* The WIGEON, or WHEWER, or WHIM. Anate minor est, Caput & collum superius rubra, maculis nigricantibus contorta. Vertex rostrum versus dilutiore est colore, ex ruffo seu luteo albido, quæ hujus generis nota characteristica est. Pectoris partem superiorem, ut & latera ad alas usque, vinaceus color pulcherrimus ornat cum lineolis transversis nigris creberrimis. Pennæ scapulares, ut & laterales sub alis, lineolis transversis nigris & albis perbellè pinguntur. Medium dorsum fuscum; Caudæ tegetes nigræ. Caudæ pennæ 4 fuscæ. In alis macula est pulcherrima cœrulea. Rostrum plumbeum, ungue nigro. Pedes ex fulvo albicante cœrulescunt. Avis est frequentissima ad mare & in palustribus.

A. 4. *Phascan* fortè Gesnero D. Johnson. Eboracensisibus, *The WIGEON*. Præcedentem magnitudine æquat, estque corpore depresso aut plano. *Caput & colum* totum pallidè fusca, saturationibus seu nigricantibus maculis triangularibus crebris ræpersa. *Corpus totum, alæ, cauda* obscurè brunnea seu fusca ; marginibus peniarum extremis dilutioribus, & interdum albentibus. Alas lineæ duæ transversæ albæ distinguunt, spatio intermedio incano. *Pectus & latera* dorso sunt dilutiora, obscurioribus maculis varia. *Venter* niveus, nisi quod sub cauda maculæ aliquot obscuræ appareant. *Rostrum & Pedes* subcœrulei.

A. 5. *Anas caudacuta* Aldrov. *The SEA-PHEASANT, or CRACKER*. *Corpus* huic gracile, *collum longiusculum*, *Penelopes vulgaris* magnitudo, *Rostrum ex cœruleo & nigro varium*. *Color capitinis ferrugineus* : retro aures leviore purpurâ tingitur ; ab occipite utrinque linea alba incipit quæ ad gulam tendit. *Prona pars tota, collum, pectus, venter, adusque excrementorum exitum alba, exinde nigra sub caudâ*. *Corpus supinum variis & pulcherrimis coloribus ornatur, verum caudæ pennæ mediæ 2½ digitis productiores reliquis huic pro descriptione & ab aliis omnibus distinctione sufficiunt.*

In maritimis Suffolciæ circa *Aldburgh*, & *Orford* observavimus. Habetur & alibi in Anglia.

A. 6. *Querquedula secunda* Aldrov. *The COMMON TEAL*. Minima est in Anatino genere (excepta sequente) 12 unciarum pondere. *Rostrum latum, nigrum, sursum nonnihil reflexum*. *Caput summum & superior pars colli rufa seu spadicea*. Ab oculis utrinque ad occiput ductus obscurè viridis, ferici instar splendens. *Ductus hosce sub occipitio macula nigra intercedit*. Sub oculis linea alba ruffum colorem à viridi separat. Quæ collum inferius, dorsum summum & latera sub alis vestiunt, transversis lineolis nigris & albis alternis undulatis perbellè pinguntur. *Prolobi regio* in nonnullis flavescit maculis nigris velut squamis pulcherrimè picta. *Pectus & venter* canescunt. Sub uropygio macula nigra. *Alæ fuscæ* ; medias macula viridis illustrat. *Cauda 16 pennis*

pennis composita ; tota fusca. *Pedes* pallidè fuscis, membrana digitos connectens nigricat. *Carne* est in Anatino genere laudatissima.

7. *ANAS CIRCA* Gesn. *The SUMMER TEAL*. Omnium Anatum minima est. *Rostrum* ei nigricat ; tota pars supina fusco-cinerea : in *Dorso* pennarum extremitates albicant : in *albis* linea uncialis partim atra, partim smaragdina, utrinque alba. In *cauda* pennæ acuminantur. Tota pars prona ex albo dilute flavescente videtur. In *pediore* tamen & ima ventris parte maculæ majusculæ nigricantes dense admiscentur. *Crura* dilute cœrulescunt ; membranæ digitos intercedentes nigræ.

8. *QUERQUEDULA prima* Aldrov. p. 209. varia Gesner. *Garganey* Mediolanensis, *Kernel* Argentoratensis Gesner. Figura corporis Querquedulae simillima est : Nota maximè characteristica quâ ab illa differt est linea lata alba ab interiore oculi angulo utrinque inchoata, & supra oculos aurèsque ad medium ferè cervicis extensa. *Vertebræ* autem ferè rotas nigricat, cùm in Querquedula nostrata vulgari obscurè ruffa sit.

9. *ANAS fe'a* 16 seu *minor* 4 Schwenckf. *Anas* parva mustelaris, *Vulpana*, magnam habet cum Querquedula similitudinem. *Capitis* rubore mustelam seu *Vulpem* refert.

### Anates exoticæ Brasilienses.

1. *ANAS sylvestris Brasiliensis magnitudine Anseris.* Marcgr. *Rostro* est nigro, *pedibus* fuscis : Tota nigra exceptis alarum principiis, quæ alba, nigredini tamen illi viridis color transplendet. *Crista* in capite nigra, & supra rostri exortum massa corrugata nigra. *Circum oculos* cutis rubra.

2. *Anas sylvestris Brasiliensis.* APECA APOA dicta. Marcgr. Magnitudo Anseris octimestris ; figura Anatis nostratis, à qua differt, 1. Quod major sit. 2. *Rostrum* nigrum & in extremitate aduncum. 3. Super *Rostrum* cristam gerat carneam, latam & rotundam ferè, nigram,

ma-

maculis albis insignitam. 4. Pedum & crurum color non ruber, sed è cinereo fuscus. In summitate rostri foramen transversum magnitudine Pisi obtinet, ab utroque latere conspicuum, quod vice narium fungitur. Reperitur passim ad fluvios.

3. IPECA GUACU *Brasiliensium* Pisoni. Domestica est, ob carnis bonitatem celebris. Mole & figurâ corporis media est inter Anterem & Anatem. *Rostrum* ab extremo ad medium usque flavescit: mox rubra macula medianam partem capitis egregiè tingit. Totum corpus à vertice ad caudam albo colore. *Cygni* instar nitescit. *Pedibus* est Anatinis è flavo rubescentibus. Pinguescit æquè in terra ac in stagnis.

4. *Anas sylvestris Brasiliensis* MAR ECA dicta, prima Marcgr. *Rostrum* ei Anatinum fuscum, ad cujus exortum in utroque latere macula rubra. *Caput* superne grisei coloris, ad latera sub oculis album. Totum pectus & infimus venter ligni querni secti colorem obscurè æmulatur punctulis nigris variegati. *Crura* & *pedes* nigri. *Cauda* grisea. *Ale* in exortu ex griseo subfuscans coloris. *Remiges* autem in uno latere ejusdem coloris, in altero dilutè brunnescentis (qualis in pedibus esse solet) medio autem coloris viridis transplendentis cum fimbria nigra.

5. *Anas sylvestris Brasiliensis* MAR ECA dicta, secunda Marcgr. Èdem cum præcedente magnitudine & figurâ; *Rostro* nigro splendente. *Supina* parte tota Umbræ coloris cum fusco mixti. Sub gutture albicat. Ante oculum utrumque macula parva rotunda, ex albo flavescens: *Pectus* & *venter* obscurè grisea aureo admixto. *Cauda* nigra. *Alarum* pennæ fuscae quibus viride transplendet; & mediæ alarum pennæ eximia viriditate & cœruleo in fusco transplendent, hîc & undam nigram habent; extremitas autem Remigum tota alba est. *Crura* & *pedes* insigniter rubri seu miniati coloris sunt. Affata avis apprehensa manus & linteamina tingit colore miniaceo sanguineo.

## Anates Domesticæ.

1. **A**NAS *domestica vulgaris*, The Common TAME DUCK. Notior est quām ut descriptione indigeat, Anser minor, gallinæ suppar, corpore depresso, dorso lato, latōque rostro, cruribus brevibus, retroversus dispositis: colorum mira in diversis avibus varietate; ut in aliis domesticis evenit. *Mas* plumas in uropygio erectas & caput versūs reflexas habet.

2. **A**NAS *domestica rostro aduncō*, The HOOK BILL'D DUCK. Anati domesticæ vulgari specie externa simillima est, *rostro* præcipuè differt quod latum est in extremo, longius paulò quām in vulgari, deorsum modicè inflexum. *Caput* quoque minus & gracilius esse videtur.

3. **A**NAS *moschata*, an *Cairina Aldrov.*? Maxima est in hoc genere omnium quas hactenus vidimus. Color tum maris tum fœminæ plerunque ex nigro purpurascens. Circa *nares* & *oculos* rubras habet carunculas. *Vocem* edit raucam, & vix audibilem nisi quando irascitur. Anglice, The MUSCOVY DUCK dicitur, non quod è Muscovia huc translata esset, sed quod satis validum moschi odorem spiret.

Quærendum annon Anas *Cayrina Aldrov.* Anas *Libyca Bellonii*, & Anas *Indica Gesneri* una eademque Avis species sint, mihi sanè eadem videntur.



APPENDIX

# APPENDIX.



N Joan. Nieuhoffi Itinerario Avium sequentium nomina inventio: Descriptiones apud Autorem vide, nec enim ego linguam Belgicam calleo, unde nec Aves locis suis disponere valeo.

1. *Vogel Rubus.* Passeris circiter magnitudine est; rostro & pedibus cœruleis, dorso & caudâ rubrâ; alis versicoloribus ex albo & nigro; capite summo viridi. Duæ è caudâ exeunt pennæ prælongæ ad instar Avium nonnullarum Paradisearum.

2. *Guira:* Hanc duûm generum esse scribit. [Apud Brasilienses plurimæ occurunt Aves *Guira* dictæ. Hanc ergo vocem lingua Brasilica avem significare existimo] Una inquit species pectus (*buck*) habet rubrum, altera caudam cœruleam cum longa in ea penna.

3. *Poero,* Avicula est longa, non tamen crassa, à summo rostro ad extremam caudam plus spithamam extensa. Rostrum longum & *Kromachtigh.* Cauda ut in *Guira.* Plumis vestitur cœrulecentibus flavo notatis. Pedes parvi. Formicis vicitat.

4. *Wijtbekken.* Leucorhynchi.

5. *Strantloopers.* Gallinaginis minoris species sunt.

6. *Quackels.*

7. *Riis vogels.*

8. *Penne vogels.*

9. *Lory.* Psittaci species esse videtur.

10. *Geel-vinck:* Chloris.

11. *Riis mossen,*

12. *Reigers.* i. e. *Ardeæ.*  
 13. *Springers.*  
 14. *Bosch-duiven.* i. e. *Columba sylvatica.*  
 15. *Gout-vinken:* *Aurivittis* seu *Carduelis.*
- 

*Aves exoticæ q arum titulos è Musei Leydensis Catalogo transcriptis & ad nos misit  
D. TANCREDO ROBINSON.*

**A** *Vicula Zeylanica,* mellivora, lucida ; *rostro nigro longissimo, adunco, acuto ; Tuttica Zeylanensibus à sono. Mus. Leyd. nigra est, pectore flavo.*

---- *Eadem rostro breviori.*

*Avis Zeylanicu eleganti crocato colore, Kakakurulla Zeylanensibus, i. e. Avis crocea. Mus. Leyd.*

*Avicula Zeylanica morteni prænuncians, Polidscha Zeylanensibus à sono. Mus. Leyd.*

*Avicula Africana mellivora, floribus Leonuri insidens. Mus. Leyd.*

---

*Du Tertre Hist. Nat. Ins Antill,*

**PICA** Antillarum. *Rostro est & pedibus rubris ; collo cœruleo torque alba cincto ; Crista seu galea in capite alba lineis nigris striata, quæ à rostro usque ad dorsum extenditur, quod plumis leucophæis [tannees] vestitur ad uropygium, quod totum flavum est : undè exit crista magna, 8 pennis composita, cœruleis albo striatis, quarum duæ reliquas 8 aut 10, pollicum longitudine excedunt. Alarum vestitrices leucophææ sunt nigris lineolis radiatæ ; rem ges cœruleo & viridi coloribus mixtis variæ sunt. Vox Picarum Europæarum similis.*

Idem Du Tertre aliarum etiam Avium meminit, quas *Grives*, i. e. *Turdos pilares*, & *Gros becs*, i. e. *Coccothraustes*, & *Bout de petun* à voce dictas, nominat, item

*Serinos,*

Serinos, & Chandonneret dicitas, & Luscinias. Hæc postrema satis similis est Regula Europæo, verum paulo major, Etque sola ex Avibus Indicis (inquit) mihi visis, quæ canora est. Muscis & Araneis parvis vicitat.

FREGATA avis Rochefortio & Du Tertre *la Fregate*: Rabiborcado & Raboforcado Hispanis & Lusitanis dicitur, quod caudam bifurcam sartoriæ forcipis instar nunc explicat, nunc contrahit: *Fregate* Gallis ob perniciatem volatilis. *Corpus* gallinaceo non majus, verum ventriculus valde carnosus est. *Marium* plumæ omnes nigrae velut Corvi. *Collum* mediocris longitudinis, *Caput* parvum; *Oculi* nigri, acie acutissima & Aquilina. *Rostrum* satis grande, totum nigruin, *mandibulæ* superiore uncī instar recurvâ. *Pedes* breves; *ungues* Vulturini, toti nigri: *Ale* magnitudinis fere prodigiosæ, ut spatiū extensarum ab extremo ad extremum commensuratum septem interdum vel octo pedum sit: nec sine causa, cum enim ad trecentas interdum leucas à litoribus in altum provolent, tanta alarum longitudo eis omnino necessaria est. A ramis arborum in quibus resident difficulter admodum se levant: verum cum temel in sublime evoluntur, motu placido absque ulla ferè alarum agitatione aërem tranantes videoas velut fluxu aut lapsu quodam, ad instar Milvorum. Mas sub gutture palearia dependentia habet admodum Galli gallinacei, si ætate proiectior sit: Juniores enim iis carent.

Si quando pluviae impetus aut ventorum vis urgeat, nubes ipsas transcendunt & in medium aëris regionem emituntur, donec præ altitudine visibus humanis le subducent, & inconspicuae evadant.

In insulas quasdam parvas desertas secundum oram Americanam vesperi se recipiunt, ut internoctu quiescant, ibidem etiam nidificant & pariunt, ut aliæ multæ Aves marinæ.

Memorabile in primis est quod de hac Ave refert Ovidius. Cum Oceano intumescente & ad Panamam appellente ingens piscium Sardorum acervus & alluvies simul congregatur, infinita Onocrotalorum multitudo aërem obnubilat, qui in mare se modò præcipites dant ut piscesculos

sciculos suffurentur, modò in aëra se sublevant, ut illis tutò velcantur, idque toties repetunt, donec diræ suæ fami satis parentaverint. Sed quòd adhuc magis ad spectatorum voluptatem facit, hoc est; quòd aliæ ibidem grandes admodum & rapacissimæ volucres dimorentur, *Caudæ infuscatae* dictæ, quæ, mirum est, quām Onocrotalos hosce persequantur, ut coacti etiam sint piscium prædam evomere, quām Aves rapacissimæ illæ priusquam in mare decidat inter volandum in aëre piscantur. *Joan. Faber Notis in Animalia Novæ Hispaniæ Nard. Anton. Recchi*; ex Oviedo.

---

*Aves suspectæ, nimisque breviter aut minus accuratè descriptæ.*

*E. Joan. Eusebii Nierembergii Historiæ Naturæ Libro Decimo: quarum descriptiones è Franc. Hernandez Tractatu de Avibus Mexicanis mutuatae sunt.*

#### PASSER STULTUS.

**M**ERUIT famam & nomen insignis stultitia Avis hujus mitissimæ. Manus apprehendentium non fugit aut timet; admiratur solum aut stupet. Vescitur pisciculis; Voce imitatur *Graculum*, magnitudine *Picam*, formâ *Larum*, præter frontis partem rostro adjacentem, quæ cinerea est; palmipes, rostro tres uncias longo, tenui, obrotundo, rectoque, sed propè extremum non-nihil incurvo: pedibus quoque, qui cæterorum palmipedum sunt, & cruribus nigris; pupillâ etiam nigrâ, & membrana oculos tegente in ambitu cinerea. Marina Avis est. Cæterum mansuetudo avium insulæ *Cerneæ* nobilis est: appellantibus nautis perinde insident ac arboribus. Eadem securitas venatus est; accedunt ac subeunt manus.

In

*In insulis desertis ant incolarum vacuis non mirum est Aves homines primū conspectos non formidare, verū audacter accedere, iisdemque fortasse insidere, ut aliis animalibus solent; antequam capt.e, c.es.e, fugat.e aut aliquo modo territ.e fuerint.*

*Avis ovimagna* Daie dicta. Quadam ovorum ac puliorum insolentiā celebris est avis *Daie* dicta, non excēdens Coluimbam, & commode edulis. Nidum cādā ac pedibus excavat, locis fabulosis, quatuor altum spithamas, ubi ponit ova per imbrē Anserinis majora, & pugnum ferē lata, *Tapun* incolis dicta, quinquagena plurāve & citra ullum albumen, crassæ ac pinguis substantiæ; quæ assa coctāve boni sunt & pinguis alimenri, frixa verò crassi malique & concoctu difficultis. Mirum est [imò falsum] Avem tam parvam tantæ magnitudinis ova tamque numerosa edere; eadem tam profunda in scrobe collocare, & collocata citra incubantis opem atque temporem excludi; & statim evolare pullos inde exclusos.

*Historia isthæc proculdubio fabulosa & falsa est. Quamvis enim Aves nonnullæ maxima ova pariunt, ut v. g. Alkæ, Lomwiæ, Anates Arcticæ, &c. Hujusmodi tamen unum duntaxat, non plura ova ponunt antequam incubent: nec ullam in rerum natura avem dari existimo cuius ova albumine careant. Cùm albumen præcipua ovi pars sit, quodque primum fœtui alimentum subministrat.*

*Guitguit* Avis corvipeta. Magnam audaciam exiguum capit corpusculum. Minima hæc Avicula Regulo similis est, viridi colore & suavi nutrimento. Ea est Naturæ rerum vis, ut hæc tantula avis, ac ferē nulla audeat persequi corvorum examina, eō que cogat ubilibet latitare, & se adversus eam in Arundinetis tueri.

*Hæc ficta esse puto ad imitationem eorum, quæ à Veteribus de Regulo traduntur, quod sci. magno animo cum Aquila pugnare audeat.*

*Mia.* In insula Cuba præcipue gregatim volitat hoc genus, & Rysi (cujus seminis maximus est apud eas gentes proventus atque usus) devastat sata. Multi & grati nutrimenti est, & facilis concoctionis, colorisque fulvi; cui

cui est in colli postica parte, (dictu admirandum, & nulli alii Animali concessum) ventriculus, primūmque receptaculum nutrimenti.

*Credat Iudeus Apella.*

*Tuputa* seu *Avis verminosa*. A cantu nomen usurpatum. *Viva tota* farcitur vermis: hos pro carne habet, his singula membrā imbuta: præter hos & pellem nihil carneum. Cutem non perforant densis exornatam penes. Versatur in carectis & herbosis locis: proceras arbores non amat. *Phasianus* formā similis est, sed minor.

*Gnaviter impudens fuerit oportet qui mendacium hoc confinxit; nimis stolidus aut insanus est qui credit.*

*Anates* quædam Asiaticæ sunt, non immerito *Cornicines* dictæ, ita voce cornuum sonum imitantur, quæ inflare solent per dispositos equos iter facientium duces. *Est ea Avis*, quamvis inermis, audax & strenua: quam etiam malos dæmones terrere Turcis persuasum est: cerè libertatis adeò retinens, ut etiam per totam triennium in corte nostra, facultatem nacta libertatem sagittæ anteponat, sequeque naturales & suetos alveos volatu repetat: *Buseq. Epist. 1.*

*Piton* avicula suavissimi cantus Hispaniolam incolit: Tribus vocibus canit; sci. penè indivisibilibus modulis variat cantum, ab acuta voce in alias subito delapsa, ut videatur unà omnes edere unoque spiritu multos formare tonos, tanquam si à tribus gutturibus formarentur. *Anonymous MS.* testatus se audivisse: censet nullam avem jucundioris cantus, & oppidò præstare Lusciniæ inexplicabili propemodum dulcedine. Negat à se visam hanc avem, solum auditam; sed aliorum testimonio pulcherrimam prodit, & mirifice colorum ornatu variegatam.

*Achilalactli* S. Avis piscium vibratrix. *Columbina* est magnitudine & forma; rostro nigro acuminato, 3 dig. longo & pro corporis proportione crasso. Caput cristâ ornatur, è colore cyaneo in nigrum tendente, longaque. Venter candidis tegitur plumis & collum torque candenii insignitur. Alæ infernè albescunt, sed postremis partibus videntur fuscae, & candidantibus maculis interstinctæ,

superne

superne verò, sicut reliquum corpus sunt cyaneæ, extremitatibus nigræ & albis undique respersa maculis. Cauda partim nigra, partim cyanea est, sed inaculis albis per intervalla quoque variata. Crura rubea sunt, pedes divisi in digitos, in atros ungues desinentes: Oculi nigri & iris candescens. Advena est Mexicanæ regioni, & circa aquas versatur estque edulis.

*Quetzaltototl* seu Avis plumarum. Cristata est, & Pavoninis magna ex parte ornata plumis, Picæ Columbae magnitudine, rostro incurvo luteoque, & pedibus nonnihil luteis. Cauda *Tzamatl* plumis prælongis vestita, atque virentibus nitidisque & Pavonini coloris, Iridis foliis formæ similibus, opertisque aliis superne nigricantibus, inferne verò & qua parte Pavoninas attingunt, quæ in medio sunt inclinantibus in virorem, quasi cavente natura meliorum pulchritudini. Crista constat plumis pulcherrimis atque splendentibus: Pectus collumque inferne rubris & micantibus, ac Pavoninis superne; qualibus etiam tegitur dorsum, necnon eæ partes quæ subter alas sunt, interque crura sed dilutis, exilibus & molibus. Plumæ alarum prælongæ sunt, virore tinctæ diluto, & in acumen desinentes. Pennæ regentes humeros virescunt, sed subter sunt nigræ: quæ verò alas interstant nonnihil incurvæ sunt ac unguium colore.

Plumæ hujus avis magni æstimator, atque ipsi auro præferuntur, longiores ad cristas, reliquæ ad imagines texendas, vivunt in Provincia. *Tecolotlani* ultra *Quauhtemallum* versus *Honduras*, ubi magna curâ cavetur, nè quisquam eas occidat, tantum licet eas deplumare, nec omnibus sed tantum dominis: sunt enim opimorum prædiorum loco, & transeunt adhæredes.

Arbores excavare dicuntur, & in earum cavitatibus educare sobolem, loca aprica amant, nec cicurari volunt. Vox Psittacorum non dissimilis. Quæ de harum Avium venatione ex Hernandez adfert, vide apud ipsum vel in Append. ad Ornithologiam *D. Willoughby*.

*Turdì Chiappæ, Passeræ Fabri* dicti. Nigri sunt, solum in pectore & capite rubri, Fructu Querciuo duntaxat

taxat vescuntur. Rostro perforant corticem Pinuum, glandem singulis foraminibus aptissimè accommodant, ut manu extrahi nequeat: sic omnem Pinum ornatissimè cingunt glandibus incisis. Mox pedibus hærentes cortici, tundunt rostro glandem & vorant.

*Hoitlalloth* seu Avis longa, à rostri acumine ad caudæ usque exortum, (quæ spithamam quoque longa est) do- drantem prolixa conspicitur. Rostrum desuper nigrum, subitus verò cinereum, quadrantem longum, ac mediocriter crassum, cauda virens sed Pavonino splendore. Plumæ totius corporis ex albo fulvescunt, fulvescuntque propè caudam è nigro; sed quæ corporis vestiunt supe- riora nigræ sunt, maculis candicantibus conspersæ. Hu- mipeta avis est ac modici volatūs, sed adeo pernici cursu ut equorum velocissimorum agilitatem longè excedat.

*Coturnices Indicae* Colin dictæ, nostratisbus sunt similes, et si ad Perdicum species sint sine dubio referendæ. Multæ genera apud Novos Hispanos reperiuntur: nonnulla fusca & cristata, quæ *Quauhtzonencolin* nuncupant, me- diocris magnitudinis; alia fusca quoque sed cristarum expertiæ & paulò minora; alia omnium maxima ful- vâque, sed capite albo & nigro colore variato, extremis verò alis dorsisque candardibus: pedes verò & rostrum nigra sunt. Omnia bono gratoque constant alimento, malè habentibus convenienti.

*Coylozque* seu *Celi sonalis*, Coturnicibus Europæis si- milis est, magnitudine, cantu, nutrimento, volatu ac moribus, sed diverso colore, qui superne est ex fulvo candidoque commixtus, inferne verò tantum fulvus; et si verticem ac collum nigricantes albæque plumæ occu- pent, & tænias ab utroque latere, adeoque à collo ad utrumque oculum constituant atque efforment. Oculi sunt atri ac fulva crura. Indigena avis est, campestri- bûque locis, velut & nostras, frequens, & simili etiam alimento.

*Cakuicuiltic* seu Coturnicis simulacrum, Coturnicis quoque nostræ species est. albis nigris coccineisque va- riata plumis & protractis desuper potius lineis quam circumscriptis maculis, subter verò potius maculis fre- quentibus

quentibus quam lineis. Pedes cruraque cyanea sunt; sed cantu, magnitudine, moribus ceterisque cunctis praecedenti omnino similis.

*Cenotzqui* seu Avis nivis evocatrix, Antequam ningat, clamitat, postea filet. Color illustris variegatione: pectore fulvus, crure pallidus, ungue niger, ventre permixtus notis candidis & atris; subtus alas candidus & cinereus; super, fulvus, niger; paulo post, cinereus infectus atris maculis: sub finem conspersus albis notis; caudâ subtus niger & candidus, super fulvo nigrove maculatus. Caput nigrum est, fasciâ cinctum cincratâ: rostrum parvum, cinereum supernè atque inferne; sed supernè juxta exortum lineâ ambitur luteâ. Oculi nigri sunt, & palpebræ pallentes. Montana colit, & veris tempore educat sibolem. Ita convolvit huc & illuc caput, contorto in varias partes collo, ut eodem situ immota perstans cuncta circumspiciat.

Est & alia ejusdem avis species, quibusdam distans colorum varietatibus, capite siquidem fulvo & cinereo collo partim nigro & partim candescente: sunt qui *Loceto* vocant.

*Picicitli* post imbræ appetet, ignobilitate quadam originis nobilis. Nesciunt adhuc Tetzcoquenses ubi foeti-  
ficer. Muta est; educat domi, brevi perit. Palato & Stomacho est acceptabilis. Cinerea tora est, nisi capite ac collo, quorum utrumque nigrum: solùm oculos nigros candens ambit macula.

*Cencontlatoli*, i.e. Quadrangentæ linguæ, Avis polyglotta, totius melodiae regina, cujuscunque vocis arbitra. Sturnum non superat, subtus albescit, superiore parte fusca, pullis & carentibus intermixtus pennis, maximè ad caudam & caput, quod imagine quodam coronæ argenteæ redimitur. In caveis ad blanditias auditus, ad ostentum & miraculum naturæ asservatur. Vincit omnes suavitate & arbitrio gutturis, nullius non imitatur, nullius non superat: Philomelæ longissime præstat. Contenta est quovis cibo: calidas amat regiones, temperatas tolerat.

Hic similis est *Tzampán*; Aliqui suspicantur fœminam esse ejusdem speciei, paribus magnitudine, cantu, forma, nisi quoddum plumæ infernæ albæ sunt, cinereæ & nigræ; supernæ pullæ, nigræ, albæ.

---

### Noctuæ Mexicanæ Francisci Hernandez.

**N**octua Mexicana Chichictli dicta. Plumis induta Gallinæ magnitudine esse videtur; pedibus pennatis, plumis universi corporis fulvo, albo, fusco, nigroque resperfis colore.

*Tibaltecatl*, Bubo Mexicanus non auritus, Noctuæ magnitudine & colore.

*Paxqua*, Genus Oti aut Asionis à nostrate formâ diverit.

*Tecolotl*, Hubonis auriti species, nigro ac fusco colore varia; iridibus ocalorum aureis.

*Tlalquatli* seu Noctua junceti. Rostro est nigro brevi, pedibus impenie hirsutis, unguibus atris; plumis circa rostrum albis; alis infernæ nigris admixto fulvo, supernæ nigris pallidis candidis ac fulvis, eisque & cauda longis. Tacet parvo sit corpore, pluinis vestita Gallinæ magnitudine esse videtur.

*Tlalquipatli*, Oti species parva, rostro resimo ac brevi; plumis fuscis & cinereis; pedibus hirsutis, unguibus atris; iride Oculorum ex luteo rubescente.

*Chicuatli* seu Noctua canora, Rusticulæ par est, rostro longo, tenui ac pullo, ac tæniis juxta utrumque oculum luteis & incurvis. Inferiora corporis pallida sunt, nigris quibusdam plumis circa collum interseriis: irides oculorum luteæ; cætera ex fulvo, fusco, & cinereo permixta. In montibus versatur; inque caveis enutrita hand vulgariter garrit. *Rostrum longum & tenue Avem rapacem non esse arguit,*

*Aves rapaces diurnæ Francisci Hernandez.*

**Yzquauhtli**, Aquilæ cristatæ genus, Arietis magnitudine, rostro ad radicem luteo, deinde nigro, pedibus pallidis; ventre colore è nigro & candido permixto; collo, dorso & cauda nigris aut fuscis. Ferocium Animalium audaciam imitatur, & cicutata si irritetur levè de causa aggreditur & involat hominem ipsum; mitescit tamen & ad aucupium facilè institui posset.

**Tlacoquauhtli**, seu Aquila virgæ, Asturis est magnitudine, colore fusco & cinereo.

**Tlaquaubtli**, Aquilæ genus mediocris magnitudinis supera corporis parte fulva & subnigra, prona pallidiore & subfulva, occipitio pallido. An Balbusardus seu Halixetus, an vero Milvus æruginosus? Pedes lutei.

**Hoinetli** seu Avis incurva, Asturis est magnitudine; rostro nigro, cruribus luteis; caudâ spithamam longâ, latâque: colore subtus candente, fulvo variato; superne, atro fusco fulvo atque candente: iride oculorum lutea.

**Tlotli**, Falco columbarius Nebbi dictus, niger totus excepto rostro & pedibus quæ lutea.

**Ceceto**, Tinnunculi species à voce nomen habens.

**Cozcacoauhtli**, sive Regina Aurarum Nieremberg. Accedit magnitudine gnesiis Aquilis. Corpus universum præter eas partes quæ juxta pectus sunt ex nigro purpurascens, fulvum est ac pullum: alæ subtus circa exortum nigræ, cætera cinereæ, desuper verò mixtim fulvæ, nigræ, & nonnihil in purpureum vergentes. Crura rubra, & unci unguies. Rostrum Psittaci, extremo album, cætera sanguineum. Irides oculorum fulvæ, palpebrae rubeæ, frons sanguineus ac plicatilibus rugis torva, quas nonnunquam explicat; pilis quibusdam retorridis rarisque vestita. Cauda Aquilæ, infernè cinerea, foris nigra. Anguibus, muribus & lacertis vicitat, sed morticinis maximè & humano stercore. Vi incredibili obsistit ventis, contranititürque adversantibus, iisdem sedibus perstans immobilis.

*Garagay*, magnitudine est Milvii, capite & extremitate alarum albis; brevis volatūs, Crocodilorum & Testudinum ovis infesta, quas sub arena in ripis fluminum condita odoratur & vorat. Auræ eam inseguuntur ut potiantur furto: aliâs solivaga est.

---

*Corvini generis Aves Franc Hernandez.*

**H**Oitzanatl, Monedula persimilis, corporis tamen magnitudine eas vincit, & prolixitate caudæ vel Picis pari: colore etiam nigro in cœruleum splendentem vidente à nostratis differt.

Tzanahoei seu Pica Mexicana Hern. Picæ nostrati similis esset ni tota nigricaret, præter caput & collum, quæ inclinant in fulvum colorem. Vox querula est velut minorum Sturnorum.

---

*Pici Martii, Mexicanii Fr. Hernandez.*

**PICI** Martii genus maximum *Ocononetl* dictum.

*Quatotomomi*, Picus imbrifetus Nieremb. Upupæ magnitudine, nigro fuscóque colore varia. Caput parvum est, & rubeis coniectum plumis, cristâ etiam rubrâ, sed supernè nigra, tres uncias longâ insignitum. Rostrum candens & internè brevius. Alterutro collî latere fascia candida descendit ad pectus. Pedes lividi.

*Tlau! que chultototl*, Merulâ major, rostro longo nigro; mandibula inferiore multo breviore; vertice & toto pene collo desuper rubeo; alis ac dorso nigris, lineis transversis albis variis, infernis cunctis cinereis. Pici Martii species esse dicitur Hernandez, quia sci. arbores perforat.

*Quzuhtotopotli*, Sturno par, colore nigro sed candidis plumis maculato, præcipue circa caudam, postremas alarum partes, rostrum ac ventrem, qui totus penè candidus est. Mitescit alitürque domi.

*Ococolin,*

*Ococolin*, *Sturni* magnitudine, colore nigro & luteo pulchre variatum, circa dorsum verò crura ac ventrem cinereo: rostro longo & acuto.

*Quauhchochopitli* seu *Avicula* ligna excavans *Coturnis* forma & magnitudine est, plumis nigris aut pullis, lineis albis transversis distinctis, ventre pectore minii colore.

*Tzinitzian*, *Avis* est parva, *Columbae* pene par, plumis multorum colorum vestita, quibus imagines mirae subtilitatis texunt indigenæ. Rostrum breve est, incurvum & pallidum; columbinum caput ac collum, sed quæ plumis virentibus ac nitidis vestiantur. Pectus ventérque rubra sunt, præter ejus partem quæ est proxima caudæ, illa enim cyaneo carentique promiscue tingitur colore: cauda supernè virente, ac nigro infernè: Alæ partim albo, & partim subnigro: iris oculi luteo, sed in coccineum vergente; crura ac pedes cinereo. Vivit in calidis juxta Oceanum Australem.

### Gallinaceæ Mexicanæ Franc. Hernandez.

*Hachalacametl*, Color fuscus: pectus ad caudam usque è candido in pullum vergens; pectus rostrumq; cyanea: Magnitudo *Gallinæ vulgaris* ut & vox: *Avis* est admodum strepera & clamora, unde nomen quod *Avis* vociferans & clamitans significat.

*Hoactzin* altera, fusca avis est, *Gallinæ* magnitudine, *Calandræ* cantu, quæ homine conspecto ridere aut eum irridere videtur.

*Hoactzin* à vocis sonitu simili dicta, *Gallinæ* Indicæ ferè magnitudine est, rostro incurvo; pedibus fuscis, unguibus nigris; pectore candido in luteum inclinante; alis caudâque maculatis, per intervalla pollicis, colore candido & pallenti: dorso ac suprema parte colli fulvis, in fuscum inclinantibus, ut & temporibus ad rostrum & oculos. Cristam gestat concinhatam è plurimis è candido in pallidum colorem vergentibus, sed dorso earum nigro. Vescitur anguis. Vivit in calidis regionibus. Usus

in medicina vide apud Autorem; nobis enim suspecti sunt.

---

*Aves Columbae magnitudine Mexicanæ*  
Franc. Hernandez.

**Y**Acatopil seu Rostrum fudis, Columbi sylvestris magnitudine; rostro 4 dig. longo, tenui, pallido, sed magna ex parte nigro, pedibus luteis, &c. Gallinulæ species esse videtur. Color universi corporis, alarum & caudæ ex albo, cinereo, nigro & fusco permixtus est; sed inferiora simul cum cauda album magis participant colorem. Circa aquas versatur.

**N**exton, Columbae est magnitudine, corpore magna ex parte cinereo, ventre ac collo infernè albo, rostro & pedibus nigris.

**N**extototl, Columba paulò minor, coloris supernè cinerei ventre collóque infernè albis; rostro & pedibus nigris.

**O**cotzinitzcan, Avis est formosa, Columbae magnitudine, rostro 2 circiter dig. longo nigro; capite & pectori purpleis, necnon pedibus, reliquo vero corpore ex luteo virescenti. Alibi colorem cyaneum ei attribuit, partim etiam album & cinereum, pedes nigros; nisi forte alia avis sit ejusdem nominis.

**T**lanquiquiztotol seu Passer sibilans, Columbae par, rostro crasso, acuminato & nigro; iri oculorum lutea; Alis caudâque albo & nigro colore variatis, tœnia nigra à rostro ad extreum usque pectus procedente; alis tamen anteriùs luteis, ac universim reliquo corpore pallenti; pedibus fuscis.

**Q**uaxexoclototl, Magnitudo circiter Columbae; Rostrum magnum, nigrum, latum, & in acumen contortum tendens; vertice est cyaneo, & reliquo corpore cyaneo pallido, viridéque promiscuè ac nigro.

**M**omot. Irides oculorum coccineæ: Rostrum incurvum subnigrum 3. penè digit, longum, acuminatum, infernè

infernè brevius, supernè serratum. Pedes fusci. Caput cœruleum & pavoninum, reliqui corporis color virens. Rarum est caudæ inesse pennam unicam cæteris longiorrem, & quæ extrema tantum parte plumata sit. *Hoc equidem rarum, imò ut suspicor falsum: nam in caudis avium omnes pennæ geminae sunt, b. e. ejusdem generis binæ, hinc indè una. Verùm & in Spitzbergensibus.* Frid. Martens bujusmodi avem invenio.

---

*Aves quedam exoticae & anomaliæ, Turdi magnitudine, Marcgravii & Franc. Hernández.*

1. **PITANGA GUACU** *Brasilienibus* Marcgr.  
Bemtere Lusitanis. Magnitudo Sturni : Rostrum crassum latum pyramidale, acuminatum, digito longius. Caput depresso & latiusculum ; collum breve, quod sedens contrahit. Pedes fusci. Supina pars tota è fusco nigricat ; prona flavet. Superiùs tamen juxta caput corollam quasi monachicam habet albi coloris. Quædam ex his Avibus in summo capite maculam habent flavam.

2. **ATINGA guacu muci** *Brasil.* Marcgr. Turdelæ fere magnitudine est : Capite satis crasso ; Rostro paullum adunco, coloris ex viridi & flavo mixti : pedibus cinereis ; caudâ longissimâ 9 digitorum. Pars corporis supina tota cum alis & cauda brunna seu fuliginea : Extremæ caudæ pennæ albæ ad semidigitum ; prona pars cinerea. In capite longiusculas habet pennas, quas instar duorum cornuum surrigere potest.

3. **MATUITUI** *Brasil.* Marcgr. Magnitudo Sturni : Collum breve, ut & crura. Rostrum rectum, forte, colore cinnabarino. Supina pars tota fusca pallidè flavo maculata : Guttur flavum, reliqua pars prona alba, fusco punctulata. Crura obscurè cinerascunt.

4. **GUIRA PUNGA** *Brasilienibus* Marcgr. Turdo major est. Columbae ferè par Rostro. digitali, lato, nigro; ore ampio; oculorum irides cœrulescunt. Sub gurgite & in collo inferiori multas digitum longas propendentes particulas carneas nigras habet, figura spiculi hastæ. Caput cibarum brunnum: Totum collum, pectus, venter, dorsum, & crura superiora leucophæis pennis teguntur, quibus, potissimum in dorso, nigricantes admixtæ, ac versus caudam etiam virentes. Alæ nigricant, virentibus pennis admixtis. Crura nigricant. Alta voce clamat ut ejus sonus è longinquo audiatur. Cauda tres digitos longa.

5. **GUIRARU** *Nbeengeta Brasilienfis* Marcgr. Merulæ aquaticæ magnitudine est, aut paulò major: Rostrum rectum, nigrum, compressum: irides oculorum sapphirini. Pedes nigri. Totum caput, collum, pectus, venter infimus albogrisei: Dorum leucophæum seu cinereum. A rostro utrinque per oculos ad occiput macula oblonga nigra tendit. Alæ & cauda nigra. Caudæ pennarum extremitates albæ, & superius quoque albis plumis tegitur.

6. **A COLCHICHI** Mexicanorum seu *Sturnus Mexicanus humeris rubeis* Hernand. Magnitudine, colore & forma Sturnis pares sunt, cum quibus etiam versantur. Humeri ætate in rubeum mutantur colorem. Sata in quibus conseruare videntur & depopulantur; quo à Sturnis differunt. In caveis inclusæ & edoctæ humanas voces imitantur, & lepidè garriunt. Ex humerorum fubeorum arguento Hispani *Commendadores* vocant.

7. **TZANATL TOTL**. Hernand. Dodrantem longa, Sturni magnitudine; Rostro brevi crasso, cinereo, & nonnihil incurvo: prona parte rubescente, capite nigro, reliquo corpore pennis nigris, albis & alicubi fulvis vario.

8. **MOCOTOTL** seu Avis quæ alitur herba vocata *Mocoquilt* Hernand. Sturni magnitudo: color fuscus, pallido permixtus. Pectus candet, & cauda subtus. Pedes rostrumque coccinea sunt. Canora est.

9. **Chierototl.** Turdo viscivoro forma & magnitudine similis est, sed cinerea tota præter ventrem postremum & mentum, quæ candidant.

10. **Tet-**

10. *Tetzonpan.* Sturni magnitudine, cinereo, candido, pullo atque nigro colore.

11. *Xochitotol,* ventre, pectore & cauda magna ex parte croceis, non sine mixtura coloris atri; alis subtus cinereis, supernè atro & carenti colore permixtis; reliquo corpore cum capite atro. Hanc *cap. 28.* Coztototl seu Avem luteam vocat, & magnitudinem Passeris Canarii ei attribuit, erat enim juvenis seu pullus. Eandem etiam eodem nomine *cap. 140.* describere videtur. Quæ autem hoc nomine *cap. 143.* describitur, tota erat lutea, capite nigra maculâ insignito; caudâque ac alis pallido ac nigro variatis colore, forte tamen præcedentibus eadem.

12. *Xochitotol* altera seu Avis florida, Passeri forma & magnitudine similis est, verum colore differt, plumis partim pallidis, partim nigricantibus, partim albis, ac partim fuscis. Nidum construit ex arborum ramis pendulum.

13. *Toxcacoztic,* Turdi viscivori magnitudine & forma, sed collo & pectore luteis; & fascia ejusdem coloris frontem præcincta.

14. *Chiantotol,* Sturni magnitudine, rostro mediocris & non nihil incurvo, cinereo, pectore & ventre carenti, sed subfuscis plumis maculato, dorso subfusco & cyaneo; alis vero candidis atque subnigris; capite cinereo lineâ candidâ juxta alterutrum oculum insignito.

15. *Nopaltencol,* Sturno paulò major, rostro subincurvo & prolixo; iri oculorum rubea; subfusca & cinerea tota.

16. *Caxcaxtotol.* Avis est tota cyanea subnigra que, Sturni majoris longitudine, oculorum iride lutea; Rostro longiusculo, acuto, nigro.

17. *Abuatotol,* Sturni magnitudine & forma, sed alis & cauda ceruleis, cætero corpore è subalbido vergente in fuscum.

18. *Pitzmatol,* Sturni genus dodrante paulò majus, lato rostro nigróque.

19. *Tayubquitotol,* Sturni magnitudine, viridi, cyaneo fulvo & cinereo colore; duabus pennis ab extrema cauda pendentibus, cæteris longioribus, scapis aliquous-

que nudis, extremis cyaneis & nigris pilis vestitis. *Guira guainumbi* Marcgravii esse videtur.

20. *Cochitototl* seu Avis florida, rostro tenui acuminato, paulum incurvo, tūpina parte promītuē cinerea ac nigra, cæteris luteis : pedibus cinereis. An *Xochitorotl* eadem?

21. *Izcanatl*, Colore, naturâ, moribus, voce *Sturnum* refert : A rostro extremo ad caudæ exortum spithamizæ, ad extremam caudam dodrantalis. Pennæ nigræ, Pavonino colore splendentes. Rostrum tres digitos longum nigrum, ut & pedes.

22. *Tequix quiacatzanatl* seu *Sturnus salsus*, quia juxta lacus salsos verlatur. *Sturno* forma, magnitudine, colore persimilis est, cauda tamen prolixiore & paulò majori corpore. Pennæ omnes, exceptis quæ collum & caput vestiunt (nam hæ pullæ sunt) nigrescunt cum quodam fulgore. Gregatim volant, & sata devastant.

23. *Tolocatzanatl* seu *Sturnus junceti*. *Sturno* similis est forma & magnitudine, sed paulò minor : totus niger, si caput excipias, quod fuscum est.

24. *Txonyayaubi* tertia, Magnitudo *Sturni* : color subtus albus fulvissime, desuper verò ex viridi pallens. Dextræ alæ exortus candet, fulvescitque ; caput verò parrim virescit ac pallet, partim nigricat. Pars collis dextra nigra est, sed rostrum atrum. Pedes ex albo rubescunt.

25. *Txamazcatl*, *Sturni* est magnitudine, rostro mediocri & nonnihil incurvo, cinereo, iride oculorum cœrulea ; plumis è fusco virescentibus, pectore luteo, ventre albo, & subfuscis pedibus.

26. *Elcoztototl*, Merulæ par, luteo pectore ac ventre, caudâ nigra ; alis ex nigro fulvescentibus ; supinâ parte cinereâ rostro subnigro longiusculo, oculorum iridibus luteis, pedibus cinereis.

27. *Caczlototl* seu Avis *Corvina*, *Sturno* nostrati par est, universo corpore è nigro vergente in cœruleum, atro rostro, cauda prolixa, & iri ex luteo rubescente.

28. *Chilcoquipaltototl*, Magnitudo Merulæ ; rostrum è cyaneo nigrum, crura virescunt. Caput nigricat, venter pectusque pallescunt, reliquum verò corpus luteo viridique

Viridique, necnon albo & nigro variatur colore.

29. *Chiltototl*, Præcedenti similis est rostro, magnitudine, colorum varietate, necnon moribus, sed capite coccineo & fulvis pedibus.

30. *Tlaubtototl*. Merulæ est magnitudine, tota rubra, nigris quibusdam plumis alis interfertis.

31. *Xotlapech*, Magnitudo Sturno minor: supernè fulva, infernè cyanea: Crista in capite fulva sed humilior, cujus extrema versus rostrum pennæ subnigræ atque subrectæ excipiunt.

32. *Olotototl*. Præcedenti par, sed tota pene cyanea pavoninâque, quamvis circa collum albi rnbrique coloris sit.

33. *Yacatlil* seu Avis rostri nigri, à nigro rostro, digitum transversum longo, & è crassiuscula origine desinente in acumen, nomen accepit.

34. *Ceoan* seu Avis nivea, Turdo viscivoro paulo major, imitatione humani sermonis nobilis, circa pectus ventrem & alarum exortum fulvescens, permixtis ad caudam cinereis plumis. Alarum extrema caudâque ipsa infernè cinerea sunt: supernè torum corpus è fusco nigrescit. Rostrum (quod exile) & pedes fulvescunt.

*Aviculæ Mexicanæ Franc. Hernandez Passeris  
vel forma & magnitudine, vel magnitudine  
sola.*

**C**hiltototl, Passeris est magnitudine & forma; differt rostro nigro, incurvo, tenuiore & longiore; ventre & capite flammeis, caudâque nigra.

*Chiltototl* altera, nigra avis est, sed alba quoad pectus atque humeros, fronte (qua parte depilis est) nigrâ maculâ insignis.

*Chiltototl* quarta, tota fere coccinea est, sed nigris juxta alas admixtis, maculis verò prope oculos cendentibus.

*Elotototl* seu Avis spicæ Mayzii, Magnitudo Passeris, Rostrum breve, tenue, color partim albus, partim pullus partim cyaneus atque cinereus.

*Elotototl* secunda, sesquidodrantem longa est, & variis coloribus decorata, & cristam quandam in pectore habet ex nigris pennis compositam.

*Elotototl* tertia, Coturnicis est magnitudine, rostro ut Rusticulæ longo, Colore totius corporis albo, fulvo & nigro promiscue.

*Elotototl* quarta Cardueli pene par est, sed albo aut cyaneo colore, caudâque pene tota nigra. Pro *Elotototl* quarta aliam avem delcribit, cap. 227.

*Hoauhtototl*, Passere nostrare major est, pedibus ac rostro fuscis, cæteris coccineis, demptis capite, dorso ac alis dilutè viridibus.

*Hocxtototl* seu Avis saligna, quia circa Salices versatur, Passeris parvi est magnitudine, fusca & pallida promiscuè tota ; rostro & pedibus nigris.

*Tzcuicuil* seu Oculus pictus, Passeris est magnitudine & colore, superioribus tamen plumis magis fulvis : non nullæ circa caput & rostrum nigrescunt, aliæ ex albo pallescunt.

*Xexixouhqui* seu Avis cyaneorum pedum, *Andario Hispanis* Tolerani regni incolis dicto persimilis, sed caput candicantibus tegitur plumis, nec rostrum adeò est in superiorem partem contortum.

*Nlamotototl* seu Avis vetula, Passeri similis, paulò tamen major, cauda infernè fulvescente, ventre albo, petoréque & collo infernè ruffis.

*Xochiltototl* altera seu Avis florida Passeris forma & magnitudine est, variat tamen plumarum colore quæ partim pallent, partim nigricant, partim albæ sunt, ac partim quoque fulcæ. Nidum construit ex arborum ramis pendulum, Hanc ob nomen commune inter Sturnos etiam recensuimus.

*Teoauhtototl*, Passeris magnitudo ; rostrum breve, pronæ partis color albus in luteum vergens, supinæ cyaneus, alarum niger.

*Txamatzcatl tototl*, Passeris magnitudine ac voce, colore subtus pallente, circa alas verò & caudam albo, partibus circa oculos cendentibus, quod nomen significat, Rostrum ac pedes cyanei.

*Nochtototl*, Passeri par & similis, sed caput, mentum, & desuper exortus ipse caudæ coccineo colore tingitur; reliquum corpus magna ex parte fusco, alias verò nigro atque candente.

*Quauheilni*, Passeris magnitudine, rostro unciali tenui nigro, collo & ventre cendentibus, reliquo corpore promiscue albo fusco & nigro.

*Tlatchinoltototl*, Passeri nostrati magnitudine forma & colore ferè similis.

*Yohualtototl*, Passeri pene par; avis nocturna dicitur, vel quoniam noctu victimum quærunt, vel quod nigra tota sit, paulisper vergens in fulvum, iride tamen & inferiore rostro è luteo rubescitibus.

*Ayo quantototl tilitic*, Passere major, rostro parvo fusco ac nigro, reliqui corporis colore è luteo vergente in candidum.

*Xtezcacatototl*, Passeris est magnitudine, variata tamen cinereo, fusco & nigro colore.

*Ayo quantotetl*, Præcedenti magnitudine par, luteo, nigro, subalbidóque colore varia.

*Tatac*, Magnitudo Passeris, supina parte tota cinerea, alba, & è nigro in cinereum tendens: collo & pectore è luteo rubescitibus, ventre albo, femoribus albis & cinereis; pedibus è fusco virescentibus; lineis albis & incurvis superne circundantibus oculos.

*Coltotl*, Magnitudine eadem, ut & forma atque aliquatenus etiam colore Passeris. Canora est, & voce Carduelim imitatur, describitur pleniùs, cap. 20.

*Aviculæ Mexicanæ Fr. Hernandez Carduelis magnitudine, nonnullæ etiam forma; cum aliis Aviculis minimis.*

**M**lacatototl seu Avicula germinis Mayzii, quod ei insidere solet, ventre pallente, alis & cauda inferne cinereis, reliquo corpore nigro, pennis tamen candentibus intersertis.

Cocoztli, Avicula lutea Carduelis cantu & magnitudine, verum è luteo in fuscum inclinans colorem.

Quatoztli, Carduele minor, pullo ac nigro colore conspersa, sed postremo corpore & circa caput pallente. Est & alia cognominis avis longe diversa.

Techiētli, seu avis se scalpens ad arundines, Carduele paulò minor est, desuper è fusco virescens, subtus verò ex albo pallescens. Pedibus rubris, rostro brevi, acuto, supernè nigro, infernè albo, plenius describitur apud Hernandez. cap. 110.

Tlapalchichi seu confricatrix rubra, Cardueli par, mille coloribus visu jucundis varia, cœruleo, viridi, rubeo, flammeo: Rostro brevi crassissimo, supernè nigrante, albicante inferne.

Cocochatl, Carduele paulo major, luteo albóque & fulvo colore variata, ac maculâ juxta alterutrum oculum insignis; in mare majore.

Cocoztlon, Carduelis magnitudine, luteis cyaneisque pennis varia.

Techiētli, præcedenti pene par, sed cinereo & fusco varians colore.

Cacatototl, Acanthidi par est, infernis omnibus candidis, supernis verò subnigris atque subfulvis: pedibus cinereis.

Axoyitototl, Magnitudo Carduelis; Color inferne subalbidus, supernè subfuscus & luteus. Crura ex luteo rubescunt, cristaque quam capite gestat.

*Xompantototl*, Cardueli pene par; Colore albo, purpureo, luteo, cendentique distinguitur.

*Cuicuitzcatototl*, Præcedente major. Inferna coccinea sunt, capitis superior pars fulva; reliquum corpus cyaneo, candido atque subnigro distinguitur colore.

*Chiltototl* Carduele paulò major, tota ferè coccinea, sed nigris juxta alas admixtis plumis; maculis propè oculos cendentibus; rostro parvo ac nigro. Superius ponitur ob nominis identitatem inter Passerinas.

*Xiquipiltototl*, Avicula est minima, nigra macula rostrum collumque conspersa, cætera cyaneo cinereoque tincta colore. Canora est.

*Quauhchichil*, seu Avicula capitis rubri, *Hoitzitzillin* paulò major est, infra candens, supernè è fusco virescens: capite coccineis ornato plumis, femoribus nigris: rostro & pedibus atris. *cap. 17. & 170* eandem describit.

*Tozcacoztli* mas, seu gutturis pallidi. Cardueli pene par, pedibus ex albo rubescientibus, rostro brevi, tenui, acuminato, supernè nigro, inferne pedibus concolore. Inferna corporis lutea sunt, superna partim lutea, partim cyanea: Alæ infernè cinereæ, supernè ex fusco paleientes. Fascia nigra ab ortu rostri per uitrumque oculum ad pectus usque procedit.

*Coztototl* seu Avis lutea, fusco, nigro, cinereo & luteo colore varia est. Canora est, ac colorem in nigrum candidum & luteum mutare vicissim solet. Aliam sub hoc nomine describit luteam totam, sed capite nigrâ macula insignito, caudâque & alis pallido nigroque variatis.

*Tzitziquilotl*, Avis est fusci coloris dilutioris, quæ imbris decidentibus appariere solet & exultare, pedibus longis nigris, collo tenui & longo, rostro prolixo nigroque.

*Tlaquilotototl* seu picta avis. Pulcherrimis coloribus, luteo, coccineo, viridi, purpureo variatur. Pedibus est cinereis, oculorum iridibus luteis.

*Tlaughtototl* seu Avis coccinea; Iisdem variatur colorum differentiis, sed paulò minore constat corpore.

*Coyoltototl*, Avis est mediocris, rostro crassiusculo brevi, eodemque & cruribus fuscis, pectore & ventre coccineis, reliquo corpore subrubro & nigrescente,

*Tlapal:*

*Tlapaltototl*, Cardueli par aut paulò minor; rostro tenui, iride oculorum lutea, alis caudâque è nigro rubescentibus, & reliquo corpore coccineo.

*Chachavatototl*, Carduele paulò major, pedibus fuscis, rostro parvo & nigro, infernis partibus luteis, reliquis verò cœruleo, nigro atque cinereo colore variatis.

*Chichiltototl*, Magnitudine est præcedentis, infernis tamen partibus rubeis, supernis verò cinereis & nigris, sed in purpureum colorem vergentibus rostro paulò acutiore & longiore.

*Xolotlapecb*, Passeris pene magnitudine, infernè lutea, fusca verò supernè.

*Caquantototl*, Magnitudo Passeris, color cinereus, sed extrema cauda lutea, & ab extremis alarum pennis, coccineis quibusdam filamentis dependentibus parvo capite cristato, rostróque parvo.

### ISPIDÆ.

*Ispida Mexicana maxima Tolcoetli dicta*, Tres circiter Spithamas longa est, ventre ac pectore albo, sed fuscis quibusdam undulato pennis; alis desuper fulvo candide & cœruleo variantibus colore. Pilium rapina vivit.

*Axoquen*, Avis est ictūs satis noxii, cinereo, luteo, ac fulvo colore varia, rostro nigro acutóque & 8 uncias longo, collo verò duas spithamas, ac pelle laxius dependente cavo; cauda verò sesquidrantem prolixa, ac productis cruribus. Hæc Avis quidem aquatica est & piscivora, verum ad Alcyonum genus minimè pertinet, ut vult Fr. Hernandez.

*Acaca caboaetli* Ispidæ etiam species est, (cujus descriptionem integrā alibi damus) Anate fera paulo minor, collo & rostro spithamiso, &c.

*Huxoconauhtli*. Hujus generis Avem vide inter Aves terrestres rostris oblongis aquas frequentantes piscivoras.

*Quapachtototl*, i.e. Avis tulva, à colore alarum, collis ac capitis dicta. Æmula risus humani est, atque idcirco inauspicati ominis infamiâ Indis infensa: Octo uncias longa,

longa, ac totidem cauda. Rostrum è cyaneo nigrum, longiusculum & incurvum: Oculorum irides albæ. Petrus cinereum, ac indè ad caudam usque venter niger: Cauda ex nigro fulvescens. Caro non ingrata.

*Anates Mexicanæ FRANCISCI  
HERNANDEZ.*

**M**etzcanauhtli, Anatidomesticæ par est, & iisdem variata coloribus. Vivit circa Mexicanam paludem.

Ecatototl seu Avis venti, Anate domestica paulò minor est, Rostro atro, tenui, subtereti, propè extrema contorto, plumis infernè candidis, superne vero juxta femora fulvis: capite nigro & cristato, sed ab occipitio tæniæ candicantes utrinque procedunt ad oculos, quorum irides luteæ. Alæ subtus cinereæ, supernè verd fuscæ, nigrae atque albæ. Ex figura Rostri ad Mergos potius quam Anates pertinere videtur.

Ecatototl altera, Præcedentis fæmina est, eique similis, sed crista majori, orbiculari, & coronæ modo eminenti, paululūmque alba. Differt etiam coloribus, ut in hoc genere fieri solet.

Colcanauhtlicioatl, Anatis sylvestris genus est, supernè fusca. infernè alba; cruribus pallidè rubentibus; rostro supernè nigro, infernè & ad latera fulvo.

Concanauhtli, Anatis magnæ genus Lavanco Hispanico similis.

Yacatexotli, Anas fera lacustris, domesticæ magnitudine, rostro lato, supernè cyaneo (quod & nomen significat) supina corporis parte fulva, prona ex argenteo nigricante, alis subtus cinereis, supernè nigris.

Tzitzihoa inas Anati nostræ caudacutæ Phasianus, marinus dictæ, eadem avis esse videtur.

Toltecolochtl seu Metzcanabachtli i.e. Avis lunaris. Hanc Avem Clangulam esse, Quattr' ochii Italisch dictam, maculae candidæ inter oculos & rostrum, reliquaque descrip-  
tio suadet. Q. an Primæ eadem sit?

Tzony-

*Tzonyayaubjui & Tztaetzonyayaubqui*, Magnitudine domesticæ Anatæ pene par ; Rostro lato, supernè cyaneo, juxta extreum seu ligulâ maculâ albâ distincto ; pedibus etiam cœruleis. Corpus albo fulvōque variat colore ; capite est crasso, colore Pavonino, vertice nigriore.

*Xalcuani* seu Avis arenam deglutiens, Anatæ domestica paulò minor est. Rostro supernè livente, infernè nigro, modicè lato ; cruribus pullis : supina corporis & alarum parte virenti, candido, nigro, & fusco coloribus variâ ; pronâ candidâ : tænia viridi ab occipitio ad oculos ducta ; pectore fulvo cum lineis candidis transversis.

*Colcanauhtli* seu Anas Coturnicum Mexicanarum colore, Magnitudine est mediocri, rostro lato & nigro, fulvis pedibus : cætero corpore albo, fulvo, nigrōque, & cinereo colore vario.

*Nepapantototl*, Rostro est in acutum quadantenus desinente, quo ab Anatino genere differt. Nullum (inquit) est genus coloris alias Anates ornare solitum, quod huic soli non contingat ; unde nomen.

*Tztaetzonyayaubqui* seu Avis variæ capitis, Rostro est nigro, mediocriter lato ; universo pene corpore canden-  
ti, nigro atque cinereo, sed circa collum & caput purpu-  
reo, albo, cyaneo, viridi, & ad Solis reperclusus lapi-  
dis aut vestis heliotropiæ instar vario atque pavonino.  
Pedes rubri, ad natatum solum non ad incessum compa-  
rati, ut quæ extremo adhærent corpori ut in colymbis.  
Lacui Mexicano advena est.

*Yacapatlahoac* seu Avis lati rostri. Anatæ domestica paulò minor est, pedibus & rostro inferna parte ex pallido rubescente ; superna in ambitu ex fusco rubescit, circa extreum ex fulvo nigrescit. Corpus universum tegitur pennis semicirculos quosdam imitantibus, fulvis, ni-  
gris & candidis, ventre tamen omnino fulvo. Alæ super-  
nè partim albæ, partim virides splendentes, maximam partem fuscæ, subtus albicant.

*Tempatlahoac*, Anas fera Domesticæ magnitudine, unde idem apud Indos nomen usurpavit. Rostro est lato & longo, undique nigrante, pedibus ex pallido rubentibus ; collo & capite viridibus purpureis, & nigro colore splen-  
dentibus

tibus, prout varie objiciuntur luci : itis pallida ; pectus candens, reliquum corpus inferne fulvum, & binis maculis juxta caudam utrinque carentibus insignitum ; supernè vero semicirculis quibusdam in ambitu ex albo fuscis intus è nigro viridibus. Alæ initio cyaneæ sunt, mox candidæ, tandem virides, extremo vero altero latere fulvæ, altero viridi splendentia,

*Opipixan*, Rostro est subrubro, pedibus fulvo & canden-  
ti colore variatis, reliquo corpore cinereo & nigro.

*Quipach canaubtli*, Rostro est lato, eoque ut & pedi-  
bus cœruleis : Capite, collo, pectore ac ventre fulvo ;  
cauda brevi, alba & nigra : alis cum dorso è fusco ful-  
vōque transversis tæniis variatis.

*Querquedula latirostra Mexicana Atapalcatl dicta*, Colo-  
re est candente & fulvo, rostro latissimo ; cætera Quer-  
quedulae vulgari similis.

*Chilcanaubtli* seu Avis *Chilli* colore, Querquedulae spe-  
cies est, paulò minor vulgari, rostro latiore, angustiore  
tamen quam præcedens : colore totius corporis fulvo,  
alarum tamen vario ex cœruleo, candido & nigro vires-  
cente.

*Tacapitzahoac* seu Avis rostri mucronati eadem esse  
videtur cum Colymbo nostrate minore.

*Xomotl*, Dorso est & alis desuper nigris, pectore fusco.  
Cristatum iracundia facit. Pennas ejus *Indi* vestibus suis  
intexunt.

### Aves aquatice MEXICANÆ fissipedes Franc. Hernandez.

I. **C**OMALTECATL, Avis est lacustris, Columbæ  
sylvestris magnitudine, pedibus rubescensibus tri-  
dactylis, digitis longis : Rostro palmum longo, tenui,  
acuto, nigro : plumis universi corporis carentibus ; su-  
perna parte capitinis nigra ; alis superne inferneque nigro  
colore variatis,

N

*Chocho*

2. *Chochopitli*, Corlito i. e. Arquatæ persimilis, sesquispithamam longa, à summo rostro ad extremam caudam; rostro palmari, ad exortum virente, extremo nigro: Candardibus tegitur pennis, insertis tamen circa alas quibusdam fuscis: quas cum collo & capite albas nigrisque petiis fortitur.

3. *Chiquali* seu *Noctua*; cap. 168. sub *Chiqualotl* nomine andem paulò aliter describit. Rusticulæ nostrati par, rostro longo, tenui & pullo, ac tæniis juxta utrumque oculum luteis & incurvis: inferiora corporis pallida sunt, nigris quibusdam plumis circa collum intersertis. Iris lutea ac nigri oculi: cætera ex fulvo, fusco, & cinereo permixta.

4. *Raca cintli* seu Rostrum spicæ Maizii, Ternos circiter dodrantes longa est, viuentibus cruribus, capite & ventre cyaneis, sed vergentibus in purpureum, alis promiscue fulvis nigrisque; oculis luteis, ac rostro, sed in coccineum propè exortum vergente, quod 3 pæne dig. longum est: anteriore capitinis parte ut in Fulicis & Gallinulis, quarum species est.

5. *Tobual quichili*, seu Caput Chilli nocturnum, salforum lacuum alumna, Sturni fere magnitudine; capite parvo; collo tenui longo; rostro longo luteo; cruribus itidem & pedum digitis longis cinereis; unguibus luteis. Ab exortu rostri assurgit corona tricuspidis, è luteo rubescens; & ab interiore alarum parte bini aculei contorti seu incurvi. Gallinulæ species est Marcgr. descripta.

6. *Xochitenacatl* tertia. Avis (inquit) lacustris est, sesquispithamam longa si rostrum excipias, quod 8 pæne uncias est prolixum, ac tres latum, ferratum coccineum juxta extremitatem: circa alias vero partes cyaneum & ex albo pallescens, sed singulis pæne momentis (quod fide pæne cert) mutans colorem. cætera vide, nam Picam Brasiliacam Toucan dictum describere videtur: quamvis alibi de ea loquatur ut de Ave sibi non conspecta.

7. *Acolin* seu *Coturnix aquatica* à magnitudine pari dicta, Avis est fusca; Rostro prolixo & curvo in inferiora, pedibus longis. Juxta aquarum summitatem currit celeriter, nunquam ferè volat; ad lacum Mexicanum. Ali-

*bi Acolin* Sturno magnitudine parem facit; pedibus ex viridi palecentibus, in digitos 4 prolixiores divisis. Cui Rostrum luteum, tenue, mucronatum, pro corporis proportione longiusculum: irides oculorum fulvæ, caput parvum. Inferna corporis candida sunt, lateribus fusco maculatis colore: superna verd & cauda, quæ breviuscula est, fulva sunt, & maculis nigricantibus distincta, & candidis lineis quasvis pennis circumambientibus, ejusdemque coloris punctis nonnunquam conspersis. Caput mira colorum varietate micat, cuius medium atra linea secat, ac velut cinereæ aliæ latera, maculæ verd parvæ & candentes canthos externos. Collum pectusque cinerea sunt. Mexicanus lacus indigena est.

8. *Hoætli* seu Avis sicca, Gallinæ magnitudine, ternas spithamas à rostri acumine ad caudam postremam longa est. Crura prolixa pedem, Rostrum cum uncia trientem, pollicem crassum, superne nigrum, ad latera pallens, inferne nigrum & subfuscum. Oculi magni, iis lutea, palpebræ rubræ: Vertex niger, crista etiam nigra insignis. Collum, venter, corpulque universum cardet; sed cauda cinerea est, velut & desuper alæ. nam inferne sunt albidiiores. Superiores alarum partes vitore quodam splendent. Dorsum etsi candidis tegatur plumis, pennis râmen nigris in virentem splendorem inclinantibus vestiri solet. Albâ fasciâ circumcingitur caput à rostrâ exortu ad oculos usque procedente. Pedes & crura palecent. Lacus Mexicanus advena est, & piscium captura viicitat, & gravem vocem edit.

9. *Amacozque* seu Avis rubescens colli: palustris est, Turturi nostrati magnitudine par: Pedibus in digitos fissis, ex albo rubescens, nigris unguibus: rostro mediocriter longo exili & nigro; iridibus oculorum rubris. Pectoris, ventris & alarum inferna alba sunt, sed cauda (quæ mediocrem magnitudinem nanciscitur) fulvo & nigro colore est inspersa. At collum pectusque torques bini, minimi fere digitii distantes intervallo, nigrique cingunt, quarum anterior undequaque circuit, posterior superna deficit ac disparer parte. Ex utroque latere maculæ binæ candentes, pari amplitudine supra oculum

versus collum, illud ferè attingentes discurrent. Superna corporis, adeoque ipsa cauda albo, nigro, fulvóque sunt colore; aliae verò desuper fulvo & fulso. Indigena est & lacus mexicani alumna: vescitur insectis & pīciculis. Caro edulis est, sed qualis aliarum Avium aquaticarum. Vehementius peritrepit quam pro corporis ratione.

## CATALOGUS

### Avium JAMAYCENSIMUM

*Quas, cum in Insula illa commoraretur, observavit & descripsit Eruditissimus Amicus noster & totius Historiae Naturalis scientissimus D. HANSIUS SLOANE, additis earum quæ in præcedenti Synopsi desiderantur descriptionibus contractis ex ejusdem Schedis manuscriptis.*

1.  **ULTURI** affinis Brasiliensis, Urubu Marcgr. pag. 207. Tzopilotl sive Aura Hernandez quoad descript. *The Carrion-Crow*, nostratis colonis.
2. **Tinnunculus** sive **Cenchrus**, eive valde similis **Accipiter**. *The Kestrel, or Stannel.*
3. **Guira querea** Marcgr. **Caprimulgi** species. *A Wood-Owl, or Goat-Sucker.* Nostrates à sono quem edunt hoc genus Aves, *Churn-Owls*, eas vocant. *Sylvas frequentant tamen in Jamayca quam in Anglia, præsertim montosas.*
4. **Caprimulgus** seu **Noctua sylvatica** Jamayicensis minor. *The small Wood-Owl.* Insigni nota ab aliis hujus generis avibus differt, quod nares, velut tubuli quidam, ad  $\frac{1}{8}$  digitii altitudinem supra rostro superficiem extent. Parva admodum avis est, à summo rostro ad extremam caudam septem non plus digitis longa, ab alarum extensorum terminis decem lata. Figurâ capitis, ore & rostro, cum

cum Caprimulgo convenit. Supinæ ut & pronæ partis color varius è xerampelino, cano & nigro, alis tamen & caudâ dilutioribus

5. Psittacus maximus cyanc-croceus Aldrov. lib. 11. pag. 663. Ararauna Brasiliensibus Mircgr. Premier espece d'Arras Rochefort. *The great Macaw.*

6. Psittacus minor macrouros totus viridis Aldrov. Ornithol. lib. 11 pag. 678. Tui species secunda, Tuia-putejuba Marcgr. *The green Parakeet.* Psittacus viridis, alarum costa superna rubente Aldrov. lib. 11. pag. 668. *The most common green Parrot, with the ridge of the Wing red. This is brought from the Spanish Main frequently into Jamaica.*

7. Psittacus leucophcephalus Aldrov. lib. 11. p. 670. Papagayos verdesque tienen un flueco de plumas blancas en el nascimento delpico de Oviedo, lib. 14. cap. 4. E Cuba & Hispaniola in Jamaicam inferuntur.

8. Psittacus minor, collo miniaceo. An Xaxabes Oviedi? *The common Parrot of Jamaica.* Collo est rubente, aliás undique viridis : cauda brevi lata. Articulatè loquitur.

9. Cornix nigra garrula. *A Chattering Crow, or, A Cacao-walk.* Loca montosa frequentat, Avis est garrula admodum, voce à Cornice Europæ multùm diversa : aliás nihil video in ejus descriptione quo discrepet à nostrate.

10. Pica luteo-nigra varia. *The Yellow and Black Pie.* A summo rostro ad extremos ungues novem digitos longa erat, totidem fere ad ultimam etiam caudam. Rostrum digitale, rectum, acutum, nigrum ; quo colore & pedes, & ungues imbuti. Color capitis & gulæ niger, dorsi etiam aliquatenus & caudæ : Alæ albo & nigro variæ : totum corpus reliquum pallido Aurantii colore tintum. Incessu saltorio Picam variam nostratem imitatur.

11. Picus varius medijs Jamaicensis. *The Middle-sized parti-coloured Wood-Pecker.* Longitudo 10 dig. latitudo inter extrema alarum extensarum 14. Rostrum & lingua ut in nostrate yario ; nec cauda multum dispar.

Caput fuscum seu leucophæum, vertex tamen & collum superius coccinea. Dorsum, alæ, cauda nigra lineis albis transversis varia. Gula, pectus, venter inter Aurantium & fuscum colorem amoigunt. Pedes è viridi flavicant. In sylvis passim occurunt.

12. *Picus major leucophæus seu canescens. Pluviae Avis & senex dictus. An Old Man, or Rain bird.* Ab initio rostri ad finem caudæ 18 digit. longa erat, tantundem lata inter alarum extrema. Rostrum unciâ longius, leniter incurvum, teretiusculum acuminatum, supernè nigrum, subtus albicans. Cauda dodrantalis. Caput plumagine fusca mollicellâ vestitum; dorsum & alæ paulo dilutiores: cauda nigra, apicibus pennarum albis: Mentum & gula alba, molli & vélut holosericea lanugine recta: reliqua pars prona è rubro xerampelina. Pedes è cœruleo nigricant.

Omni anni tempore in sylvis & sepibus invenitur. Voce solito clamore pluviam præsigere creditur.

A canescente lanuginosa plumagine Senes seu vetulæ dicuntur.

13. *Picus seu Pluviae avis alia canescens Senex dicta rostro longiore & rectiore. In omnibus cñm præcedente convenit præterquam rostro, quod huic rectum, dimidio digito longius, tenuius, seu gracilius, & albidius.*

14. *Ispida ex atro & albo varia. Jaguacati guacu Brasiliensis Marcgrav. An Pescheur Du Tertre. The Crab-catcher.*

15. *Gallus gallinaceus & Gallina. The common Dunghill Cock and Hen.* Per totam Americam, in calidissimis regionibus optimè se habent, adolescent & vigent.

16. *Gallo-pavo, seu Numidica avis, quibusdam Meleagris, The Turkey.* Hæc eriam Avis calidis Americæ regionibus gaudet, ibidemque mirum in modum proficit, & se multiplicat.

17. *Gallina Guinea, Veterum Meleagris, Poules Pintades Rochefort: The Guiny-Hen.* Gregatim incedunt, suntque in Savannis dictis frequentes. Earum caro optima & lautissima habetur.

18. *Pavo. The Peacock and Hen.* Hæc etiam Avis in calidis hisce regionibus non infrequens.

19. *Mitu vel Mutu alia species. Mituporanga Brasiliensis Marcgr. Tepetotol Nieremberg. Gallus Indicus alias Aldrov. A Quirizao;* quoniam ex insula Quirizao in Jamaicam illatus est.

20. *Perdix montana. The Mountain Partridge.* Longitudo à summo rostro ad extremam caudam 10 unciarum : latitudo inter alarum extensarum apices 16. Rostrum Columbino persimile. Caput parvum : Cauda duos digitos longa. Supina pars tota colore xerampelino seu purpuro rubente cupri æmulo tincta : Prona dilutior, & sub ventre albicans. Oculorum irides flavæ ; palpebrae pulchre coccineæ. Crura & pedes duos digitos longæ, & ut in Columbis rubræ.

In sylvis montosis inveniuntur, & baccis vicitant. In arboribus humilioribus nidificant, nidis è virgultis tenuioribus transversim positis constructis, quibus pilos & gossipium superimponunt, ut ova melius foveantur, & pulli mollius cubent.

21. *Columba vulgaris. The common Wild Dove, or Pigeon.* In columbariis aluntur frequentissimæ.

22. *Columba caudâ fascia fusca notatâ, velut annulo cinctâ. The Ring-tail'd Pigeon.* Quindecim uncias longa erat, viginti lata, Longitudinem ab initio rostri ad finein caudæ sumimus : latitudinem ab extremo ad extremum alarum extensarum ; qnod Lectorem semel nonuisse sufficiat, nè eadem saepius repetere cogamus. Rostrum  $\frac{3}{4}$  dig. longum, ad basin & circa nares dupliciti protuberantia elatum. Oculorum irides coccineæ. Cauda 4 aut 5 digitos longa. Corpus crassum. Caput, collum, pectus purpurascensibus plumis vestita ; venter albicantibus. Collum superius virebat ex purpura, pennis pro vario ad lucem objectu versicoloribus, & serici instar splendentibus. Dorsum & cauda pallidè cœrulea, excepta illa quam diximus fasciâ seu area transversâ nigra. Alæ fuscæ.

23. *Columba minor ventre candido. The White-bellied Dove.* Novem digitos longa erat, 16 lata. Rostrum  $\frac{3}{4}$  unciae

uncis æquabat cum totidem quot in præcedente protuberantiis. Oculorum irides albæ. Vertex & prona pars tota alba, unde nomen: supina colli è cœruleo & purpureo versicolor. Dorsum & alæ è fusco purpurascunt cum aliqua rubri tinctura: Cauda cœrulea cum linea in extremo alba. Mense Januario in Savannis seu campistribus planis inveniuntur; & in cibis commendantur.

24. *Columba minor leucocoryphos*. Goritas de Oviedo, lib. 14. cap. 2. *The Bald pate*. Longitudo huic 11. digitorum, latitudo 18. Rostrum semunciale, ad basin rubrum & protuberans, infra nares oblongas album. Vertex in adultis albus, unde nomen. Supina pars colli è cœruleo seu viridi splendente colore varia: totum præterea corpus obscurè cœruleum. Oviedo Hispaniæ communem esse scribit, ubi grandior evadit. *D. Sloane* Oenadi eandem esse suspicatur verū non respondent. Oenas enim ob verticem album insignis non est.

25. *Turtur minimus alis maculosis*: an *Turtur minimus Barbadensis*. Picuipinima Brasiliensibus *Marcgrav.* Quinque digitos longus erat, 8 latus. Rostrum semunciale, singulis ad singulas nares protuberantiis fungosis, incurvum, apice nigricante, ad basin flavum, seu mali Aurantii colore infectum. Oculorum irides dupli circulo altero flavo, altero coccineo distinctæ. Vertex cœruleus: Dorsum fusco dilutiore, alæ & cauda obscuriore colorata: Alæ autem cœruleis vel purpureis maculis notatæ. Pectus purpura diluta, & Abdomen adhuc palliore tinctum. Humi plerunque resident & victum querunt. & si quis eas excitat Perdicum more breves volatus faciunt; sicutque gregariæ.

26. An *Ear-Dove*, i.e. *Turtur auritus*. Palomas Torcas Oviedi, lib. 14. cap. 2. an *Turtur vulgaris nostras*? *Turtur auritus* dicitur, quia in alterutro colli latere maculam habet nigricantem auris quodammodo æmulam.

27. *Icterus minor* nidum suspendens. An *Jupujuba* seu *Japu* Brasiliensium *Marcgrav.* *The Watchy Picket, or Spanish Nightingale. The American Hang-nest.* Avem hanc quia ex extremis arborum surculis seu viminibus nidum suspendit, cum *Jupujuba* *Marcgrav.* specie eandem esse

esse suspicor, quamvis colores non convenient. Aves enim nonnullæ ejusdem speciei, ut v. g. *Loxie*, coloribus plurimum variant, nec diversam puto Averm *Luscinia Virginiana* capite non cristato dictam, cuius meminit D. Joan. Clayton in Epistola ad Regiam Societatem Londonensem misit, cujas exemplar extat in Philosoph. Transact. N. 206. pag. 993.

28. Monedula tota nigra. *The small Black-bird.* Longa est 12 uncias, 16 lata. Rostrum unciale, rectum, acutum, non in arcum assurgens. Cauda 5 digitos longa. Tota nigra est. absque ulla colorum diversitate.

29. Ani Brasiliensibus *Marcgr.* *The great Black-bird.* D. Sloane in hujus Avis descriptione à Marcgravio dissentit, quod digitos usitato situ tres antrosum, unicum retrorsum extensum ei attribuat.

30. Merula fusca. *The Thrush.* Longitudo septuncialis; latitudo 10 unciarum. Rostrum digitale, rectum, tertiisculum, Aurantii colore cum linea ad apicem nigra. Cauda 3 digitos longa. Supina pars tota obscurè fulca: sub mento macula alba: inferior pars colli & pectus dilutius fusca: venter albicat. Crura & pedes Aurantii coloris. Sylvas montosas frequentant, earumque caro in cibis laudatur.

31. Turdus minor cinereo albus non maculatus. *Cen-*  
*contlatolli Hernand.* *The Singing-bird, Mock-bird, or Night-*  
*ingale.* *Virginiae*, ubi frequens occurrit, colonis *The Grey Mocking Bird*, dicitur.

32. Tapera Brasiliensibus *Marcgrav.* An Hirundo apus nostras? Vencejos Oviedi, lib. 14. cap. 2. *The Black Martin, or Swift.*

33. Sitta seu Picus cinereus major, capite nigro. *A Log-*  
*gerhead.* Sex digitos longa erat, 11 lata. Rostrum nigrum, digitale, compressum, triquetrum; naribus rotundis, ad basin undique fetis nigris cinctum. Cauda  $2\frac{1}{2}$  digitos longa: Caput grande vertice nigro & velut cristato. Dorsum dilutè fuscum seu cinereum aut canescens. Alæ & cauda obscurè fuscae seu nigricantes, & ad eorum extrema lineæ transversæ albæ. Prona pars tota alba. Avis est stolida, nec hominem appropinquantem fugit

fugit aut reformidat; sed tandi moratur donec baculo percuti & occidi possit: unde *Loggerhead* nomen ei impositum.

34. Sitta seu Picus cinereus major rostro curvo. *Another sort of Logge head.* Præcedente paulò major erat: Rostrum  $\frac{3}{4}$  dig. longo, mandibula superiore media parte elatiore, recta, acuta, extremo incurva; naribus rotundis, & similibus circa basin setis. Caput & dorsum cinerea seu incana; Alæ & cauda obscurè fusca; aurantii colore secundum margines virgata. Cauda tres uncias longa. Mentum incanum, pectus & venter albida. Pedes fuscī.

35. Muscicapa Brasiliensibus Japacani dicta *Marcgr.* *The small Yellow and Brown Bird.*

36. Muscicapa è fusco & albo varia, *The small black and white Bird.* Longa 4 digitos, 7 lata. Rostrum rectum, teretiusculum supernè nigrum, infernè album,  $\frac{1}{2}$  dig. longum. Cauda lesquidigitalis. Supina pars tota colore est nigricante, lineis albis varia; prona alba cum aliqua nigri mixtura. Pedes è viridi fuscī; unguis sublutei.

37. Muscicapa è cœruleo, cinereo, fusco & luteo varia. Magnitudine præcedentem æquat aut excedit. Rostrum par, nigrum. Vertex, collum, supinum dorsum cinerea aut incana & lanuginosa: Alæ & cauda (2 dig. longa) è fusco & albo varia. Mentum & gula flava: Colli latera utrinque alba & nigra. Pectus & venter alba nigris quibusdam ad latera maculis. Pedes fuscī.

38. Muscicapa pallidè fusca. *The Worm-eater.* Quinque digitos longa erat, latitudine longitudinis circiter dupla. Rostrum semunciale, rectum, teretiusculum, acutum, pallidè fuscum. Supina pars tota dilutius fusca. Per oculum ductus obscurior: mentum etiam obscurius coloratum. Pectus & venter è nigricante & terreo colore mixta seu varia, fere ut in Alaudis nostratis. Crura 1  $\frac{1}{2}$  dig. longa.

39. Oenanthe fusco lutea minor. Quatuor digitos longa erat, duplo latior. Rostrum rectum, teretiusculum, non admodum acutum, fuscum. Caput sumnum & dorsum

dorsum luteo-fusca : Alæ & cauda fusca cum strijs aliquot albis ; cauda 1  $\frac{1}{2}$  dig. longa. Mentum, pectus, venter flauicant. Insectis vescitur.

40. Rubecula viridis elegantissima. *The Green Sparrow, or Green Humming Bird*, 4 dig. longa erat, 8 lata. Caput pro corporis proportione majuscum : Rostrum compressum, latum, mandibula inferiore rubra, superiore è fusco rubente, linea elata, rectâ secundum longitudinem ejus decurrente. Caput supinum, dorsum & alæ quatenus visui apparent, colore viridi vivido & pulcherrimo tinguntur. Sub mento macula coccinea elegans diametro semunciali. Venter è luteo albicat, pectus dilutè virescit. Pedes è fusco rubent. Digi anterioribus omnes aliquousque juncti, extimi duo ad ungues fere cohærebant : unguis longi & adunci. Plumago mollis & lanuginosa. Cauda sesquidigitum longa. È pulcherrimis quas unquam vidi Aviculis erat.

41. Guainumbi tertia species Marcgr. fortè etiam secunda ejusdem. Nam has duas aviculas specie non differre suspicor. *The long-tail'd Humming Bird*. Pennis duabus in canda prælongis Manucodiatis seu Aves Paradisi imitatur.

42. Guainumbi prima species Marcgr. *The larger Humming-Bird*.

43. Guainumbi quinta species Marcgr. *The largest or blackest Humming-Bird*.

44. Guainumbi septima species Marcgrav. *The least Humming Bird*.

45. Luscinia seu Philomela è fusco & luteo varia. *A black and yellow Bird*. Longa erat 4  $\frac{1}{4}$  dig. 8 lata. Rostrum semidigitale: acutum, nigrum. Caput è nigro fusco varium, exceptis lineolis duabus supra oculos albis. Mentum & major dorsi pars obscurè fusca. Uropygium supra caudam flavicat. Cauda ipsa & alæ supinæ obscure fuscæ, lineolis quibusdam albis ad apices virgatæ. Pectus & venter totus flavent. Crura fuscunciam longa.

46. Passer coeruleo-fuscus. *The Banana Bird*. Quinque circiter ligitos longitudinalis obtinet. Cauda fuscuncialis. Rostrum breve (1 dig. longum) crassum, subrectundum. Caput pro corpore

corporis ratione grande. Latitudo 9 uncias explet. Pedes nigri, unguiculis acutis pariter nigris armati. Dorsi pennæ ad caudam usque lanuginosæ, obscurè cœruleæ; pectoris dilutiùs cœruleascunt: Apices pennarum in ventre luteæ. Alæ & cauda è cœruleo obscuro virescunt. Arbores Bonanas dictas frequentat, unde nomen.

47. *Alia hujus species est, capite minore, coloribus etiam dilutioribus varians.*

48. *Passer niger punctis croceis notatus. The black Sparrow.* Longus erat 5 dig. 8 latus. Rostrum breve, crassum, nigrum, acutum, narium foraminibus rotundis. Cauda 2 digitorum. Tota avis nigris ad cœruleum tendentibus integrabatur pennis, maculis duntaxat nonnullis supra oculos, sub mento & cauda aurantii colore picta. Pedes longi nigri, unguiculis brevibus acutis.

49 *The Savanna-Bird.* Quatuor uncias longa erat, 7 lata. Rostrum breve, crassum, acuminatum. Vertex, supina pars colli & dorsum colore ex obscure fusco albicante & xerampelino mixto: prona pars colli seu gula & pectus dilutius fusca & ad luteum tendentia. Venter albus: pedes etiam albicabant. Alarum apices & supercilia lutea. In campestribus humi sedent & currunt Alaudarum more.

50. *Serino affinis avis è cinereo luteo & fusco varia.* Octo digitos longa erat, 12 lata. Rostrum  $\frac{1}{2}$  dig. longum, breve, crassum, superiore mandibula è cœruleo fusca, inferiore dilutiore. Caput plumagine canescere vestiebatur, dorsum è luteo fuscâ. Alæ & cauda obscurè fusca lineolis albis striata. Mentum canescens, pectus & venter lutea; sub cauda tamen alba. Pedes subcœrulei.

51. *Serino affinis, è croceo & nigro varia. A small Black and Orange-coloured Bird.* Longitudine ad 4 digitos extendebatur, 6 lata erat. Rostrum  $\frac{1}{2}$  dig. longum, latum ad basin: Cauda sesquidigitalis, Caput & collum nigra, quibus & dorsum concolor cum levi Aurantii tintura. Alæ & cauda fusca, Aurantii coloris virgis striata. Pectus & Alarum vestitrices eodem Aurantii colore tintæ. Venter albus, Pedes nigri. Formicis vesicatur. Aues

*Aves aquas frequentantes fissipedes & in aquosis  
victum querentes.*

1. **G**uiratinga Brasiliensibus Marcgr. Ardea alba major nostras. *The largest White Gaulding.*

2. Ardea cœrulea, an Ardeola Marcgr. *Cocoi* 3 Pison. *An Heron.*

3. Ardea cœruleo-nigra. *The Black or Blew Gaulding.* Longitudo sesquipedalis, latitudinis subdupla. Rostrum 2½ dig. longum, ad basin circa oculos cute viridi retum, acutum, apice nigricante, reliqua parte subcœruleum. Cristam plumarum longiorum in summo capite gestat. Collum 6 dig. longum, plumis raris vestitum, colore è cœruleo nigricante; quo & reliquo totius Avis pennæ imbuuntur, exceptis iis quæ pectori, ventri & paribus subalaribus innatentur, quæ dilutiores sunt. Crura 7 uncias longa, squamis virentibus tecta.

4. Ardea stellaris minor. *A small Bittern.* 14 digitos longa erat, 20 lata. Rostrum basin & oculos membrana lutea nuda cingit, ad nares usque extensa. Rostrum duos digitos longum, acuminatum, angulosum, mandibula superiore nigra, inferiore lutea. Collum 5 digitos longum in formam S literæ inflexum, rigidum. Cauda digitum longitudine non multum superat. Plumæ in vertice obscurè fuscæ, & apicis in modum elatæ; eodem colore imbuuntur quæ collum superius, dorsum, alas & caudam vestiunt, maculis duntaxat quibusdam albancibus & leucophæis hic illic inspersæ; quæ Mentum, collum inferius, pectus & ventrem, dilutiùs fuscæ; albo & xerampelino coloribus intermixtis. Crura 4 digitos longa, anteriùs obscurè fusca, posteriùs flava.

5. Platea incarnata, Tlauhquechul Hernandez. Aiaia Brasiliensibus, Colherado Lusitanis, Belgis *Lepelaer* Marcgr. *The American Scarlet Pelecanæ, or Spoonbill.*

6. *Pluvialis major Aldrov.* *Limosa Gesneri.* *The great Plover of Aldrovand, called here, The Curlew.*
7. *Himantopus Plinii Aldrov.* lib. 20. cap. 3c. *Long-legged.*
8. *Totanus dorso fusco, albis maculis notato.* *The Sea-Plover.* *Descriptio hujus Avis in omnibus fere excepta magnitudine Tringæ majori Europææ convenit.*
9. *Pluvialis viridis.* *Pluviers Rochefort & Du Tertre.* *Gorriones à Pardales de Oviedo.* *The Green Plover.*
10. *Pluvialis ex fusco & albo varia cauda longiore.* *The greatest Snipe.* *Magnitudine cum Arenaria nostra Sandering & Curwiller dicta convenit, quoddque postico digito careat: nec colore multum abludit, nisi quodd circulum seu torquem habeat in summo collo album, & supina pars corporis magis fusca sit. Differt caudæ longitudine digit. 3: & pedum colore albicante.*
11. *Gallinago minima ex fusco & albo varia.* *The least Snipe.* *Avis hæc à nostro Stint.* *Gallis Alauda marina dicto, Bellonio Schoenicos seu Junco, non multum differt. Magnitudo & forma eadem, nec colores admodum diversi.*
12. *Rallus aquaticus Aldrov.* *Ortygometra Bellon.* *An Gallinula chloropus altera Aldrov.* *The Water Rail.*
13. *Charadrius sive Hiaticula.* *Matuitui Brasilensibus Marcgr.* *The Sea-Lark.*
14. *Colymbus sive Podicipes minor.* *The Didapper, or Dobchick, or small Loon.*
15. *Gallinula chloropus major Aldrov.* *The most common Water-Hen, or More-Hen.*

*Aves aquis innatantes palmipedes,*

1. *Phœnicopterus, The Flamingo.*

2. *Hirundo marina minor capite albo, Passer stultus Nicemberg.* *A Noddy.*

3. *Onocrotalus* sive *Pelecanus fuscus*. *Grand-gosier Rochefort & Du Tertre. The Pelecane.*

4. *Avis Tropicorum. Festu in cul ou l'Oiseau de Tropic du Tertre. The Tropic Bird.*

5. *Anseri Bassano affinis Avis cinereo-alba. A Booby. Albo & cinereo colore varia est; Anatis Moscoviticæ magnitudine, tetradyctylos, digitis omnibus membranis connexis. Aquis imminent Milvorum modo, absque alarum agitatione aërem tranantes, ex alto prædam speculantes, & Pisces quamprimum prope aquæ superficiem apparent rapientes. Rostrum longum teretiusculum, flavicans. Caribbeas insulas frequentant; numerosis gibibus insulam quandam parvam non longe à Nieves, Rendondo dictam, incolis vacuam & desertam advolitant, ibi déisque nidificant & pariunt.*

6. *Anseri Bassano congener fusca Avis. An Faves Rochefortii? Avi præcedenti persimilis est. cum qua plerunque capitur. Differt colore saltem obscuriore.*

7. *Hirundo marina major. Patines de Oviedo, lib. 14: cap. 1. The greater Sea-Swallow. Columbâ vulgari major erat, colore in dorso obscurè cinereo seu griseo quem vocant, infernè albo: Alis acutis, volatu pernici; Hirundinis more Aquæ superficiem stringere seu radere videtur, prædæ intenta. Sub vesperam volatu continuo delassatæ congregantur multæ insimul, & aquæ superficie insident. In alto mari 50 circiter leucis ab extremitate Occidentali Angliæ promontorio, the Lands end dicto primò occurunt, & abinde in Boreali Atlantici Oceani parte ad Maderas usque insulas frequentes cernuntur. A quibus non longè versus Canarias dictas desertæ quædam insulæ Salvages dictæ jacent, in quibus Aves hæ pariunt & se multiplicant magno numero.*

8. *Anser domesticus. The Tame Goose. Ex Europa initio huc translatus.*

9. *Anser Canadensis. The Canada Goose.*

10. *Anas domestica vulgaris. The common tame Duck.*

11. *Anas moschata, sive Cayrina Aldrov,? The Muscovy Duck.*

12. *Anas fistularis*, atboribus insidens. *The Whistling Duck.* Ab apice rostri ad extremam caudam 20 circiter digitos longa erat. Voce fistulæ sonum imitatur, unde nomen: & quod singulare est in hoc Avium genere, arboribus insidet. In hac insula frequens est

13. *Anas fera ventre candido*. *The White-bellied Duck.* Longa erat 20 uncias, 30 lata. Rostrum nigrum, duos digitos longum, narium foraminibus rotundis. Cauda ad 3 digitos extendebatur. Caput plumis obscurè & dilutiùs fuscis mixtis integebatur. Superior pars colli, partes subalares, & venter etiam aliquatenus, pennis fuscis, & albentibus lineolis transversis variis, integebantur. Dorsum plus fusci minus albi obtinet. Cauda & alæ dilutiùs fuscæ, verùm è brevioribus seu mediis remigibus nonnullæ colore viridi aurantiacum & album intercedente pictæ.. Pectus & ventris bona pars alba. Crura & pedes è fusco virelcebant.

14. *Querquedula secunda Aldrov.* An *Anas Circia Gesn.*? *The Teal.*


15. *Rabihorcados todos negros de Oviedo*, lib. 14, cap. 1. *Fregattes du Tertre.* Avis *Rabo focardo Lusitanis GAZOPHYL.* Natur. PETIVER. Tab. 45. Fig. 1. Catal. 182. *A Man of War.*



MAN-



# INDIAN BIRDS about FORT ST GEORGE.



# INDIAN BIRDS about FORT ST GEORGE

13. Pied Bird of PARADISE.



14. Broad-tailed MADRASS DOVE.




15. PARROT DOVE




16. RED JAY-DOVE



17. RED. PIED DOVE.



18. MADRASS RING-DOVE



19. COCK SAULARY.



20. HEN SAULARY



21. SANGUILLO



22. RED TOORACA with a black Head




23. BLACK TOORACA



24. PIED TOORACA with red spots.





---

---

MANTISSAM HANC

# A v i u m Maderaspatanarum

Addidit peritissimus Naturalis Historiæ Cultor

D. JACOBUS PETIVERUS, S.R.S.

Quarum Descriptiones ex Iconibus elegan-  
tissimè pictis,

Sibi à D. EDVARDO BUCKLEY,

AB ARCE

Maderaspatana (*vulgo* Fort St. George)  
missis, desumptæ sunt.

1. **HIMANTOPUS** Maderaspatanus è nigro ali-  
bente, cruribus rubris; Nobis. An *Himantopus*  
Plinii lib. 10. cap. 47? *The red legged CRANE*. Fig. 3.  
*Rostrum longum, gracile, nigrum. Dorsum, Alæ (quæ  
ultra caudam extenduntur) Vertex, Cervicis pennæ  
(usque ad Scapulas crispatæ) eodem colore: inde ul-  
que ad caudæ finem albo. Femora nuda; Crura longis-  
fima, gracilia; Digihi tres (Postico enim caset) membra-  
nulis connexi, rubro. Ungues acuti, adunci, nigri.*  
Cum Aldrovandi descriptione bene convenit.

2. **GALLINAGO** Maderaspatana Perdicis colore.  
*The PARTRIDGE-SNIPE*. Fig. 2. Coloribus variis,  
maculisque elegantibus undique ornatur. Venter &  
Pectus (quod linea lata transversa nigra dividit) al-  
bescunt. Caput, Tempora, & margo Alarum superior  
maculis nigrofuscis asperguntur. Remiges alarum, &  
Cauda luteo, griseo, nigroque eleganter interstingun-  
tur. *Rostrum longum (apice crassiusculo) rufescit. Digi-*  
[ N ] tus

tus posticus (ungue adunco) longitudine anteriorem  
æquat.

3. *Motacilla Mader.* *nigro alboque mixta.* The Black  
and White WAGTAIL. Fig. 3.

4. *Motacilla Mader.* *ex albo cinerea, caudâ forcipata.*  
The forked WAGTAIL. Fig. 6. Hunc & præceden-  
tem *Marem esse & Fæminam existimo.* Utrique (præ-  
fertim huic) cauda forcipata, quæ ex 4 tantum pennis  
constare videtur, exterioribus albis, mediis nigris.

5. *Avis Maderas.* *major, Novaculæ facie.* Coddæ  
Cauka, sive Summoodra Cauky Malabaricis. The  
SEA CROW. Fig. 5. Nigrescunt Vertex & Alæ, qua-  
rum extremitates longissimæ, tenues, recurvæ. Collum,  
Pectus, Venter albicant, lineolis subfuscis striata. Ru-  
fescunt Crura brevia, Digihi (usque ad medium membra-  
nulis intercedentibus juncti) & magna pars Rostræ. Max-  
illa superior inferiore multò brevior, & in eandem ut  
*Novicula* in Manubrium suum incidit. Hujusmodi Ro-  
strum è Carolinâ olim accepi, cujus Icon in Gazophil.  
Nat. & Art. Tab. 76. Fig. 2. exhibetur.

6. *Crex Indica ex albo cinerea, nigroque mixta.* Cau-  
nangoly, Malabarcibus : Boollu Cory, Gentilibus : The  
Maderas RAIL-HEN. Fig. 4. Capite, Corporis mag-  
nitudine & figura, Anati similis : Rostrum autem habet  
acutum, teres, longiusculum ; Pectus album, maculis lu-  
nulatis nigrusculis respersum ; Pennas alarum cinereas,  
marginibus nigris : Caudam brevissimam ; Digits &  
Ungues (aduncos) longos.

7. *Pica Maderasp.* *fulva, alis penè nigris.* Vanga  
Pandoe ; Gentil. The BUFF-JAY. Fig. 9. Magni-  
tudo circa *Pice glandariæ* nostratis. Caudæ superior  
pars, nigra, apice excepto, qui flavus : pars inferior  
alba flavo mixta. Ductus niger obliquus oculos cingit.  
Alæ nigræ, apicibus, & areola circa medium, flavis:  
Cætera fulva, lineolis ruffo-fuscis interstincta.

8. *Pica Madraspatana* *flavicans.* Vanga Pandoe  
Pedda ; Gent. The YELLOW-JAY. Fig. 8. A præ-  
cedente differt colore dilutiore flavo ; Pectore usque  
ad anum lineolis obliquis sinuosis (pellium Armenianan-  
rum

fum instar) insignito; Alis integris, & Macula ovali  
Oculos ambiente, nigricantibus: Dorso & Gulture flavo.

9. *Pica Madraspat.* *Sturni* ad instar maculata. *Cundoe Vanga Pundoor*; Gent. The M O T L D - J A Y: Fig. 7.  
A precedente differt Pectore & Dorso mitelli coloris;  
**Capite & Caudâ** in hâc nigrescente, quæ in illâ flavo.

10. *Pica Maderasp.* *virescens caudâ tricuspidate.* Passary  
Caye. Gent. The GREEN J A Y. Fig. 10. Magnâ ex  
parte viridis; Dorso & caudâ intensius *Cauda tricuspidis* notabilis, apicibus nigricantibus, cuspidate mediâ longissimâ.

11. *Pica Maderasp. minima è cœruleo nigrescens.*  
Peach Caye; Gent. The small blue J A Y. Fig. 11.  
**Caput & Alæ cœruleo intensiore quam Cauda.** Cætera  
nigra aut cenea; Cruribus & Rostro exceptis, quæ  
rufescunt.

12. *Pica Indica vulgaris:* Ponnunký pitta; Gent.  
Ponnandutty; *Maderaspatanenibus:* The M A D R A S S  
J A Y. Fig. 10. Nostrati *Picæ glandariæ* affinis est. Linea  
arcuata albida supra oculos. Alarum tegetes virescunt,  
Scapis flavescitibus: juxta basim alarum macula cœru-  
lea: Remiges & Cauda nigrescunt: Uropygium cœruleo  
maculatur: inter femora usque ad caudam rube-  
scit.

13. *Manucodiata cristata* ex albo nigroque variata:  
*Tella Yeaco narry;* Gent. The pied BIRD OF PAR-  
ADISE. Fig. 13. Hanc elegantissimam rarissimamque  
avem ejusdem speciei esse credimus, ac ea quam in  
*Hollandiâ* inter *Keynâ Hermanniana*, Anno 1711. pro  
Clariss. SLOANIO emi. In D. Hermanni catalogo, p 13.  
No. 184. vocatur, *Avicula Paradisæ Zeylanica barbata*  
ex albo & nigro variegata, caudâ 2 longissimis pennis con-  
structa: Walluhora, *Zeylanenibus*, i.e. *Gossypium* fu-  
rata: *Het Catoen Diefje*; Belgis. *R strum*, Crista, &  
totum Caput nigra. Cætera alba, lineis arcuatis, sive  
lunulatis respersa. Cauda insignis, pennis 2 longissimis.  
Apud Hollandos in magno pretio habetur, & inter rarissi-  
ma numeratur. Nec quicquam ex Claris. Hermanni  
Musæo refertissimo pluris vendebatur.

14. *Columba Maderasp. cauda 3 pennis latis conflata.*  
 The Broad-tailed MADERAS DOVE. Fig. 14. Pars maxima corporis albescit. At alarum bases colore sulphureo, maculis rufescensibus fimbriatæ: extremitates Remigum nigræ. In Uropygio 3 pennæ miniaceæ acutæ. Rostrum & Crura lutea. Huic proprium & peculiare, Cauda tribus tantum pennis longis latis, albis, nigro undulatis, scapis rubris, constructa: quarum extimæ breviores, setâ longâ nigrâ inter singulam pennam interpositâ.

15. *Columba Maderasp. variis coloribus elegantè depicta.* The PARROT-DOVE. Fig. 15. Variis coloribus perfunditur: Pectus sanguineo flavi umbrâ; Caput & Venter obscurè viride pallescente; Alæ fusco viride tincto; marginibus viride & luteo undulatis: Remigum apices, & pars Caudæ superior nigro; inferior rufescente. Femora lanugine obducuntur. Crura brevissima, crassa, rufescens. Pedes longi ejusdem coloris. Rostrum breve, crassum, prope apicem torosum.

16. *Columba Maderasp. è rubro alboque mixta:* The red JAY DOVE. Fig. 16. Temporibus, Pectore & Ventre albis; Rostro & Vertice rubris, lineis duabus ejusdem coloris; unâ collum cingente, altera pectus & ventrem dividente. Bases alarum cancellatæ, ut in *Picù glandariâ*, tantum rubro: Cæteræ Alarum pennæ albæ, marginibus nigrescentibus, Remigibus exceptis, rubris albo tinctis. Cauda eodem colore, apice & lineis latis transversis rubris.

17. *Columba Maderasp. minor, ex albo rufescens:* The small red pied DOVE. Fig. 17. Buccæ, Pectus, Venter, Femora alba: Alæ, Cauda, Vertex, subrubra. Supra Oculos linea lata nigra: eodem colore Pedes, Crura longa, nuda, gracilia.

18. *Avis Maderasp. è cinereo-rubente.* MADRASS RING-DOVE. Fig. 18. *Woorullia Ponnunki;* Gent. Magnitudine Turdum æquare videtur; cinereo colore perfunditur, præsertim capite, collo, dorso, alis, & portiunculâ caudæ: pectore autem, ventre, & majore caudæ

caudæ parte, incarnato colore: vertice, alarum apicibus & lineâ transversâ sub maxilla inferiore, nigro: rostri apice flavescente.

19. *Saulary mas* Mad. *ex albo nigroque mixtus.* The COCK SAULARY. Fig. 19. Magnitudo *Sturni.* Pectus, venter, femora, pars caudæ inferior, & areola in alis albissima; cætera nigricantia.

20. *Saulary femina* Mad. *fusco alboque varia.* The HEN SAULARY. Fig. 20. A Mare distinguitur caudâ acuminatâ, & colore, qui in hâc fuscus, ubi in illo niger

21. *Sanguillo* Mad. *capite caudaque nigris.* Fig 20 Gulla Cavalla; Gent. Magnitudo *Picæ varie.* Vertex elatus, Rostrum, collum, & cauda, nigerrima, Alæ, scapulæ, dorsum, & uropygium, rubra. Venter & femora alba Hujus avis nota characteristicæ est Vertex acuminatus, & Cauda 3 pennis latis, in acumen desinentibus, constructa; media penna ultra extimas protenditur, & Tragulæ formam caudæ tribuit.

22. *Tooracca Pigaiy* Mad. è rubro alboque mixtis, capite acuminato nigro The red TOORACCA, with a black Head. Fig. 22. Huic Avium generi nota characteristicæ Setæ quædam tenues in cervice.

Multe sunt earum Species, quæ coloribus præcipue inter se distinguuntur.

Huic pectus, venter, femora, & inferior pars caudæ, alba: Scapulae, dorsum, alæ, caudæ pars superior, & anus, rubra.

Hæc & sequentes à *Sanguillo* differunt, Setis in cervice, & quòd *Sanguillo* dimidio minores sint.

23. *Tooracca Maderasp.* è rubro alboque partitis. The Red and White TOORACCA. Præcedenti similis, capite excepto, huic rufo, illi nigro.

24. *Tooracca Mader.* albida, ano rubente. The whitish TOORACCA. A præcedente differt colore, huic cinereo albo, ubi illi rubro.

25. *Tooracca* Mad. nigrescens. The black TOORACCA. Fig. 23. Totum fere corpus nigrum, apice caudæ

[N 3] excepio.

excepto, albo. In hâc notatu dignum, Podicem, seu  
potius pennulas caudam sustinentes, nigricare, in omnibus aliis rubere.

26. *Tooracca* Mad. è *nigro albicans*. The MAGPY TOORACCA. Pectus (nigris lunulis conspersum) venter & caudæ pars inferior, alba. Pectoris colore, & ani rubicundia à præcedente differt.

27. *Tooracca* Mad. *auribus, & maculâ in basi alarum sanguineis*. The MAGPY-TOORACCA, with red Spots. Fig. 24. A præcedente differt maculis sanguineis juxta Aures, & Alarum bases.



# INDEX

## NOMINUM

# A V I U M

Anglicorum, Wallicorum, Cornubiensium;  
Septentrionalium, cœterorumque Britani-  
corum & Hibernicorum.

A:	Pag.		Pag.
L P	86	— Small Yellow and Brown	186
Amzel	65	— Tropick	197
Auk	119	Bittour, or Bittern — Small	100 189
B.		Black-Bird — Great and Small of	65
<b>B</b> Ald-Buzzard	16	Jamaica	185
Bald-pate	184	Black cap	73, 128
Bee-eater	49	Black-Cock	53
Bergander	140	Black-Game	<i>ibid.</i>
Bernacle	137	Booby	191
Bilcock, or Brook-Owzel	113	Bottle-Nose	120
Bird, Black and Yellow	186	Bramble, or Brambling	88
— Black and Orange	188	Brent-Goose	137
— Bonana	187	Bull-Finch	86
— Humming Birds	<i>ibid.</i>	Bunting	93
— Savanna	188	Burgo-master of Greenland	
— Small Black and White	186	Burrough Duck	127, 139
		[N 4]	140
			Bustard

# I N D E X.

Bustard	Pag. 58	Curlew	Pag. 103.	190
Butcher-bird	18, 19	Curwillet		109
Buzzard	16			
Honey	<i>ibid.</i>		D.	

## C:

<b>C</b> Anaty-Bird	91	<b>D</b> Aker-Hen	58
<b>C</b> arrion-crow	10, 11, 180	Didapper, Dipper, or Dob chick	125. 190
<b>C</b> assowary	36	Divers, or Douckers	124,
<b>C</b> haffinch	88	Dodo	37
<b>C</b> hattering-Crow, or <b>C</b> a- cao-walk	181	Dotterell	111
<b>C</b> hurn-Owl	180	Dove	59. 185
<b>C</b> lakis	137	—Madras	196
<b>C</b> ockatoons	28, 29	Duck, black	141
<b>C</b> ock and Hen	51. 182	—Cuthbert	<i>ibid.</i>
<b>C</b> ock of the Wood, or Mountain	53	—Hook-bill'd	150
<b>C</b> oddy-Moddy	130	—Muscovia	150. 191
<b>C</b> old-Finch	77	—Scaup.	142
<b>C</b> ole-Mouse	73	—Tame	150. 191
<b>C</b> oot	116	—Tufted	142
<b>C</b> ormorant	122	—Whistling	192
<b>C</b> ornish-chough	40	—White-bellied	<i>ibid.</i>
<b>C</b> oulterneb, or Counterneb		Dun-diver	134
	120	Dunlin	109

## E.

<b>C</b> rab catcher	182	<b>E</b> agle, black	7
<b>C</b> racker	147	—Golden	6
<b>C</b> rane	95. 123	—White-tailed, or Py- gard	
—with red Leggs	193	—Sea	16
<b>C</b> reeper	47	Elk	136
<b>C</b> ross-bill	86	Ear-Dove	184
<b>C</b> row	39		F.
—Royston	<i>ibid.</i>	<b>F</b> alcon, Gentile	13
—Sea-Crow	<i>ibid.</i>	—Haggard	14
—Madras	194		—Jer-
<b>C</b> uckow	23		
<b>C</b> untur	11		

# I N D E X.

— Jerfalcon	Pag. 13	Grouse, or Gray-game	P. 53
— Mountain	<i>ibid.</i>	Grygry	19
— Peregrine	<i>ibid.</i>	Guillem, or Guillemot	120
— Red	14	Gulden-head	120
— Stone	<i>ibid.</i>	Gulls, Black and White	127
— Tree	<i>ibid.</i>	— Herring Gull	<i>ibid.</i>
— Tunis, or Barbery	<i>ibid.</i>	Guinnea-Hen	182
— White	<i>ibid.</i>		
Fallow-Smith	78		H.
Field-Fare, or Feldefare	64		
Flamingo	190	American Hangnest	184
		Haw-Finch	85
		Hawks	13
		Hazle-hun	55
		Heath-Cock	53
		Hedge-Sparrow	79
		Hele gug	120
		Hen-harrier	17
		Heron, common	98
		— Lesser-Ashcoloured, or Night-Raven	99
		— White	<i>ibid.</i>
		Herring-Gull	127
		Heyhoe	42
		Hickwall	43
		Hobby	15
		Hoop, or Hoopoe	48
		Hooper	136
		Humming-Birds	82. 187
			I.
			J.
G Adwall, or Gray	145	Ack-Daw	
G Gannet	128	Jack-Snipe, or Judcock	40
Gaulding, Black or Blew		Jay	105
— White	<i>ibid.</i>	— Madras	41
Gid	105		194
Glead	17		
Goat-sucker	27. 180		
Godwit	105		
Golden Eye	142		
Gold-Finch	89		
Goosander	134		
Goose of Canada	139. 191		
— Gambo, or Spur-winged	138		
— Soland	122		
— Tame and Wild	136		
	191		
Gorcock, or Gor-Fowle	54		
Goshawk	18		
Gray-Lagg	138		
Great Grey Gull	130		
Green-Finch	85		
Greenland-Dove	121		
Gross-beak	85		

Kestrel

# I N D E X.

K.	Pag.		Pag.
<b>K</b> estrel	16.	Merlin	15
Kiddaw	180	Mire-Drum	100
King Fisher	48	Missel bird	64
Kite	17	Mock-bird	64. 66. 185
Knot	108	More Hen	113. 190
<b>L:</b>		Moor Buzzard	17
<b>N:</b>		Moor-Cock	54
<b>O:</b>		Moor-Titling	76
<b>P:</b>		Mountain-Finch	88
<b>R:</b>		Mullet	120
<b>L</b> Annar and Lannaret	15	Murre	119
Lapwing	110	Musket	18
Lark, Field or Sky	69	Mwyalchen y graig	66
—Crested, greater and Lesser	ibid.	<b>N:</b>	
—Sea	88. 190	<b>N</b> ightingale	78
—that sings like a Grass- Hopper	70	—Jamaica	135
—Tit-Lark	69	—Spanish	184
—Wood-Lark	ibid.	—Virginian	85
Linnet, common	90	Night-Raven	98
—Great and Lesser, Red- headed	91	Noddy	132. 190
—Mountain	ibid.	Nope	86
Loger-head	185. 186	Nun	74
Long-legs	190	—White-Nun	135
Loon	125. 190	Nut-Hatch, or Nut-jobber	47
<b>M:</b>		<b>O:</b>	
<b>M</b> acaos	28. 29	<b>O</b> LD Man	182
Maccaw, the greater	181	Osprey	7
Magpy	41	Ostrich	36
Man of War	192	Owls, or Howlets	26
Martin, or Martlet	71	—Brown, Ivy, or Screech	25
—Black, or Swift	71, 185	—Grey	26
—Sand	71	—Horn	24. 25
Mavis	64	—Lottle	26
		—Fern, or Churn	ibid.
		—White,	

# I N D E X.

— White, Barn, or Church

Pag. 25

73. 110

Ox-Eye

Q.

Ueest

Quirizao

Pag.

62

183

P.

R.

<b>P</b> Aradise Bird	195	<b>R</b> Ail	58. 113
Parrakeets	34. 181	— Water-Rail	190
Parrots	30. 181	— Hen Madras	194
Partridge	57	Rain-Fowle	42. 182
— Mountain	183	Rat, or Road Goose	137
— Snipe	193	Raven	39
Peacock	51. 183	Razor-bill	119
Pelecane	121	Red Game	54
— American Scarlet	189	Red Shank	107
Pellicane	102. 191	Red Start	78
Penguin	118	Red-Wing	64
Pettichaps	79	Reed-Sparrow, the greater	
Pewit	128	— Lesser	47
Pheasant	56	Ring-Dove	62
Pianet	41	Ring-Owzel	65
Pie, yellow and black	181	Ring Tail	17
Pigeons	59, &c. 183	Robin-red-breast, or Rud-	
Pintado	52	dock	78
Plover, bastard	110	Rock-Owzel	65
— Great	190	Roller	41
— Green	111. 190	Rook	39
— Grey	111	Royston-Crow	39
— Sea	190	Ruffe and Reeve	107
Pochard	143		
Pool-Snipe	107	S.	
Pope	120		
Popinjay	30	<b>S</b> anderling	109
Pouts	54	Sand-Martin	71
Puffin	120. 134	Sand-piper	103
Puttock	16	Scare-Crow	131
Pygard	7	Scaup-Duck	141
		Scoter	

# I N D E X.

Scoter	Pag. 141	Stone Curlew	Pag. 105, 108
Sea Crow	128	Stone Plover	105
Sea-Dotterell	112	Stone Smith, or Stone-chat-	
Sea-Lark	88. 112	ter	76
Sea-Mall, or Mew	127	Storks	97
Sea-Pheasant	147	Swallow	74
Sea Pie	105	— Sea	131, 132, 191
Sea-Swallow	131, 132, 191	Swan, tame	136
— Lesser	131	— Goose	138
— Lesser, black, cloven-		— Wild	136
footed	132	Swift	72
Sea-Turtle	121	Swine-pipe	64
Shagge	123	Syvigw	80
Shear-water	133		
Sheld-apple	86		
Sheldrake	140		
— Swallow-tail'd	145	T. T Arroch	128
Shore bird	71	Teal	147, 148, 192
Shoveler	143	Brown Tern	131
Shrite	64	Tewit	110
Silk-tail	85	Thistle-Finch	89
Siskin	91	Throstle, or Song Thrush	64
Skout, or Sea Hen	120	Thrush of Jamaica	185
Snipe, or Snite	105. 190	Timcuse, Blew, or Nun	74
Song-Thrush	64	— rested	74
Sparling Fowl	134	— Great	73
Sparrow Hawk	18	— Long-tailed	74
Sparrow	36	— Marsh, or Black-cap	73
— Black	188	Tropic Bird	123, 191
— Green	187	Turkey	51, 182
— Hedge	79	— Wild, of New Eng. land	51
— Reed	47. 93	Turn-stone	112
Spoon-bill	192	Turtle Dove	64
— Scarlet	139		
Stannel, or Stone-gall	16.		
	180	V. VULTURES	9, 10
Star, or Starling	67	— Chesnut coloured	10
Stint	110	Wagtail	
Stoa Lein	66		

# I N D E X.

W.

	Pag.	Winter Mew	Pag.
W Agtail, white	75	Woodcock	104
— Yellow	75	Wood Owl	180
— Madras	194	Wood-spite, or Wood-pecker, great, black	42
Watchy Picket	184	— Great spotted, or Wit-wall	43
Water Hen	113, 190	— Green	42
Water Ouzel, or Crake	66	— Lesser spotted	43
Water Rail	113, 190	— Particoloured of <i>fa-</i> <i>maica</i>	181
Wheat-eat, or White-tail	75	Worm-eater	186
Whewer	143, 146	Wren	80
Whilk	138	— Golden coloured	79
Whimbrell	103	Wry-neck	44
Whin-chat	76		
White Nun	135		
White Throat	77		
Wigeon, Whewer, or Whim	146, 147		
— Great red-headed	143	<b>Y</b> Arwhelp, or Yarwhip	
Wild Duck	145	Yellow Bird	80
Wind hover	16	Yellow Hammer	93
Wind Thrush	64		

Y.

# I N D E X *Nominum Avium*

*Latinorum, Gallicorum, Belgicorum,*  
*Brasilianorum, Germanicorum, Indicorum, Mexicanorum, Italicorum,*  
*Lusitanorum, &c.*

<b>A</b>	Cacà cahoactli	174	— Alaudarius	15
	Acacalotl.	104	— Fringillarius	18
	Acatechichiætli	90	— Palumbarius	<i>ibid.</i>
	Achalalactli	156	Acitli	125
	Accipitres Macropteri	13	Acolchichi	165
			Acolin	

# I N D E X.

<b>Acolin</b>	Pag. 116, 178	— <b>Hispanicus</b> Pag. 138
<b>Ægocephalus</b>	105	— <b>Marinæ</b> 140, 141,
<b>Æalon</b>	15	142, 143, 144, 145
<b>Aguapecacá</b>	115	— <b>Maximus niger</b> 138
<b>Ahuatototl</b>	167	— <b>Mexicanæ</b> 175
<b>Aiaia</b>	101, 189	— <b>Moschata</b> 191
<b>Ajurucurau</b>	32	<b>Andorinha</b> 72
<b>Ajurucuruca</b>		<b>Anhima</b> 96
<b>Ajurucatinga</b>	33	<b>Anhinga</b> 124
<b>Ajurupara</b>		<b>Ani</b> 35, 185
<b>Alauda arborea</b>	69	<b>Anser Bassanis</b> 122
— <b>Cristata major &amp; minor</b>	<i>ibid.</i>	— <b>Canadensis</b> 139, 191
— <b>Congener</b>	93	— <b>Cyneus Guinneensis</b> 138
— <b>Indica</b>	70	— <b>Domesticus</b> 136, 191
— <b>Marina</b>	110	— <b>Ferus</b> 136
— <b>Minima Locustæ voce</b>		— <b>Gambensis</b> 138
— <b>Minor campestris</b>	<i>ibid.</i>	— <b>Magellanicus</b> 118
— <b>Pratorum</b>	69	— <b>Palustris</b> 138
— <b>Vulgaris</b>	<i>ibid.</i>	— <b>Spritzbergensis</b> 139
<b>Albardeola</b>	102	<b>Anthos</b> 81
<b>Albellus</b>	135	<b>Apiaster</b> 49
<b>Albicilla</b>	7	<b>Apeca Apoa</b> 148
<b>Alca</b>	119	<b>Aquilæ</b> 6, &c.
<b>Alcyon</b>	48	— <b>Brasiliensis</b> 7
<b>Aluco</b>	25	— <b>Fulva</b> 6
<b>Amacozquē (in Ornithol. D.)</b>		— <b>Valeria</b> 7
<i>Willughb. Amalozq;</i> )	179	— <b>Virgæ</b> 161
<b>Anaca</b>	35	<b>Aracari</b> 44
<b>Anas Arctica</b>	120	<b>Araracanga</b> 29
— <b>Campestris</b>	59	<b>Ararauna</b> 28, 181
— <b>Circia</b>	192	— <b>Arcuata major &amp; minor</b> 103
— <b>Domestica</b> 150, 191		<b>Ardeæ</b> 98, 99, 100, 101, 102
— <b>Exoticæ Brasil.</b> 148,		— <b>Cœrulea</b> 189
	149, 192	— <b>Stellaris</b> 100, 189
— <b>Fera lacustris</b>	175	<b>Ardeola Brasiliensis</b> 101, 102
— <b>Fistularis</b>	192	<b>Arenaria</b> 109
— <b>Fluviatiles</b> 145, 146,		— <b>Arquata major &amp; minor</b> 103
	147, 148	<b>Afilius</b>

# I N D E X:

<b>A</b> silus Bellonii	Pag. 80	Paradisi P. 20, 21, 22
<b>A</b> sio	25	Picta 173
<b>A</b> stur	18	Pipirivara 44
<b>A</b> tinga guacū mucu	165	Pluviæ 182
<b>A</b> tototl	47	Polyglotta 65
<b>A</b> tototloquichitl	<i>ibid.</i>	Pngnax 107
<b>A</b> tricapilla	79	Rostri mucronatî
<b>A</b> ttagen	54, 55	
<b>A</b> ttageni	54	Rostri nigri 169
<b>A</b> vicula Amadavatæa	92	Rubescens colli 179
— Africana	152	Saligna 170
— Zeylanica	<i>ibid.</i>	Se scalpens ad arun-
<b>A</b> vium divisio	I	dines 172
<b>A</b> vis Arenam deglutiens	176	Sicca 179
— Canuti	168	Spicæ Maizii 170,
— Corvina	168	172
— Corvipeta	155	Tarda 58
— Coccinea	173	Tropicorū 123, 198
— Consimilis Stoparolæ & Magninæ	81	Varii capitis 176
— Cinereo-alba	191	Venti 175
— Cœrulea seu Cyanos	66	Verminosa 156
— Cyaneorum pedum	170	Vetula 170
— Diomedea	133	Avosetta 117
— Florida	168, 170	Aura 10, 180
— Fulva	174	Aurarum Regina 161
— Fusca Anseri Bassano		Aurivittis 90
congener	191	Axoquen 174
— Jamaicenses	180	Axoyatotl 172
— Incurva	161	Ayo quantototl 171
— Lati rostri	176	Ayo quantototl tiltic <i>ibid.</i>
— Lunaris	175	
— Lutea	173	<b>B</b> Albusardus 7, 16
— Nivea	169	Barge 105
— Numidica	51, 182	Beccafigo 79
— Ovimagna	155	Bemtere 165
		Bernacula, & Burnicla 135
		Boarina 77, 81
		<b>B</b> collu

# I N D E X.

Boollu Cory	Pag. 154	Cecero	Pag. 161
Borin	81	Cehoiloltl	63
Bosch duiven	152	Cencontlatolli	65, 159; 185
Boschas major	145	Cenchramus	93
Bout de petun.	152	Cenchrus	16
Brenta	137	Cenotzqui	159
Brenthus	<i>ibid.</i>	Ceoan	169
Bubo	24	Cepphus	129
Buteo Apivorus sive Vespi-		Certhia	47
vorus	16	Chachalacometl	163
—Vulgaris	<i>ibid.</i>	Chachavatotol	174
<b>C.</b>			
Abure	26	Chadonneret	153
C Cacatototl	172	Charadrius	108, 112, 190
Cacalototl	168	Chiantototl	167
Cairina	150, 191	Chichi $\ddot{\text{c}}$ li	160
Calandra	93	Chichiltotol	174
Callidrys	106, 108	Chiculatli seu Chiquatli	
Canide		Chiltototl	169, 173
Canine petiere	59	Chochopitli, Corlito	178
Cannevarola	47	Chloreus	68
Canuti Avis	108	Chloris	85, 93
Capella	110	Chrylaetos	6
Capo rosso	143	—Caudâ annulo albo	
Caprimulgus	26; 27, 180	<i>ibid.</i>	
Caquantototl	174	Ciconia alba	97
Caracara	17	—Americana	<i>ibid.</i>
Carduelis 89		—Nigra	<i>ibid.</i>
—Congener	90	Cinclus	47, 108, 110, 112
Cariama	96	Circus	17
Caryocatactes	42	Cirlus	93
Casearius seu Casoris, sive		—Stultus	94
Emeu	36	Cirris	99
Catoen Diefje	195	Citrinella seu Citril	92
Caunangoly	194	Clangula	142
Catarractes	128	Cocoi	100
Catarracta	129	Coccothraustes vulgaris	85
Caxcaxtorotl	167	—Indica	

# I N D E X.

<u>—</u> Indica	Pag. 85	Coturnix	Pag. 58
<u>—</u> Indica cristata	<i>ibid.</i>	<u>—</u> Aquatalis	116
Cocochatl	172	<u>—</u> Indica	58
Cocoztli	<i>ibid.</i>	Coxolitli	56, 57
Cocozon	<i>ibid.</i>	Coyolcozque	158
Cochitenacatl	44	Coyoltotol	173
Cocotzin	61	Cozcacoauhtli	161
Cochitotol	168	Coztotol	90, 173
Coddel cauka	194	Crex Bellonii sive Cheva-	
Colcanauhtli	176, 177	lier	106
Colcanauhtlicioatl	175	Crex Aristotelis	58
Colcuicuiltie	158	<u>—</u> Indica	194
Colherado	102, 189	Cuculus	23
Colin	158	Cuitcuitzcatotol	173
Collurio	18	Culo bianco	76
Columbae	59 ad 63, 183	Cundoe Vanga	Pundoee
<u>—</u> Groenlandica	121		195
<u>—</u> Madraspatan	196	Cuntur	11
Coltotl	171	Curicaca	103
Colymbi	124, 125, 126, 190	Curreca	79
Colymbis	142	Curucui	45
Comaltecatl	177	Cyanos seu Cœrulea	Avis
Concanauhtli	175		66
Conficatrix rubra	172	<u>—</u> Indica	<i>ibid.</i>
Coracias	40	Cygnus cucullatus	37
Corlito	178	<u>—</u> Ferus	136
Cornix	39	<u>—</u> Mansuetus	<i>ibid.</i>
<u>—</u> Cœrelea	42		
<u>—</u> Frugilega	39		D.
<u>—</u> Cinerea frngilega. <i>ib.</i>			
<u>—</u> Nigra Garrula	181	<b>D</b> Aje	155
Cornicines	156	Dendrofalco	14
Corriba	118	Diable de mer	117
Corvus	39	Dronte	37
<u>—</u> Aquaticus	104, 122,		E.
	123		
<u>—</u> Indicus	40	<b>E</b> Catotol	173
<u>—</u> Indicus Cornutus. <i>ib.</i>		Eider	141
Coturnice	57	[O]	Ein

## I N D E X.

Ein Grosse Zee-fluder	126	G.
Elcoztotol	168	
Elotorotol	170	
Emberiza Alba	93	<b>G</b> Albula Pag. 68
— Flava	ibid.	Gallina Corylorun 55
Emeu, Eme, Ema	36	— Mexicana 163
Erihacus	78	Gallinago, Major, Minor,
Erythrocephalos	143	Minima 105
F.		— Madraspat. 193
<b>F</b> Alcinellus	103	— Erythra 109
Falco Albus	14	— Erythropus 107
Columbarius	161	— Hypoleucus 108
Gentilis	13	— Melampus 109
Gibbosus	14	Gallinula Aquatica 116
Indicus Cirratus	ibid.	— Braziliensis 115
Montanus	13	— Chloropus 113, 114, 190
Peregrinus	ibid.	— Ochra 115
Rubeus	14	— Ochropus ibid.
Indici Rubri	ibid.	— Serica 113, 114
Sacer	13	Gallo-Pavo 51, 182
Tunetanus	14	— Sylvestrus 51
Fedoa	105	Gallus Gallinaceus 51, 182
Festuni cul de &c.	191	— Guineensis 51, 182
Ficedula	79, 81	— Peregrinus 37
— Cannoabina	47	Gallus Indicus 52
Flammant	117	— Sylvestrus 53
Francolino	54	Gambetta 107
Fratercula	120	Garagues 162
Fregata	153	Gargane 148
Fregattes..	192	Garrulus Argentoratensis 41
Fringilla	88	— Bohemicus 42, 85
— Motana	ibid.	Garzetta 99
Fringillago	73	Gaviaon 17
Fringillarius	18	Gaviata 130
Fulica	116, 117	Geel Vinck 151
Fuligula	142, 143	Giarolo 70
Fyses	191	Giatoncello 109
		Glareano 81

Glaub-

# I N D E X.

Glaucium	Pag. 143, 144	Harle	Pag. 134
Glottil	106	Havelda	145
Goifugek	118	Hazlehun	55
Gout vinken	152	Hellalenia	65,
Gouambuch	82	Hiaticula	112
Graculus Palmipes	122, 123	Himantopus	106, 190
Grand Gosier	191	— Madraspat.	193
Grisola	81	Hippomanucodiata	21
Grinetta	114	Hiragrill	92
Grivesbees	152	Hirundo Americana	72
Gros	95	Hirundo Apus	<i>ibid.</i>
— Balearica	<i>ibid.</i>	———— Domestica	71
— Indica	<i>ibid.</i>	———— Marina	72, 131,
Grygallus	54		190, 191
Guacaguacu	130	———— Ripraia	71
Guaiminibique	82	———— Rustica	five A-
Guainumbi	82, 83, 187	grestis	71
Guara	104	———— Sinensis	72
Guarauna	<i>ibid.</i>	Hoactli	179
Guira	151	Hoacton	102
— Acangatara	45	Hoactzin	163
— Coereba	83	Hoauhtotol	170
— Guacuberaba	<i>ibid.</i>	Hoextotol	<i>ibid.</i>
— Guainumbi	49	Hôilotl	63
— Wieemgatu	89	Hoinetli	161
— Perea	<i>ibid.</i>	Hoitlalloth	158
— Punga	166	Hoitzanatl	162
— Querea	27, 180	Hoitzilaztatl	102
— Tangeima	45	Hoitzitzil	82
— Tinga	189	Hortulanus	93, 94
— Tirica	86	Hoxoconaultli	50, 174
Guiraru	166		I.
Gulla Cavalla	197	J	
Gypaetus	8	Abiru	95
Gyrfalco	13	— Guacu	<i>ibid.</i>
H		Jacamaciti	44,
Æmatopus	105	Jacana	115
Haliætos	7, 16	Jacapu	67
		[ O 2 ]	Jacu-

# I N D E X.

	PAG.		PAG.
Jacupema	56	Lepelaer	189
Jager-Vogel	40	Leimerrillon	19
Jaguacati Guacu	49, 182	Ligurinus	91
Jamacaii	75	Limosa	190
Jamibu	57	— Venetorum	106
Japacani	84	Linaria	90
Japu	46, 184	— Montana	91
Ibijau	27	— Rubra major minor	<i>ibid.</i>
Ibis nigra	98		
Icterus	68, 184	Lithofalco	14
Jendaya	34	Locustella	70
Jillas seu Tylas	64	Lomvia	120
Ipeca Guacu	149	Lory	151
Ipecu	43	Loxia	86
Isplida	48	Lumme	126
— Indica major	50	Lunda	120
— Indica Macrouros	<i>ibid.</i>	Lupus	40
— Indica minor <i>ibid.</i>	<i>ibid.</i>	Luincinia	73, 185, 187
— Mexicana 50, 174		Lusciniola	80
— ex atro & albo		Lutea	93
varia	182	Luteola	80
Junco	47, 110, 113		M.
Jupujuba	46, 184		
Lynx	44	<b>M</b> Acroule	117
Iznatl	168	Macucagua	53
		Magnanina	79
		Maguari	97
		Maja	155
<b>K</b> Ermell	148	Majague	133
Kudge-ghef	128	Mallemuck	130
		Mansfeny	19
		Manucodiata	20, 21, 22
		— Madetasp.	195
<b>L</b> Agopus	54, 55	Maracana	29
Lanarius	15	Maraca	149
Larius	18, 19	Martinazzo	130
Larus 126, 127, 128, 129,	130, 131	Matkern five Matkneltzel	
		149	
			Maz-

# I N D E X.

Matuitui P.	13, 165, 190	Nepapantotl	Pag: 176
Mazarind	103	Nexton	164
Melanætos	7	Nextototl	<i>ibid.</i>
Meleagris	51, 182	Nhandu Apoa	96
Merganser	134	Nhandu Guacu	36
Mergus Melanoleucus	125	Nisus	18
Mergus	119, 125, 134, 135,	Nóchtototl	171
	142	Noctuæ auritæ	24, 25
Merops	49	Noctuæ non auritæ	25
Merula	65 ad 67, 68, 185	Noctua Brasiliensis	26
Merulæ congener	67	—Mexicana	169
Metzcanauhtli	175	—Minor	26
Metzcanahactli	<i>ibid.</i>	—Silvatica Jamayicensis	
Miacatototl	172	Minor	180
Miliaria	46	Noitibo	27
Milvorum species	17	Nopaltencol	167
Mimus	42	Numenius	103
Mita five Mutu Brasilien-		—Indicus	104
sium	52, 183	Nycticorax	99
Mituporangæ	52		
Mocotototl	166	O.	
Momot	164		
Monedulæ	40, 185	Occolin	57, 163
Monticola	77	Ocononetl	162
Montifringilla	88	Ocotzinitzcan	164
Morillon	143	Oculus pictus	170
Morinellus	211	Oedicnemus	108
— Marinus	112	Oenanthe	75
Morphnos	7	— Altera	76
Motacilla Alba	75	— Congener	80, 92
— Cinerea	<i>ibid.</i>	— Fusco Lutea	186
— Flava	<i>ibid.</i>	— Nostra secunda	76
— Madaraspat	194	— Nostra tertia	<i>ibid.</i>
Muggent	146	— Nostra quarta	77
Muscicapa	81, 77, 76, 186	— Vitiflora	75
		Oenus	62
		Olotototl	169
		Onocratalus	121, 191
Ebbi Negro	161	Opipixan	177
	96	Oriolus	68
		Oij-	

# I N D E X.

Oripelargus	Pag 8	—Rufa seu Græca P. 57
Ortygometra	58, 113, 29c	Percnopteros 8
Oissfraga	7	Le Pescheur 19
Otis	58	Petronia Marina 92
Otus	25	Phascas 147
Ourissia	82	Phasianus 56
		—Brasilienfis 56
P.		Philomela 78, 187
		Phoenicopterus 117, 190
<b>P</b> Alumbus torquatus	62	Pica seu Pica varia Cau-
Papagayos	181	data 41
Paragua	33	—Antillarum 152
Paradisæa Avis	82	—Brasiliana 44
Pari	73, 74	—Glandaria 41
Passary Caye	195	—Jamaicensis 181
Passeres Arundinaeci	74,	—Indica caudata seu
	93	Japonensis 42
—Fabri	157	—Marina 41, 105, 120
—Cœruleo fuscus, &		—Mexicana 162
niger	187, 188	—Persica 42
—Troglodytes	80	Pici Martii 42, 162
—Canariensis	91	Picus canescens seu Leuco-
—Sibilans	164	phæus 182
—Stultus	154, 190	—cinereus 47, 186
—Cætera species	66	—Garrulus Indicus 42
	ad 88	—Jamaicensis Pag. 181
Paslerculus Zeylanicus	88	—Imbrifætus 162
Patines de Oviedo	191	—Luteus Cyanopus 44
Pavo	51, 183	—Maderaspatan. 194
Pelecanus	121, 191	—Murarius 46
Penelops	143	—Nidum suspendens 68
Penelope	146	—Niger maximus 42
Penne Vogels	151	—Varius Brasilienfis 43
Peachy Caye	195	Picus varius Major ibid.
Perdix	57	—Varius Minor ibid.
—Alba	55	—Varius Minimus ibid.
—Brasiliana	57	—Viridis 43
—Cinerea	ibid.	—Viridis Major 43
—Damal cena	55, 57	Picicitli 159
—Montana	57, 183	Picuipinima 62, 184
		Pili

# I N D E X.

<b>P</b> ilvenkegen	Pag. 108	Quapachtototl	Pag. 174
Pinirolo	109	Quatotomomi	162
<b>P</b> itanga Guacu	165	Quatozli	172
Pitzmalotl	167	Quattr' Occhii	142
Platea seu Pelecanus	102	Quauhchichil	84
—Mexicana	ibid.	Quauhchochopitli	163
—Incarnata	189	Quauheilni	174
Pluvialis cinerea	111	Quauhtotopotli	162
—ex fuscō & albo varia	190	Quauhtzonecolin	158
—Major	190, 106	Quaxoxoctototl	164
—viridis	111, 190	Querquedula Cristata	142
Podicipes	125, 190	—Latirostra Mexicana	177
Poero	151	Querquedula prima	148
Poliopus	114	—secunda	147, 192
Ponnandutty	195	Quetzaltototl	157
Ponnunky pitta	ibid.	Quijubatui	35
Porphyrio	116		
Poules Pintades	182		
Poxaqua	160		
Psittacorum Marina species			
28, 29, 30, 31, 32 33, 34, 35		<b>R</b> Abihorcadō seu Rabo forcado	153, 192
Psittacus Leucocephalus	181	Rabolane	55
—Maximus Cyanocro-		Rallus Aquaticus	113
ceus	181	— Italorum	116
—Minor collo miniaceo	181	— Terrestris	58
—Minor macrouros to-		Rathsherr	126
tus viridis	181	Recurvirostra	117
Puffinus	134	Regulus	79, 80
Pygargus	7, 17	Reigers	152
Pyrrhocorax	40	Rhinoceros Avis	40
Pyrrhula	86	Riis Mossen	155
		Riis Vogels	ibid.
		Rostrum spicæ Maizii	178
		Rostrum Sudis	164
		Rothalss	143
<b>Q</b> Uachiltō	116	Rotknussel	109
Quackels	151	Rotschwentzel	78
Quapachcanauhli	177	Rousettē	80
		Rubecula	78
		— Indica	ibid.
		— Viri-	

# I N D E X.

<u>—</u> Viridis	Pag. 187	Struthio seu Struthio Camelus	
Rubetta	76	lus	Pag. 36
Rubicilla	86	Struthio Camelus America-	
<u>—</u> Americana	<i>ibid.</i>	nus	<i>ibid.</i>
Rubicola	76.	Sturnus	67
Ruticilla	78	— Indicus	68
<u>—</u> Major	68	— Junceti	168
		— Marinus	67
		— Mexicanus	166
		— Salsus	168
	S.		
<b>S</b> Alicaria seu filerella	81	Subbuteo	15, 17
Sanguillo	197	Sulfa	123
Saulary	<i>ibid.</i>	Summoodra cauky	194
Sayacu	89		
Schellént	144		
Schoeniclos	110		
Scolopax	104	<b>T</b> Adorna	140
Scops	25	— Tamatiä	65, 116
Scurvogel	96	Tangara	84
Senator	126	Tapera	72, 185
Serinus	92, 153	Tapun	155
Serino affines	188	Tarabe	33
Sguacco	99	Taraniolo	103
Sitta	47, 185, 186	Tatac	171
Skua	128	Toauhtetotl	170
Soco	100	Techictli	172
Sparverius	18	Tecolotl	160
Spinus	91	Teitei	92
Spipola	80, 81	Tella yeaco narrý	195
Spiroletta	70	Tempatlahoac	176
Springers	152	Tepetototl	52
Squaiotta	99	Tequiix-quiacatzañatl	168
Stella Avis	59	Tertiarius	13
Sterna	131	Tetrao	53
Stopparola	77, 81	— Major	<i>ibid.</i>
Strantloopers	151	Tetzompan	167
Strapazino	81	Thraupis	92
Strix	25	Tijeguacu Paroara	89
Strix Cinerea	26	Tijepiranga	<i>ibid.</i>
Strundt Jager	127	Tiannunculus	16, 180
			Flas.

# I N D E X.

Tlacahoilotl	Pag. 63	Txonyayauhi	Pag 168
Tlacoquauhtli	161	Tzanahoei	162
Tlalchinoltotol	171	Tzanatl	157
Tlalquipatli	160	Tzanatlhototl	166
Tlanquiowitztotol	164	Tzaupan	160
Tlapulchichi	172	Tzinitzian	163
Tlapaltotol	174	Tzitzihoa	175
Tlaquauhtli	161	Tzitziquilotl	173
Tlaquilototol	173	Tzoniayauhqui	176
Tlauhquechultotol	162	Tzopiloth	10
Tlauquechul	102, 189	Tzopilotl	180
Tlotli	161		
Tolchiquatli	160		V.
Tolocatzanatl	168		
Toltecoloctli	175	<b>V</b> Anga pandooe	194
Tomineio	82	—pedda	<i>ibid.</i>
Tooracca	197	Vannellus	110
Topau	40	Venceios	185
Tordino	70, 94	Verzellino	92
Torquilla	44	Vitiflora	75
Totanus	105, 106, 107, 190	Vogel Rubus	158
Tottovilla	69	Ulula	26
Toxcacoztic	167	Upupa	48
Tozcacoztli	173	Urogallus	53
Tringa	108	Urubitinga	8
Triorches	16	Urubu	10, 180
Triton	156	Urutaurana	7
Trochilus	79, 118	Vulpanfer	140
Tucana seu Toucan	44	Vulturum species	9, 10
Tui	34, 181		
Tuiapara	35		W:
Tuiaputejuba	34, 181		
Tuite	34	<b>W</b> Agellus	139
Tuipara	35	Wegflecklin	78
Tuitirica	34	Walluhora	115
Tupinambis	49	Wiitbekken	151
Tuputa	156	Wikurulla Zeylanensis	88
Turdi Chiappæ	157	Winder-Meb	129
Turdi	64 ad 68, 185	Woorulin ponnunky	169
Turtures	61, 62, 184	Wynkernell	115

Xer.

## I N D E X.

X.		Yacatlil	Pag. 169
X Alcuani		Yacatopill	164
Xampantototl		Yayaukquitotl	167
Xaxabes	176	Yexixouhqui	170
Xiquipiltototl	173	Yllamotototl	ibid.
Xochiltotl	181	Yohaltecototl	160
Xochitecanatl	173	Yohoalcoachillin	117
Xochitototl	170	Yohualquachili	178
Xolotlapech	178	Yohualtototl	171
Xomotl	167	Yxamatzcatltototl	171
Xotlapech	174	Yxamazcatl	168
Xoxoukqui Hoactli	177	Yxtezcatototl	171
	169	Yzcui cui	170
	162	Yzquauhtli	161
		Yztractzon yaya uhqui	176
Y.		Z.	
Y Acacintli	178		
Yacapatlahoac	176	Ivolo	93
Yacapitzahoac	177		
Yacatexorli	175		



F I N I S,



